

AGYVÉRZÉS

#1

ROSACEA, NYIROKÖDÉMA

Mária, nő (70)

Kiinduló állapot:

2005-ben mellrákot diagnosztizáltak nálam. A műtétet kemoterápia követte, és eltávolították a nyirokcsomókat a hónaljamból. Ennek eredményeként állandó nyiroködéma és rosacea alakult ki nálam. Magas volt a vérnyomásom, a kemoterápia következtében fellépő vérszegénységben és asztmás köhögésben is szenvedtem.

Minden évben 2-3 alkalommal mentem kórházba erős fájdalom, magas láz, kézduzzanat és bőrpír miatt.



A Purtier-hatás leírása

A Purtier szedése óta egyszer sem voltam kórházban. A lelki közérzetem javult, és nem érzem, hogy túlterhelne a munka, jobban bírom. Összességében több energiám van, bár csak napi 1 kapszulát veszek be.

Adagolás:

Naponta: 2x2 db

Jelenleg: 1 db

A Purtier hatásának leírása

A szedés kezdetén a problémáim fokozódtak. Később azonban sokat javult a mentális közérzetem, jobban tudtam kezelni a stresszt.

Összességében több energiám van és nem érzem magam annyira leterheltnek a munkától.

A problémáim tovább enyhülnek, jól érzem magam, és most már csak napi 1 kapszulát szedek.

Kiindulási állapot:

A problémáim 2020 júniusában kezdődtek.

2020 június végén, egyik pillanatról a másikra nagyon rosszul lettem, majdnem elájultam egy bevásárlóközpont parkolójában, és kértem a férjemet, hogy azonnal vigyen haza. Tarkóból kiinduló fejre és gerincoszlopra kisugárzó nagyon erős fájdalmam volt. A tünetek napról napra erősödtek. Elviselhetetlenné vált a fájdalom, csak hideg borogatással a fejemben tudtam létezni. Aludni nem tudtam, csak minimális időt. Semmilyen fájdalomcsillapító nem hatott, így ezzel nem is próbálkoztam tovább.

Egyik reggel azt éreztem, hogy a fél arcom lezsibbadt, olyan volt mint ha lidokainnal beinjekcióztak volna. Beszélni tudtam, de nagyon ijesztő volt, ez több órán át tartott. Akkor már nagyon féltem. Mivel akkor minden kórház le volt zárva a Covid miatt, nagyon nem szerettem volna bekerülni. Egy orvos- természetgyógyász barátom felügyelete alatt otthon gyógyultam. Ezen tüneteim mellett egy erős véres hasmenés is kísérte ezt a folyamatot. Emiatt 2,5 hónap ágyban töltött idő alatt, kb. 7 kilót lefogytam. Az erős fejfájástól és hasmenéstől nem tudtam enni, csak egy Nutridrink nevű fehérjeitalt kortyolgattam és persze sok folyadékot ittam. Szeptemberre a hasmenés megszűnt, a fájdalmaim mérséklődtek, de változóan végtagzsibbadás, néha végtagkihidegedés, gerinctájon végig melegség érzet és a tarkótól kiinduló fejfájást továbbra is éreztem. Már fel tudtam kelni és ahogy én hívtam zombi-üzemmódban valamelyest el tudtam látni a háztartási teendőket, de dolgozni továbbra sem tudtam. Így ment el 3 év, mely időszak alatt voltak könnyebb és nehezebb időszakok.

2021-ben amikor felerősödtek a fájdalmaim, magánrendelésen megkerestem egy idegsebészt, arra gyanakodva, hogy a nyakamnál lehet csípődve egy idegszál, de ő nem talált eltérést, viszont javasolt egy MRI vizsgálatot, amire el is mentem.

Az MRI lelet megtalálható online formában, illetve egy rövid írásos összefoglaló, amit csatoltam. Ezután az orvos barátom tüzetesen megnézte a felvételeket, illetve egy radiológus ismerőssel karöltve, arra jutottak, hogy az idegközpontban lévő elváltozás okozza a tüneteket és az MRI felvételen látható, hogy lezajlott egy agyvérzés, amit jóhírként közöltek, hogy ez már egy lezajlott folyamat és nem fog problémát

okozni. Viszont a fehérállományban talált foltok és a nucleus caudatusban lévő ciszta alapján felvetették az szklerózis multiplex (SM) betegség lehetőségét és javasolták a neurológiai kivizsgálást, amire saját döntés alapján már nem mentem el.

Alternatív módszerekkel, gyógynövényes terápiával, a lelki okok oldásával, energetikai kezeléssel, egy kardiológus által végzett akupunktúrával tartottam szinten az állapotom, de lényeges javulás sajnos nem történt.

Sokáig kellett várnom, hogy rátaláljak a Purtierre. Már olyan rossz állapotban voltam lelkileg is, hogy feladom, elmegyek és bevállalom a protokoll szerinti orvosi terápiát, de szerencsére 2023 novemberében eljutott hozzám egy „véletlen” folytán a Purtierről az információ. Amikor meghallgattam a hatásmechanizmusát, azt, hogy az őssejtek aktiválásával a szervezet öngyógyító tevékenységét fokozza, tudtam, hogy ez lesz az én megoldásom. Utolsó kapaszkodóként elkezdtem szedni az akkor még 6. generációs Purtiert.

A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE:

Koponya MR és MRA vizsgálat natívan

KLINIKAI ADATOK ÉS A VIZSGÁLAT INDIKÁCIÓJA:

1 éve leálló fejférfi és tarkótáji fájdalom. A páciens kontrasztanyag intravénás adásába nem egyezett bele.

RÉSZLETES LELET:

A kamrárendszer supra- és infratentoriális le normális távasságú, középvonali helyzete megtartott.

Az agy nagy normális távasságú felszíni liquor térben belül jobb oldalon magasan parietálisan 25(tri) x 15(cc) x 28(sp) mm legnagyobb kiterjedésű, jól határolt, kissé sűrűbb liquor intenzitású képlet látható, mely a gyrusokat diszlokálja.

Jobb felsőfélben a frontoparietális subcorticalis fehérállományban megfigyelhető több jól határolt T1 hypo / T2-FLAIR hyperintenz góc, melyek közül a legnagyobb jobb oldalon 6 mm-es. A jobb oldali nucleus caudatusban hasonló jellegű 4 mm-es lesio látható.

A leírt elváltozásokban vagy máshol intracranialis diffúziós gátlás nem azonosítható.

A corpus callosum, agytörzs, kisagyi hemisphaeriumok és craniocervicalis átmenet eltérést nem mutatnak.

Intracranialis vérleborváltási termék, vasculáris malformáció nem ábrázolódott. A Willis kör artérián körülrít terület, kórosan szűkült szakasz nem mutatható ki.

A paranasalis sinusok és mastoidalis sejtsztruktúrák tiszták.

RADIOLÓGIAI VÉLEMÉNY:

Jobb oldalon a parietális cortex mellett enyhe térszűkítő hatású arachnoidalis cysta valószínű, melynek összefüggése a panaszokkal lehetséges.

A multiplex fehérállományi és jobb oldali nucleus caudatus góc ischaemiás eredet mellett felveti demyelinatív folyamat lehetőségét is, neurológiai kivizsgálás javasolt.

VIZSGÁLATI TECHNIKA:

T2 súlyozott, DWI, SWAN (T2*) módszerű axialis alkú, valamint 3D CUBE T1 súlyozott, 3D FLAIR módszerű és az intracranialis artériákról 3D ToF felvétel készült. Készülék típusa: GE Signa Pioneer 3 Tesla.

Adagolás:

A javasolt napi 2*1-es adagolással indítottam, de mivel nem volt változás az állapotomban, emeltem a dózist 3*1, majd 2*2-es ütemre. Akkoriban nem tudtam, hogy sok folyadékot kell fogyasztani a kúra alatt, de valahogy a szervezetem igényelte a vízfogyasztást, ugyanis ösztönösen sokat ittam. Sajnos startfotót sem készítettem, amit nagyon sajnálok és azóta mindig ajánlom azoknak, akik elkezdik a kúrát.

Tapasztalatom a termékkel:

A tüneteim a magas dózis miatt nagyon felerősödtek, ahelyett, hogy jobban lettem volna (ez volt az elvárásom), egyre rosszabbul voltam, újra jött az erős tarkótájról kiinduló fejfájás és sajnos voltak napok, amit újra ágyban kellett töltenem, de nem adtam fel. Teltek múltak a hetek és akik érdeklődtek, mindenkinek azt tudtam mondani, hogy egyre rosszabbul vagyok. Később ez hullámmá vált, hol jobban lettem, hol erősebb tüneteim voltak.

Az 5. doboz hozta meg az áttörést, amikor azt vettem észre, hogy át-aludtam az éjszakát. Ilyen már évek óta nem volt és ez nekem rengeteget jelentett, mert mindig éjszaka voltak a legerősebb fájdalmaim. Az energiám kitartott egész napra és úgy éreztem újra a régi vagyok! Innentől kezdve ez az állapot megmaradt mind a mai napig.

2024 márciusában fejeztem be a kúrát. Az állapotom az azt követő időszakban sem romlott és még most is fokozatos javulást tapasztalok. A fejemet sajnos még szoktam érezni, de ez már teljesen elérhető tünet a korábbi évekhez képest. Éppen ezért, elkezdtem szedni a 7. generációs terméket, napi kettes dózissal.

Ajándékhátas számomra, hogy a fodrászom jelezte, hogy új babahajakkal van tele fejem és én is érzem, hogy besűrűsödött a hajam. A kúra előtt nagyon hunyorogtam, ideje lett volna vásárolni egy olvasószemüveget, de most úgy érzem arra sem lesz szükségem.

Nagyon hálás vagyok a Riway magyarországi vezetőinek, hogy hozzájuthattam ehhez az egyedülálló termékhez, ami minden magyar ember számára elérhető!

AGYVÉRZÉS

Ferenc, férfi (70)

Kiindulási állapot:

2015-MRI-n igazolt több stroke-om volt. Beszédem nehezített volt, nem jutottak eszembe gyakorta a szavak. Csak csoszogva tudtam járni erős térdfájdalom mellett.

2022 augusztusában kezdtem el használni a Purtiert.

Adagolás: Napi 2 x 2 kapszulával indítottam a kúrát. Ma már csak napi 1 kapszulát szedek. Már a második kúránál tartok.

Kezdetben tüneteim felerősödtek, majd javulni kezdtek. A 4. doboz szedése közben már éreztem az egészségi állapotomban a javulást. Terhelhetőségem és energiaszintem növekedett. Beszédem és a járásum is tökéletesen megjavult.

Külsőm sokat változott előnyömre és ezt a környezetem is észrevette.

Kiindulási állapot:

2023. június 05. Stroke-kal kerültem kórházba, majd kómába estem, emlékezetvesztés jött létre, később beszéd és járásképtelenné váltam. 3 hónapig kórházi kezelés alatt álltam, nem sok eredménnyel. 3 hónap után hazaküldtek /meghalni/. Teljesen kiszolgáltatott állapotban a fiam és egy ápoló gondozott felváltva. Nagyon lassan javult az állapotom, újabb 2 hónap után felültem és időnként lábra álltam. December elejére segítségével és járókerettel egy-két lépésre képes voltam. December 8-án érkezett meg hozzám Kaliforniába a Purtier. Annnyira ki voltam szolgáltatva az orvosi kísérletezgetésnek, - ami semmi eredményt nem hozott, - hogy minden, ami esélyt adhatott számomra a javulásra vagy akár a gyógyulásra, azt én mindenképpen ki akartam próbálni. Még aznap 2x2 kapszulát bevettem.

7 nappal később volt az első nagy áttörés a gyógyulásában, amikor is önállóan át tudtam emelni a zuhanykabin peremén a lábaimat és így 5 hónap után egyedül tudtam zuhanyozni, ami addig csak segítőkkal és nagy nehézség árán volt végrehajtható. A bal térdem miatt, állandó fájdalommal élek, (amiről teljesen lekopott a porc és nem termelődik benne ízületi folyadék), műtetre voltam 2x is kiírva, de a műtétek covid-fertőzés miatt elmaradtak.

9. napon volt a következő mérföldkő, amikor 20 percig álltam a gáztűzhely mellett és elkészítettem az ebédemet egyedül, fáradtság nélkül, hiszen csak a főzés végén vettem észre, hogy mennyi ideig álltam a saját lábamon, gond nélkül. A következő hetekben a szívem folyamatosan jelzett. Szívrítmuszavarral küzdöttem már rég óta, (2023 elején kiütötték a szinuszomat is, de nem javult a helyzet) gyenge volt a szívem és nagyon felerősödött a szívdobogásom. Ettől a tünettől megijedtem, így visszavettem az adagolást 2x1 kapszulára és ezt azóta is így eszem.

Memóriám és beszédképességem visszaállt a régi állapotába. Napi szinten játszok barátaimmal Rummikub-ot, kanasztát és rendszeresen porig alázok mindenkit, mint a stroke előtt. Hétről - hétre erősödik a lábam és egyre többet tudok lépni a járókerettel.

2024 februárjában, 79 évesen összeszedte a bátorságomat és megpróbáltam vezetni. Sikerült! Azóta is vezetek, hiszen Kaliforniában autó nélkül sehová sem lehet eljutni. Ez volt az önállóságához vezető út újabb állomása, és még csak a 3. doboz végénél járok a kapszula szedésével.

2024.03. az egyik kórházi kontroll vizsgálaton a veseorvosom megkeresett. Ugyanis a stroke kezelése alatt felhívták a figyelmemet, hogy nagy bajok

vannak a veséimmal, hiszen 60-70%-on működnek csak, és amint kicsit jobban leszek foglalkozni kell ezzel a területtel is. Most az elkészült vese-eredményen ámulva, csak annyit mondott a doktor, hogy: „Marie, nem tudom mit csináltál vagy hogyan történhetett ez, ilyen rövid idő alatt, de a veséid 100 %-osan működnek. Én még ilyet nem láttam! Erre nem tudok orvosi magyarázatot.”

Április elején barátaim segítségével komolyabb edzésbe kezdtem és napi rövidebb - hosszabb sétákat vezettünk be. Eleinte megállókkal, amik a 4. nap végére elmaradtak és 4 nap alatt teljesítettem a 10 000 lépést. Ezt azóta is ünnepnapként jegyzem és meg is ünnepeltük a barátaimmal.

Hatalmas lelkesedéssel várom a következő 4 doboz utáni eredményeket és azon gondolkodom, milyen munkát vállaljak a gyógyulás után, mivel az Egyesült Államokban nincs nyugdíj korhatár és szeretettel fogadják az idős, aktív munkavállalókat. Tele vagyok energiával és tervekkel. A leendő új munkám mellett vissza akarok menni az unokám iskolájába is napközis segítőnek. Betegségem előtt heti egy-két napot töltöttem a gyerekekkel, korábban ott tanítottam évtizedekig.

Adagolás: 2x2 kapszula az első két hétben utána 2x1 kapszula (tervezet-ten) a kúra végéig.

Vízfogyasztás: napi 1,5 l

Gyógyszerek: Vérhígító

Egyéb: Vitaminok, aminosav, fehérje

Szedés közbeni tünetek: Eleinte semmilyen tünet sem volt.

2 hét után erős szívdobogás. Csökkentett adagolás után megszűntek a tünetek és igazoltan megerősödött szív működés jött létre. Időnként, éjjel térd-, láb-, és bűtyök fájdalom, előtte sohasem tapasztalt fura görcsökkel és különös fájdalom formájában.

Kóma, memória vesztés és elvesztett beszéd-készség után visszatért tiszta emlékezet és gyors észjárás. Tökéletes beszéd magyarul és angolul is, a két nyelv gyors váltakozása sem okoz gondot számomra.

Tisztálkodási nehézségek megszűntek. Vizelettartási nehézségek ritkultak, majd irányítottá váltak. Nyugtalan alvásból nyugodt, kiegyensúlyozott alvás. Időnként állkapocs és fogfájás, ami orvosilag nem volt igazolható.

Vérhígító rosszul adagolása miatti bevérzések a karon egy-két nap alatt fel-szívódtak, azelőtt hetekig sem.

A gyaloglás növelésével a térdfájdalmaim enyhültek és izomláz sem jött létre. Napi 3600 lépés után sem fáradok el a nap végére.

ALVÁSZAVAR

#9

Kiindulási állapot:

25-30 évvel ezelőtt már jelentkeztek nálam komoly problémák, mint a székrekedés, ingadozó vérnyomás, alvászavar, savtúltengés.

2022. augusztus 16-án kezdtem el szedni a Purtiert.

Vízfogyasztás:

2-3 L

2020 szeptemberében eltörtem a kezem, amit megműtöttek. Miután hazaengedtek a kórházból, sajnos eltörtem a bokámat is, melynek következménye, hogy 3 hónapig feküdtem.

2022 május végén a kézfejem még mindig csak korlátozottan tudtam használni, ami azt jelentette, hogy maximum 60 fokos hajlításra voltam képes. Mára ez már 90 fokos és a csuklóm rotációja is tökéletes.

Alvászavar: éjszakánként többször felébredtem, nehezen tudtam visszaaludni, nem voltam képes kipihenni magam. Mostanra az a pozitív változás, hogy bár időnként még felébredek, de szinte azonnal vissza tudok aludni. Sokkal kipihentebben ébredek.

Savtúltengés: éjszaka néha arra keltem, hogy savas „felböfögés” van, mely néha égető érzést okozott a mellkasomban és a torkomban. Ilyenkor öklendeztem is. 12 évig nem ettem gyümölcsöt, mert felvitte a savam.

Nagyon örültem, hogy a javulás minden téren folyamatos volt.

A kúra végére minden problémám megoldódott, ezen felül javult a hallásom is. Nagyon nagy segítségemre volt a Purtier az életminőségem javulásában.

Külsőm megfiatalodott és a bőröm szép lett.



Adagolás:
napi 2 db reggel
2 db este

Kiindulási állapot:

Nagyon rosszul aludtam, már hajnalban felébredtem, függetlenül attól, hogy milyen későn feküdtem le, vagy mennyire voltam fáradt.

Ez azt eredményezte, hogy reggelente már eleve „lemerülve” kezdtem a napot.

Purtier használatának kezdete:

2022. szeptember

Folyadékbevitel:

2-3 L

A Purtier hatásának leírása:

A kúra 4-5. napjától elképedve tapasztaltam, hogy átaludtam az éjszakát! Ez azóta is így van. Jól és pihentetően alszom, a fizikai és mentális teherbírásom a többszörösére nőtt.


Ezen kívül a munkámhoz (a számítógép előtt) és az olvasáshoz, kb. 7 éve egyre erősebb szemüvegre volt szükségem. (borzasztóan utáltam) Ma már elmondhatom, hogy csak a nagyon-nagyon apró betűkhöz kell feltennem a szemüveget. Emiatt legtöbbször azt sem tudom, hol keressem, hol tehettem le napokkal azelőtt. :)

Összehasonlíthatatlanul jobban érzem magam, sokkal energikusabb vagyok, a kedélyállapotom kitűnő.

A külsőm fiatalosabb, az arcom kisimultabb lett. A zöldséges akihez járuk, a közelmúltban megkérdezte, hogy botoxoltattam-e. :)



Adagolás:
2x2 db



ARCÜREGGYULLADÁS

#13

ARCÜREGGYULLADÁS

Ruben, férfi (42)

Kiindulási állapot:

Krónikus arcüreggyulladás és orrsövényferdülés több mint 15 éve, hátfájás, lusta epe, magas fokú vérszegénység, gerincproblémák, szemüveg gyerekkortól, kisebb emésztési zavarok, fázós voltam (régebben én voltam az első, aki felöltözött, ha elkezdett hűlni az idő). Heti rendszerességgel nagyon erős migrénem volt 13 éves koromtól, és csak erős gyógyszertől múlt el (Aulin por 100 mg, előtte pedig Algocalmin 1 g/2 ml/fiola).



Folyadékfogyasztás:

2,5 L víz

Purtiert 2023. május 12.-én kezdtem el szedni.

Adagolás:
napi 2x1 db

Purtier hatása:

Az első 3 napot majdnem végig aludtam.

A hatodik nap elindult az arcüreggyulladás tisztulása, amely 5 napig tartott, ez idő alatt köhögés, lerakódások ürülése történt orron, szemem és szájon keresztül.

Felpuffadtam (ez rendszeres volt azelőtt is) nagyon sok alkalommal, ami nagy fájdalommal járt mindig, viszont a Purtier szedésének megkezdésével a puffadás már fájdalom nélkül zajlott le. Ez az állapot néhány napig tartott és utána elmúlt. Azóta néhányszor még előfordult (mindig a városban fogyasztott ételtől), de fájdalom nélkül és hamar el is múlt. Elindult a testemben egy erős tisztulás. Sokkal többször van székletem, vizeletem és kifogástalan a gyomrom és a beleim működése.

Amióta szedem a Purtiert, nem tudom milyen a hátfájás, sötétedik vissza a hajam, csak néhány migrénem volt. Sokkal több az energiám, jobb a közérzetem, tisztábban és gyorsabban gondolkodom, reagálok. Gyorsabb a reflexem, jól alszom és kipihenve ébredek.

Többen jelezték, hogy megváltoztam, megfiatalodtam és a külsőm is sok pozitív visszajelzést kap.

ÁLLATI TAPASZTALATOK

#15

LÁBREMEGÉS

Boxer, kutya (7,5)

Kiindulási állapot:

Örökbefogadott kutyus. Sajnos nehéz élete volt, emiatt álmában sokszor a fekhelyére vizelt. Lábremegései és csípőproblémái voltak.

Eleinte a kapszulákat egészben kapta. 10 db elfogyasztása után a tünet megszűnt (fekhelyre való vizelés).

Azóta a séták utáni lábremegése is megszűnt, kb. 20 db kapszula elfogyasztása után.

Mivel csípőproblémái is vannak, ezért tovább szedi. Napi 1 kapszulát kap, kinyomkodva, az ételébe keverve.

A Purtiernak köszönhetően állandóan csóválja a farkát, rengeteget mozog, láthatóan boldog!



Adagolás:
Napi 1 kapszula
Összesen 20 db

#16

FERTŐZÉS

Miki, macska (1)

Kiindulási állapot:

Más macskákkal folytatott harcot követően megsebesült, és az egész teste elfertőződött. A gazdák egy állatorvosi klinikára szállították, ahol az orvos megműtötte, de minimális gyógyulási esélyt adott neki.

Adagolás:

napi 1 kapszula 4 napon át, kapszula kinyomkodva, ételbe keverve.

Műtét utáni altatásból felébredt, ezt követően megállás nélkül forgott a ketrechen, mint egy bábjátékos.

A gazdája hallott a Purtierről és megkérte az orvost, hogy adjon be neki napi 1 kapszulát 4 napon át. Három nap múlva az orvos megállapította, hogy Miki gyógyul, és további Purtier kapszulát kért.

A macska mostanra teljesen felépült. Otthon van, egészséges, iszonyatos étvággal rendelkezik. A szőre színe megváltozott és bársonyosabb.

SZÍVNAGYOBBODÁS

Szoty, kutya (15)

Kiindulási állapot: szívnagyobbodás és szívelégtelenség, tüdő teljes bevizesedése, életkorból adódó mozgáskorlátozottság, zsírdaganat

Purtier használatának kezdete: 2023. szeptember vége

Adagolás: kezdetben napi 1 Purtier reggel (kapszulából kinyomva a nyelvére kenve), majd 3. héttől kezdve 2 naponta 1 kapszula tartalma, 3. hónaptól csak heti 1

Purtier hatásának leírása:

Pár nappal a kapszula fogyasztása után elkezdett magától felugrálni az ágyra, amire előtte képtelen volt. Az orvos elrendelt neki szívgyógyszert, amit elvileg élete végéig szedni kellett volna, ez normalizálta kicsit a helyzetet, de a szíve tapinthatóan még nagyon erősen és zörejelesen vert.

A Purtier szedése után pár héttel elkezdett normálisabb szívhangja lenni, a zörej megszűnt. Ezután 2 naponta adtam a Purtiért, majd 2. hónaptól csak hetente 2x.

Az orvos nem kért kontrollt, mert orvosilag ez nem visszahozható állapot volt (csak helyben egy kollégájától kért vizsgálatot, és egymásnak mondták, hogy ez egy erős 3-4-es állapot, és a nézésükből nem sok jóra számítottam...). Látna a kutyus állapotában bekövetkező pozitív változásokat saját elhatározásból elvittem újabb ultrahang vizsgálatra, mert teljesen normálisnak éreztem a szívverését, sokkal jobbnak, mint mikor csak a gyógyszert szedte.

Az ultrahang visszaigazolta, hogy a szíve újra visszaállt a régi állapotra (1 hónappal a rosszullét előtt volt egy ultrahang vizsgálatunk), és a vizsgáló orvos nem értette miért szed ez a kutya gyógyszert. Konzultáltak a kezelőorvossal, aki szintén értetlenül állt és abban maradtak, hogy nem kell tovább szedni a gyógyszert, ez a leleten le is lett írva, ez 2023. november végén volt. Azóta is hihetetlenül aktív, igaz sokat pihen utána, de senki nem hiszi el, hogy ennyi idős, azt hiszik még fiatal kutyus.



Legutóbb egy új kolléga volt a rendelőben, aki beadta a kötelező oltását és rákérdezett, hogy elírás az oltási könyvben a kora (16 éves)?... Boldogan dicsekedtem, hogy nem, tényleg annyi...

Életkedve, mozgása javult, illetve mellkasán bal első lábánál volt egy 1,5 cm átmérőjű jóindulatú zsírdaganat, amely a kapszula fogyasztásának 2 hónapjánál érezhetően el kezdett csökkenni, majd teljesen felszívódott. Jelenleg csak a daganatot körülvevő tok/zacskó érződik tapintáskor.

Nyomtatási adatok:		Telefon/fax:
Dátum: 2023.11.29		
Szívultrahang-vizsgálati lelet		
Tulajdonos adatai:		Állat adatai:
Telefonszám, e-mail cím:		Állat kód: 3104-4833 Név: Szotyí CAVE:Nobivac Faj: kutya Fajta: bichon havanais Szín: fehér-szürke foltos Születés d.: 2008.08.05 Ivar: Hím Ütlevélszám: Ütlevél kiállításának dátuma: 2014.12.04 Mikrochip száma:
		
		Tömeg: 7.50 Kg
Labor klinika, készítő:		
Készítés dátuma: 2023.11.29		
Vizsgálati anyag: Élő állat;		
Ultrahangos vizsgálat:		
Szívüregek téghassága		
Diastolében (D)		
Bal kamra:	normál	34,3 mm
Jobb kamra:	normál	mm
Bal pitvar:	normál	mm
Jobb pitvar:	normál	mm
Systolében (S)		
Bal kamra:	normál	19,5 mm
Jobb kamra:	normál	mm
Bal pitvar:	normál	32,0 mm
Jobb pitvar:	normál	mm
szívizomzat vastagsága		
Diastolében (D)		
Bal kamra fal:	normál	7,7 mm
Kamrai septum:	normál	6,5 mm
Jobb kamra fal:	normál	mm
Systolében (S)		
Bal kamra fal:	normál	11,1 mm
Kamrai septum:	normál	8,7 mm
Jobb kamra fal:	normál	mm
Aorta átmérő: normál		
Aorta/bal pitvar arány: normál		
Aorta átmérő: 15 mm		
Aorta/bal pitvar arány: 1,3		
Ivbillentyűk:		
Mitrális: megvastagodott, regurgitáció		
Tricuspidális: ép, normál áramlás		
Aorta: ép, normál áramlás		
Pulmonalis: ép, normál áramlás		
Kontraktilitás (FS): normál		
Kontraktilitás: 43 %		
Szívburkok: normál		
Pericardialis folyadékütem: nincs		
Szívburkok: normál		
Pericardialis folyadékütem: nincs		
Egyéb:		
Zahang diagnózis:		
Ultrahang diagnózis: Mitrális endocardiosis		
ACVM-B1 kompenzált stádium továbbra is. Kardiológiai kezelést nem igényel.		

GYENGÜLÉS

Német spicc (14)

2023-ban, a 14 éves, 5 kg-s, német spicc kutyám elkezdett bizonytalanodni és sokszor látszott rajta, hogy nem friss.

14 napig napi 1 szem Purrier kapszula beltartalmát kapta juhtúróba göngyölve reggel éhgyomorral.

Kb. a 3. napon már stabilan állt a lábán és az aktivitása visszaállt.

Az állatorvos oltáskor meg is kérdezte, hogy mit adok a kutyának, hogy 14 évesen körülbelül 5 évesnek felel meg az izomzata, fogazata, állapota.

2024-ben, 15 évesen is kapott egy 12 napos, napi 1 szemes kúrát.

Fél évente ismételni fogom neki a kúrát, mert látványosan, erőtől duzzadó lesz (megfiatalodik), amit kb. 6-7 hónapig megtart a tapasztalatok szerint.

A két kúra alapján azt mondhatom, hogy a 4. naptól javul hirtelen az állapota.

A napi edzés (minden nap fut a kézilabdapálya körül sprintet, plusz szokásos játék és séták) és napi táplálkozás állítólag nagyban hozzájárul a jó állapotához, ezért csak minőségi ételt és étrendkiegészítőt kap.

AUTOIMMUN BETEGSÉG

#21

AUTOIMMUN BETEGSÉG

Erika, nő (54)

Kiindulási állapot:

2010 márciusában diagnosztizáltak nálam autoimmun betegséget/rheumatoid-arthritist, ami már két évvel ezelőtt jelentkezett. Reggel ízületi merevséggel a végtagjaimban ébredtem (két láb), váll fájdalommal, illetve a térdem is gyakran bedagadt.

Terméket 2023. július 12-én kezdtem el szedni.

Vízfogyasztás:

napi 3 L

Purtier hatásának leírás:

3. nap után teljesen megszűnt az ízületi és váll fájdalom (ami mai napig tünetmentes), ezért levittem az adagolást.

A szedést követő 15. napon vérvételre mentem. Májusi laborhoz képest 100 egységgel kevesebb volt a reuma faktor. Ezután kivette a doktornő a kezelésből az injekciót és a gyógyszert is, amit 2010 óta kaptam (látható a leleten).

Purtier-nek köszönhetően nagyon jól érzem magam, az évek óta fennálló napi fájdalmak teljesen megszűntek!

A körülöttem lévők is észreveszik a pozitív változást a külsőmön.



Adagolás:
napi 2x2 db

Lelet: 2023.05.02

Mintavétel: 2023.05.02 Párhuzos: 2023.05.02 08:02

További kód:
Cik:

Vizsgálat	Eredmény	Referencia	Mértékegység
HEMATOLÓGIA			
Vérkép automatafelvétel			
Fehérvérszám	5,3	4,4 - 11,3	Giga/L
Vörsvérsejt-szám	4,5	4,1 - 5,1	Tera/L
Hemoglobin	147	123 - 163	g/L
Hematokrit	0,45	0,35 - 0,47	L/L
MCV	100	86 - 96	fL
MCH	33	26 - 33	pg
MCHC	329	310 - 370	g/L
Transzferrin	344	150 - 450	Giga/L
RDW-CV	12,8	11,5 - 13,5	%
MPV	8,7	7,2 - 13,9	fL
Neutrofil granulocita %	48,6	50,0 - 70,0	%
Limfocita %	35,5	25,0 - 40,0	%
Monocita %	12,8	2,0 - 8,8	%
Eozinofil granulocita %	4,6	1,0 - 4,8	%
Bazofil granulocita %	0,8	0,0 - 1,0	%
Neutrofil granulocita #	2,49	2,20 - 7,30	Giga/L
Limfocita #	1,69	1,10 - 4,30	Giga/L
Monocita #	0,87	0,10 - 0,90	Giga/L
Eozinofil granulocita #	0,24	0,05 - 0,45	Giga/L
Bazofil granulocita #	0,04	0,00 - 0,10	Giga/L
KLÍNIKAI KÉMIA			
Glükóz (Rágszint vérvétel)	5,8	3,7 - 6,0	mmol/L
Hemoglobin A1c (HbA1c)	5,3	4,0 - 5,8	%
Hemoglobin A1c (FCC)	46,0	20,9 - 28,9	mmol/mol
Kreatinin	3,9	2,3 - 7,2	mmol/L
Kreatinin	82	46 - 80	mmol/L
α2-MK	70	> 90	mmol/L
Uréa	206	155 - 257	mmol/L
Nitrogén (N)	140	130 - 146	mmol/L
Kálium (K)	4,8	3,5 - 5,1	mmol/L
Kalcium (Ca)	2,48	2,30 - 2,85	mmol/L
Magnézium (Mg)	0,84	0,77 - 1,03	mmol/L
C reakció fehérje (CRP)	2,2	< 5,0	mg/L
Koleszterin	7,3	< 6,2	mmol/L
Triglicerid	1,25	< 1,71	mmol/L
HDL koleszterin	1,80	> 1,17	mmol/L
Nem HDL koleszterin	5,5	< 4,1	mmol/L
Totál bilirubin	13,1	5,0 - 21,9	mmol/L
GOT (ASAT)	16	< 35	U/L
GPT (ALAT)	16	< 35	U/L
Gamma GT (GGT)	36	< 36	U/L
Alkalikus foszfatáz	73	36 - 104	U/L
ENDOKRINOLÓGIA			
Tiroidea stimuláló hormon (TSH)	0,780	0,550 - 4,780	mU/L
IMMUNOLÓGIA			
Vörsvérsejt-szám	27	3 - 21	mmol/L
Autoantitestek			
Reumatoid faktor	419	< 14	U/L
VIZELLET VIZSGÁLATOK			
Vizetel átvizsgálása			
Fehérje	1010	1005 - 1030	g/L
pH	7,5	5,0 - 8,0	
Fehérje	negatív	negatív	
Cukor	negatív	negatív	
Kalcium	negatív	negatív	
Urobilinogén (UBG)	normális	normális	
Bilirubin	negatív	negatív	
Nitrit	negatív	negatív	
Létesítés -> pozitív: 100% -> 1,0; 1,0 -> 2,0			
Fehérje	0	< 4	APF
Vörsvérsejt	0	< 3	APF
Lipid	0	< 7	APF
Bilirubin	0	< 80	APF
Cukor	0	---	APF
Vörsvérsejt (SRG)	0	---	APF

Lelet: 2023.07.27

Művelet: 2023.07.27 Regisztráció: 2023.07.27 09:55

További kód:
Onk

Vizsgálat	Eredmény	Mindehite	Referencia	Mértékegység
-----------	----------	-----------	------------	--------------

HEMATOLÓGIA

Vérkép automatizálva				
Fehérvérszám	7.9		4.4 - 11.3	GigaL
Vörsvérszám	4.4		4.1 - 5.1	TeraL
Hemoglobin	148		123 - 153	g/L
Hematokrit	0.43		0.35 - 0.47	L/L
MCV	99		80 - 96	fL
MCH	34		28 - 33	pg
MCHC	340		310 - 370	g/L
Trombocitaszám	385		130 - 450	GigaL
RDW-CV	12.7		11.5 - 15.5	%
MPV	9.7		7.2 - 13.0	fL
Neutrofil granulocita %	64.8		50.0 - 70.0	%
Limfocita %	24.3		20.0 - 40.0	%
Monocita %	8.2		2.0 - 8.0	%
Eozinofil granulocita %	1.3		1.0 - 4.0	%
Bazofil granulocita %	0.4		0.0 - 1.0	%
Neutrofil granulocita #	5.10		2.20 - 7.90	GigaL
Limfocita #	1.91		1.10 - 4.50	GigaL
Monocita #	0.72		0.10 - 0.90	GigaL
Eozinofil granulocita #	0.10		0.00 - 0.45	GigaL
Bazofil granulocita #	0.03		0.00 - 0.10	GigaL

KLINIKAI KÉMIA

Glikézia (HbA1c) (vércukor)	6.1		3.7 - 5.5	mmol/L
Kreatinin	3.9		2.5 - 7.2	mmol/L
Kreatinin	71		40 - 80	umol/L
aGFR-EPI	83		> 90	ml/min/1.73m2
Nátrium (Na)	137		136 - 146	mmol/L
Kálium (K)	4.5		3.5 - 5.1	mmol/L
C reakív protein (CRP)	4.4		< 5.0	mg/L
Totál bilirubin	15.4		5.0 - 21.0	umol/L
GOT (ASAT)	18		< 35	U/L
GPT (ALAT)	21		< 35	U/L
Gama GT (GGT)	58		< 38	U/L
Alkalikus foszfatáz	91		35 - 104	U/L

ENDOKRINOLÓGIA

Tireoides stimuláló hormon (TSH)	0.540		0.550 - 4.780	mIU/L
Szabad T4	18.1		11.5 - 22.7	pmol/L

IMMUNOLÓGIA

Vörsvérsejt alányedés	27		3 - 21	mm/óra
Autoantitestek				
Rheumoid faktor	311		< 14	U/ml

Ismeretlen vizsgálat

VIZSELY VIZSGÁLATOK

Vizselet állatfaj	1015		1005 - 1020	g/L
Faj	6.5		5.0 - 8.0	
pH	negatív		negatív	
Fehérje	negatív		negatív	
Cukor	negatív		negatív	
Kalcium	negatív		negatív	
Urobilinogén (UBG)	normális		normális	
Bilirubin	negatív		negatív	
Alb	negatív		negatív	
Létesítés -> mikroszkop átvizsgálás: THPF => 0,04; LPP => 2,54				
Fehérjeszűrő	0		< 4	APF
Vörsvérsejt	0		< 3	APF
Laphámsejt	0		< 7	APF
Baktérium	8		< 80	APF
Ciliár	0		—	APF
Vesehámszűrő (SRG)	0		—	APF

Ambuláns lap: 2023.08.02

AMBULÁNS LAP

Név: TAJ: Anyja neve: Bektűdő orvos: Születési hely, idő: Naplószám: Lakcím: Térítési kategória: I magyar biztosítás alapján végzett ellátás Dátum: 2023. augusztus 02.

2022.12.07.
2010. óta ismert RA miatt korábban Szécskefehérváron kezelte, majd 2020. óta kezelte az eddigiekben, legutóbb 2021. májusban járt intézetünkben. Később magrendelésen kezelték. Heti 20 mg Namaxirt és napi 1 Plaquenilt szed.

2022.11.07.
Jelenleg ízületi panaszai fokozódnak. Statusában 6 nyom érz., 5 duzzadt izülete van. We: 28 mm/h. VAS: 80, DAS28: 5,1. A jobb kéz IV. PIP és jobb könyök felett kis rh csomó. Vél: betegsége aktív. Biol th javasolt. Az 1. állapotfelmérés megtörtént, vérvételek történtek. Pulm és kard beutaló kiadva. Lefetekkel kontroll. Addig th ideig. Fizioth céljából felvétel javasolt, osztályos felvételt nem tud vállalni. A ter ill. szakrendelőben fizioth javasolt.

2023.05.03.
Namaxir és Plaquenil mellett aktív RA miatt biol th-t tervezünk. 2. állapotfelmérésre érkezik. RF és a-CCP magas titerben poz, QF neg, pulm ellenjavallat nincs. Infect szerolban HAV, HBV, HCV szeroneg, HEV lezajl fertőzés nyoma. A Lukács Fürdőben kap fizioth-t, emellett panaszai enyhülnek. 2023.05.02. We: 27 mm/h, vérkép, kémia, vizelet releváns eltérés nélkül. A DAS28 körbe tartozó izületek közül 4 nyom érz., 3 duzzad. VAS: 40, DAS28: 4,4 Vél: a betegség aktivitás csökken. A biol th-val várunk. Gyógyszereit felírjuk. HBV immunizáció javasolt Engerix-szel a gyorsított séma szerint 0 7 21. napon, melynek beadására háziorvosát kérjük. Kontroll 3 hónap múlva.

2023.08.02.
Július 12-én Riway nevű gyógynövény terméket kezdett, mely mellett ízületi panaszai megszűntek, a Namaxirt és a Plaquenilt is elhagyta. Jól van. 2023. 07., 27. We: 27 mm/h, vérkép, kémia releváns eltérés nélkül. A DAS28 körbe tartozó izületek közül duzzadt 0, 1 nyom érz (jobb könyök), VAS: 0, DAS28: 2,86. Vél: betegsége a gyógyszerrel melletti remisszióban van. Kontroll ősszel.

Diagnózis: M0690 Rheumatoid arthritis, k.m.n.

Kiindulási állapot:

2022 augusztusban kezdődött a történetem azzal, hogy a csuklóim elkezdtek fájni, majd aránylag rövid idő belül (2-3 hónap) átteperedett a fájdalom a testem összes ízületére.

Eleinte nem vettem komolyan, és nem is vagyok orvoshoz szaladgáló, így az alternatív gyógymódok felé fordultam. Nagyon sok módszert kipróbáltam, főleg azokat, amiket az interneten találtam. Ezek csak ideig óráig segítettek, inkább csak órákig. Mivel a fájdalom erősödött, a lányom és a barátok unszolására novemberben elmentem kivizsgálásra. A leletek alapján a főorvos professzor kimondta az ítéletet: gyógyíthatatlan autoimmun sokizületi gyulladás, ami szteroidokkal szinten tartható, de meggyógyulni nem fogok. A fájdalmaim enyhítésére elfogadtam a szteroidos kezelést, lényegesen jobban is lettem. Két és fél hónapig szedtem a hetente emelkedő dózisu szteroidokat, de a mellékhatásai miatt- az orvosi utasítás ellenére- abbahagytam. Amíg tartott a hatás addig jól voltam, de egy hónap múlva felerősödtek a tünetek. Újabb, másfajta alternatív gyógymódokat kerestem, de már fájdalomcsillapítókon éltem.

Tapasztalatom a termékkel:

Amikor 2023 novemberben találkoztam a Purtierrel, már nagyon rossz állapotban voltam. Ha álltam nem tudtam leülni, ha ültem, nem tudtam felállni, nem tudtam vezetni, menni, élni. A veseműködésem a sok fájdalomcsillapító szedése miatt szinte leállt, a lábaim vizesedtek, ami még nehezebbé tette a mozgást.

Az információs előadáson, ahová egy ismerősöm hívott meg, bemutatták a Riway céget és a terméket, aztán azok következtek, akik már szedték a Purtiert. Egy hölgy felállt és szóról szóra elmondta az én történetemet, amit leírtam. Elmondta, hogy beszédett egy 6 hónapos kúrárt, most egy városnézésen tizenötvezret lép, hogy mászik az unokája után. Meggyógyult.

Tudtam, hogy ez a készítmény nekem kell, és azonnal rendeltem is.

Adagolás: naponta reggel 1- este 1 kapszula

Két hét után helyreállt a vese működésem, két hónap után eltűntek az öregeségi foltok a kezemről, a vándor szemölcsök leestek, egy visszerem eltűnt a lábamon, a fájdalmaim csökkentek. Öt hónapja szedem a Purtiert, az összes ízületemben megszűnt a fájdalom, illetve a bal térdem még nem tökéletes, de teljes életet élek.

BŐRBETEGSÉG

#27

VITILIGO

Katalin, nő (89)

A Purtier kúra befejezése után tűnt fel, hogy a karomon lévő Vitiligo foltok elhalványultak, szinte teljesen eltűntek. Ez egy ajándékhatás a terméktől!



#28

PSORIASIS (PIKKELYSÖMÖR)

Dorottya, nő (39)

Kiindulási állapot:

Genetikailag a családukban mindig is jelen volt apai ágon a psoriasis (pikkelysömör) bőrprobléma. Nálam 2010-ben kezdődött, édesapám halála után jött elő. Ekkor bőrgyógyász által kikevertetett gyógyszerári készítménnyel kellett kezelnem az érintett bőrfelületet (könyök, térd és hajas fejbőr). Mivel ekkor még kezdetleges volt a probléma, csak apró plakkok formájában volt jelen. Fontos volt a bőr hidratáltsága, amit be is tartottam, tartok a mai napig.

2015-ben volt egy nagyon komoly fellángolásom, mely miatt a pikkelysömör betérítette a testem. Orvosról-orvosra járva, mindent kipróbálva semmi sem hozott javulást. Használtam szteroidokat, enyhén savas ecsetelőket, gyógyszerári és kikevert készítményeket, külföldi kozmetológiai termékeket, samponokat, sós fürdőt alkalmaztam stb... Hónapokkal később eljutottam egy doktornőhöz, aki allergia teszttel megállapította, hogy a napraforgó és egyéb olajok nem jók a szervezetemnek. Ezért ő azt javasolta, hogy szűz olívaolajat vagy kókuszszírt használjak, továbbá heti rendszerességgel iktassam be az életembe a szoláriumozást, hiszen a fény jó hatással van a betegségre.

Ez a kezelés 6 hét elteltével a hajas fejbőr kivételével, eltüntette a pikkelysömört a bőrömről. Azóta is olívaolajat használok, rendszeresen járok szoláriumba, ennek ellenére a fejbőrömön 14 év alatt elterjedt. Ami viszont 14 év elteltével elmondható, hogy nagyon sok mindent kipróbáltam, mégsem hozott javulást semmi.

Adagolás:

1-3. nap napi 1x1 kapszula; 4-11. nap napi 2x1 kapszula; 12-14. nap reggel 2 délután 1 kapszula; 15. naptól kezdve napi 2x2 kapszula jelenleg is. Idén áprilisban egy kedves kolléganőm által ismerkedtem meg a Purtier kapszulával és kezdtem el szedni.

Purtier hatásának leírása:

A kapszula már egy hét elteltével javulást hozott, hiszen tisztulni kezdett a fejbőröm. A plakkok elkezdtek vékonyodni, nem rakódik rá újabb és újabb réteg. Az érintett területen a sérült bőrfelület elkezdett összehúzódni és már sok helyen van ép, pikkelyektől mentes bőr. Mielőtt elkezdtem volna használni a terméket, lefotóztuk a fejbőrömet és ezt hetente ismétljük.

2024.04.22



2024.06.25



#30

CUKORBETEGSÉG

#31

Kiindulási állapot:

35 évvel ezelőtt két komoly műtét daganat miatt, cukorbetegség, nem megfelelő vérnyomás, magas koleszterinszint, lába egyfolytában fel volt dagadva, szívprobléma, nyaki ütőér meszesedése, nem tudta a fejét az ég felé fordítani, mert annyira szédült.

Purtier használatának kezdete: 2023. július 16.

Gyógyszerek előtte:

- Rozuva -Teva- 20mg 1x1
- Ezetrol- 10mg 1x1
- Carvol- 12,5mg 2x1
- Hypotiazid - 25mg 1x1
- Esomephrasol- 40mg 1x1
- Gliclada- 30mg 1x1
- Milurit- 100mg 1x1
- Elenium
- Clopidep- 75mg 1x1
- Karbis- 8mg 2x1
- Tensiomin 25mg - 150-es vérnyomás fölött 0,5 tableta

Megmaradt gyógyszerek a 4. hónap után:

- Karbis 8mg 1 x 0,5
- Clopidep 2 vagy 3 naponta 0,5 tableta
- Tensiomin 25mg- 150-es vérnyomás fölött 0,5 tableta

Adagolás:

Napi 1 kapszula, a nyelv alá helyezve (nyálkahártyán keresztül felszívódva).

Vízfogyasztás:

2 liter naponta.

Kúra elején felerősödtek a tünetek az összes problémánál. 3 napig feküdt és nagyon szédült. Viszont három nap után a szédülés teljesen megszűnt. Este azt vettük észre, hogy mereven figyeli az égbolton a csillagokat. Valószínűleg lényegesen több oxigént kap az agya. Volt pár napos fejfájása is, majd ez is elmúlt.

Lábdagadás kb. 15 éve tartott, mindennap. Már reggel 9 órakor nem látta a bokáját, talpa 6-7 óra körül zsibbadt. Menni tudott, de rettenetesen zsibbadtak a lábai. Volt olyan (többször), hogy autóban ülés (Budapest-Debrecen táv) után le kellett vágni a papucsot a lábáról. Miután elkezdte használni a terméket, ez a probléma szinte teljesen megszűnt. Pl. a 3. hét után egy nap 750 km autós túra után simán lejött a lábáról a papucs, nem volt dagadás és fájdalom sem. Ez a mai napig nem tért vissza.

Éhgyomri vércukra 5,2 mmol/l körül mozog minden diéta nélkül. Cukorgyógyszerét teljesen elhagyta.

Vérnyomáscsökkentőből 1,5 helyett csak fél tablettát szed.

35 év után elmúlt a kezében a napi szintű zsibbadás, ami annak volt köszönhető, hogy annak idején eltört a válla. Ez a tünet is teljesen megszűnt. Kellemesen fogyott mindenhol, ahol „löttyedt” volt a bőre, feszes lett. Vékony visszerek teljesen eltűntek, a kisujjnyi visszerek pedig besimultak a bőrbe.

Szemüvegét elhagyta tévé nézéshez is.

Látványos a javulás, jól érzi magát és pozitívan néz a jövőbe, köszönhető a Purtiernak!

Cs#



CUKORBETEGSÉG

Levente, férfi (68)

Kiindulási állapot:

Cukorbetegségem 2016 óta van, akkor 23-as mmol/l éhgyomri vércukorszinttel kerültem kórházba. Ezután napi 4x szúrtam inzulint. Csípőfájdalmam 2 éve van.

A Purtier szedésének kezdete: 2022 szeptember eleje

Gyógyszer: inzulin - Xultophy 100/3,6. Napi 4x.

Folyadékbevitel: naponta 3 liter víz

Rettenetes csípőfájdalmam volt a forgónál (belenyilalt és ez kisugárzott bokáig) sajnos a munkámban is nagyon gátolt ez a probléma. Bal lábszáram kezdődő reumás tüneteket mutatott, hatalmas fájdalommal járt. A Purtiernek köszönhetően ezek a problémák teljesen megszűntek, újra aktívan tudok dolgozni.

Az inzulint 6 hónap után fokozatosan levittem. Kontrollon beleírták a zárójelentésbe, hogy saját felelősségre alternatív megoldást használok. Most 6-7 mmol/l között mozog diéta nélkül az éhgyomri vércukorszintem.

Kezemen teljesen megszűnt a pszoriázis.

Határozott javulást vettem észre mindenben, energikusabb vagyok, jól érzem magam, teherbírásom a régi (mint 35-40 évesen). Az alvásminőségem is nagyban javult, kipihenten ébredek. Még mindig használom a Purtiert (2. kúra) és bízom az egészségem további javulásában!



Adagolás:

4 napig 2x1, majd 2x2; 3-5. doboz 2x3; 6-7. doboz 2x1



Kiindulási állapot:

23 éve az I-es típusú (saját inzulinnal nem rendelkező) cukorbeteg-csoportba sorolt a diabetológus, azóta kénytelen voltam inzulint adagolni magamnak, akkoriban éhgyomri vércukor értékem 20 mmol/l felett mozgott. A vércukorszintemet gyógyszerrel és inzulinnal sem tudták beállítani. Folyamatosan ugrált, erős diéta mellett is. Napi inzulin dózisom összesen 72 NE körül volt. Az egészségi állapotom fokozatosan épült le, 10 éve a jobb szememre megvakultam. Mind a két lábamon a második lábujjamat levágták. Vérnyomásproblémáim lettek (170-es), szív- és érrendszeri panaszok. Tavaly levágták a bal lábamon a következő ujjat. Sajnos mostanra leállt a vesém és dialízisre járok.

Purtier kezdete: 2022. május

Gyógyszer: 23 éve inzulin és gyógyszer, egyikkel sem tudták stabilizálni a cukrot.

Elkezdtem szedni a Purtier-t és a vércukorszintemet naponta többször mértem, figyeltem a szervezetemet. Fokozatosan saját felelősségemre 1-2 hónap után elkezdtem csökkenteni az inzulin mennyiségét, majd pedig teljesen elhagytam.

2023 február/március táján befejeztem a második kúrát, feltételezésem szerint a hasnyálmirigyem olyan mértékben regenerálódott, hogy újra termeli az inzulint! Összegezve elmondható, hogy május óta mindenféle cukorgyógyszer és inzulin nélkül élek. Az éhgyomri vércukorszintem 5-6 mmol/l körül mozog. Bízom benne, hogy a kapszula megállította a további belső-szervi károsodást a szervezetemben, attól függetlenül, hogy azóta a vesém is leállt (valószínűleg azt már nem tudta regenerálni).

Purtiernek köszönhetően újra van jövőképem!



Adagolás:

1x1 db, fokozatosan felemeltem 2x2 db-ig

Kiindulási állapot:

2010 óta fennálló 2-es típusú cukorbetegség

Kezdetben állandóan szomjas volt és sokat vizelt. Általános kivizsgáláson vették észre, hogy cukorbetegsége van. Covidot követően felment az éhgyomri vércukorszintje 20-22 mmol/l, amit az inzulin sem vitt le, és a diéta sem segített. Erős vércukorcsökkentő tablettát kapott az inzulin helyett.

Covid után kihullott a haja, elkezdtek mozogni a fogai és egyre gyengébb lett, határozottan rosszabbodott az állapota.

Adagolás:

Napi 1 kapszula, aztán 2, majd 3 kapszula naponta. 1 hónap után 2x2. 1,5 hónapig szedte így, aztán levittük fokozatosan 3 db-ra, majd 2-re

Vízfogyasztás:

Kb. 1,5-2 L vizet iszik

Purtiert 2022 december 26.-án kezdte el használni. Május 30.-án fejezte be a kúrát.

Amíg nem kérdezték meg, hogy változott-e a fogainak az állapota, addig észre sem vette, hogy már nem mozog.

Az orvos kicserélte az erős cukorgyógyszert gyengébbre. Nem diétázik, mivel napi 12 órán át fizikai munkát végez és szüksége van az erőre, lendületre és munkabíráásra. Sokkal fittebb és fiatalosabb lett.

Éjszakai vizezési problémái mára megszűntek, korábban volt, hogy 5-6 alkalommal ébredt fel emiatt. Ma már csak 1x kell, hogy kimenjen.

Haja visszanőtt, újra pozitívan áll az élethez, rengeteg az energiája és fáradhatatlan.



Kiindulási állapot:

30 éve cukorbetegként élem az életem. Az éhgyomri vércukor szintem a Purtier szedése előtt 9-10 mmol/l körül mozgott. A Purtier szedése után rövid idővel 16 mmol/l éhgyomri vércukor szintet is mértem. A kapszula szedését más Purtier-t használó cukorbetegek tapasztalata alapján nem hagytam abba és szerencsére az éhgyomri vércukorszint a korábbinál is lejjebb ment.

Most a 3. dobozt fogyasztom, a cukorszintem továbbra is jobb a korábbinál.

A magas vérnyomásomat kísérleti fázisban lévő, folyamatosan változtatott gyógyszerekkel próbálják beállítani.

Évek óta szédültem, ez a tünet a Purtier szedése óta határozottan elmúlt.

Adagolás:

- 1.doboz: napi 1-1 kapszula
- 2.doboz: napi 2-2 kapszula
- 3.doboz: napi 2 kapszula (vissza kellett vennem napi 4- ről, mert megugrott a cukrom).

A Purtier szedésének kezdete:

2023 július.

Vízfogyasztás:

2,5-3 L/naponta.

Nagyon jól érzem magam, lelkileg kiegyensúlyozott vagyok, nem fáj a fejem. Eddig nehézkesen ment a felállás, most már felugrok, mint fiatal koromban. Sokkal fittebb, energikusabb vagyok.

Használok a Conscientious permetet is, amellyel a következő a tapasztalatom: nagyon erős gyulladás volt a bal fülemben, ami azt jelenti, alig tudtam hozzáérni fülpiszkálóval. Befújtam a permettel 3x és meglepetésemre másnapra teljesen eltűnt a fájdalom (gyulladás), ami azóta sem tért vissza.

Kiindulási állapot:

2021 őszén cukorbetegséget diagnosztizáltak nálam, 21 mmol/l-es éhgyomri vércukorszinttel, jobb lábon kezdődő üszkösödéssel. Kórházban rögtön kezelni kezdték a II-es típusú cukorbetegséget, hagyományos módon, gyógyszerrel és napi négyszeri inzulinnal. A kezelésre viszonylag nehezen reagáltam, a cukorszint csak lassan csökkent és a kórházi kezelés alatt nem ment 8 mmol/l alá. Közben sajnos három lábujjamat amputáltak. A kórházból elbocsátás után egy másfajta inzulinnal és a magam által kialakított étrenddel néhány nap alatt normál cukorszint állt be. Az elért eredmények ellenére 2022 februárjában a bal láb öregujja is üszkösödni kezdett. Étrendemen tovább változtattam húsmentes ételekre, illetve többnyire nyers táplálékra. 2022 áprilisában amputáltak a bal láb üszkösödő lábujját is, amit már rossz általános állapotban 59 kg-os súllyal éltem meg. Hazabocsátás után nehezen javult az egészségem. Sajnos nem tudtam hízni, fizikailag gyenge, pszichésen pedig nagyon rossz állapotban voltam.

A Purtier-t 2022.08. 01.-én kezdtem el szedni.

Adagolás:

első hét 2x1 kapszula, második héttől 2x2 kapszula, majd pedig tovább emeltem egészen 2x3 kapszuláig.

Vízfogyasztás: 2-2,5 L



A kúra kezdetétől számítva kb. 2 hét múlva már érezhetően jobban voltam lelkileg, világosabb gondolataim voltak. A fizikai állapotom is intenzíven javult, a súlyom jelentősen gyarapodott, mostanra 72 kg vagyok. Az első kúra befejeztével abbahagytam az inzulin használatát mai napig normál értékeket mutat a vércukorszintem az egészséges táplálkozás mellett. Nagyon fontosnak tartom leírni azt, hogy egy következő lábujj üszkösödését már vissza tudta fordítani 2023 tavaszán a Purtier (a lábujj hajszálereiben újra beindult a vérkeringés). Ezzel az egész életem úgy érzem új irányt kapott. Elmondhatatlan boldogság számomra „újra” csodás terveket szőni és minden nap úgy ébredni, hogy van jövő. Nagyon jól érzem magam, tele vagyok erővel és energiával. Aki látott betegen, nem hisz a szemének, mert annyira pozitív a változás külsőleg is!

Ambuláns lap: 2023.04.26.

AMBULÁNS LAP

Név:		TAJ:	
Születési hely, idő:		Sorszám:	2033000957
Anyja neve:		Vizsgálószám:	000000957
Lakcím:		Vizsgálat kezdete:	2023.04.26. 08:21
Továbbküldés:	00 - Továbbküldés nem történt	Vizsgálat vége:	2023.04.26. 09:13

Beküldő intézet:

Beküldő orvos:

Bemutató Dp.: Az első végtag fckélye, m.n.o. L97H0

Anamnézis:

B.o. heresérv.

2022 áprilisában a Szt. Imre Kh-ban a bal árgujját amputálták; TE; Hypertonia;

2021 óta;Diabetes:2021 óta, azonnal insulinnal; Lipidek:2021 óta; Card. események:0 Egyéb, gyógyszeres kezelést igénylő,tartós betegségek:izótopek;

Angiológiai előzmény:

2021 okt-ban, diab. felfedés kapcsán CTA mko multifocalis AV-i art. scler. folyamatot igazolt, tágtítás és STENT a jobb AV-on, (jobb o. iliac extr. PTA és stent) a Szt. Imre Kh-ban, a jobb II-III-IV. ujjá amputációra került;

2022 febr-ban angiographia a bal AV hallux gangrena miatt, a tágtítás (bal . fem-popl. occlusio recanalizatio ballonnal- peronea felső harmada sikeres volt, de a tib. ant és post nem volt megnyitható) a periférián nem volt eredményes, végül a bal hallux amputációra került 2022 áprilisában;

2022. 06. 13. Bejárással Vessel due infusio kezelésben részesült - ezt követően begyógyult a bal o. hallux amputatio hege .

2023. 02. 16-03. 01-ig bejárással Alprestril infusio kúrást alkalmaztunk . A bal II lábujj distalis perccének gangraenája váladékozott, a váladékozás megszűnt , nyugalmi panaszok megszűntek .

CT angiographia alapján intervencios radiológiai kezelésre a GOKVI-ba irányítottuk , azonban a lakcím miatt (életvitelszerűen Budapesten él , de nincs bejelentkezve) ennek rendezése folyamatban van .

Nicotin:2005 óta nem,előtte 30/die. 1980 óta; coffein:1x; alcohol:alkalomszerűen;

Gyógyszerérzékenység: nem ismert;

Jelen gyógyszerek: 1x10 E Xultophy Noclaud 2x50 mg , Clopidogrel 1x75 mg, Xeter 10 mg ,3x1

Neo-Ferro-Folgamma; 500-0-1000 mg Metformin;

A javasolt. statint nem szedi.

Jelen panaszok .Érsebészeti konzilium azóta nem történt meg , a bal o. II lábujj distalis 2 perce spontán amputálódott , alapja sarja , nem fluctuál , környezete békés . Nyugalmi fájdalom nincs . .

status : O2 sat : 97%

a jobb AV II-III-IV. ujjá amputált, a műtési terület a II lábujjcsont feletti hosszanti vasos hypokeratosis mko kisebb varicosus tárgulatok, jobb o. talpi régióban kb 0,5 cm-es kemény tapintatú clavus

a bal árgujj amputált, az amputációs heg békés bal o . II lábujj distalis perccén perce amputálódott a heg alapja sarjad , Mko. enyhe VSM varicositas

Mko. ADP nem tap , mko. ATP nem tap , bal o. a. fem. nem tap , zőrej nem hallható , jobb o. a. fem tap. zőrej nem hallható , mko. a. car. tap. zőrej nem hallható .

CW Doppler vizsgálat : Jobb o Bal o .

ADP	280	150
ATP	280	170
felkar :	180	180

Hgmm

Jelen fizikalis vizsgálat és CW Doppler alapján Mönckeberg sclerosis , bal o. alsó végtagi obliteratív verőérbetegség , a bal o. II lábujj spontán amputatio utáni állapot . bal o. hallux amputatio utáni állapot , jobb o II-III-IV. lábujj amp. utáni állapot mellett , az ismert Diabeteres angiopathia , Varicositas , chr venas insuff

Javasolt a beállított Noclaud 2x100 mg, Clopidogrel 1x75 mg. Xeter 10 mg folytatása , orthopéd cipő viselése. napi 2x600 mg Thiogamma alkalmazása

Jelenleg stabil járásképesség , dysbasbias panaszja nincs . jelenleg a jogosítvány meghosszabbításának angiológiai kontraindikációja nincs .

Megállapított diagnózis:

L97H0 Az első végtag fckélye, m.n.o.

I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosis

G6320 Diabetes polyneuropathia (E10-E14+ köztűs .4 negyedik karakterrel)

Vizsgálatok:

89442 Pulzoxymetria

11041 Vizsgálat

3616A Doppler áramlás vizsgálat a felső végtagon

3616B Doppler áramlás vizsgálat az alsó végtagon

Felírt gyógyszerek:

THIOGAMMA ORAL 600 MG FILMTABLETTA / 60x

2x1

I. (Unam)

buborekcsomagolásban

Ambuláns lap: 2023.04.26.

Ambuláns lap



Páciens neve:
Anyja leányk. neve:
Születési dátum:
Állandó lakcíme:
Oszály:
Beküldő:

(HUN) TAJ:
Sz.név:

Generált kód: OT27IR
Tér.kat.: 01

Sorszám: 28

Jogviszony: A TAJ érvényes, jogviszonya rendezett
Vizsgálat ideje: 2023.04.26. 12:22 Elátás azonosító: 21001788

Kórelőzmény:

Korábban már előfordult magasabb vércukorérték, de laborban évek óta nem járt. vércukorértékek otthoni mérésekkel 7 mmol/l körül voltak. 2021. szeptember közepétől mért 13 mmol/l körüli cukrokkal. 2021. nyarán lábfejdálmak, majd a II- ujon seb jelent meg. 2021.09.28.-10.08. között Szt Imre kh. Angiológián kezelés, dg. végtagi ütőerek atheroscleroticus, Fontaine IV. st., üszkösödés. Hypertonia, Atheroscler., IDDM. HGAc 11% volt, négyeszeri inzulinkezelés beállítására történt Actrapid, Insulatard inzulinokkal. 09.30-án alsó végtagi CT angiographia történt, mely j.o. art. iliaca ext. kp. harmadszubsztalis, 60% körüli szűkülettel igazolta, jobb a. fem. spf. kp. harmad. sign. szűkületet okozó részben légy plekk, distalisabb szakaszon multifokális, 50% körüli stenózisok... mesze látható erek, art. tib. post. elzáródott. Bal o. a. fem. spf. 50% körüli stenózisok, bal a. popl. occludált, a. perone. coli. nól telődés, ATP occludált. vasíhiányos anémia miatt széket vér vázq. vérzés nem igazolódott, vaspótlást javasoltak, anémiát hónapok óta fennálló gyull.-al magyarázták. Tovább anemizáció esetén gastroint. kivizsg. javasolt. 10.05-én jobb o. iliaca exir. kőgócú sign. stenózisok lágtatása, stantibehelyezés történt. majd sebészetre helyezték át, ahol gangraenás lábujjak (jobb láb II-III, IV) amputációja történt. Metformin fokozatos beállítását kezdték, majd inszulinkezelés deescalációját javasolták, 12 E Xultophy beállításával Synjardy 5/1000 mg beállítását is javasolatta diabetológus metformin után, de ezt tekintettel a. verébetegegre, amputációra nem javasoltam- így nem kezdte le.

2021.09.28-10.08. Szent Imre Kh. /Záró/
Két hónapja progresszív jobb II-III-es lábujj gangrena és novum diabetes miatt vették fel Angiológiára. A gangrenás lábujjak amputációját elvégezték.
2022. 02.25-03.11. Szt. Imre KG. Angiológia bal hallux és II-III lábujjak váladékozó sebé miatt került felvételre.
03.08-án bal a. fem.-pol. occlusio recanalizatio történt ballonos tágítással.
2022.04.08.04.11, közt bal láb gangraenás I. lábujj amputációja történt.

2023.02.16-03.01- között DPC Belgyógyászatán kúraszerű kezelés, a bal o. II lábujj duzzanat miatt érsebészeti vizsgálatra a GOKVI érsebészetre irányították.
CTA után az eredményről függően érreconstructiót javasolt.
Vessel due infusios kezelést kapott 3 alkalommal, napi bejártással, majd Alprestilre tértek át.
Gyógyhajlam megindult. a nyugalmi fájdalom megszűnt, a II lábujj gangraena száraz, necroticus felszínű és demarkálódóban.

Jelen th. reggel 500mg, este 1000mg Meforal (metformin), 1x10 E Xultophy (jelenleg nem adja), Noclaud 2x50 mg, Clopidogrel 1x75 mg, (Xeter 10 mg), 3x1 Neo-Ferro-Folgamma;
A javasolt. statint nem szedi, Xultophyt is ebbelygia.

Vélemény:

A beteg vércukor-és HGBa1c értékei kissé emelkedtek, javaslom az elmaradt Xultophy visszaállítását vagy a lh. kiegészítését GLP-1 analoggal.
Külső segítségel igénylő hypoglycaemiája még soha nem fordult elő, így jogosítvány meghosszabbításának diabetológiai ellenjavallata nincs.

Javaslat:

Jaav.th. reggel 500mg, este 1000mg Meforal (metformin), 1x10 E Xultophy, Noclaud 2x50 mg, Clopidogrel 1x75 mg, (Xeter 10 mg), 3x1 Neo-Ferro-Folgamma;

2023.04.25.	Vérnyomás
vércukor 8,8	Fv 5,4
HgbA1c 7,3%	Vrt 4,9
KN 5,4	Hgb 143
Kreatinin 72	Htk 0,43
eGFR > 90	Trombocita 159
Húgysav 439	Vizelet
Na 140	cukor neg
K 4,4	aceton neg
Mg 0,84	
vas 19,8	2023.03.01
transzferrin 2,25	KN 5,2
ferritin 186	Kreatinin 72
Koleszterin 4,5	eGFR > 90
HDL 1,20	Na 140,2
LDL 2,76	K 4,28
nonHDL 3,3	SGOT 12
Triglicerid 1,16	SGPT 18
SGOT 20	GGT 13
SGPT 16	CRP 9,9
GGT 16	Vérkép
CRP 6,2	Fv 5,25
TSH 1,53	Vrt 4,40
	Hgb 127
	Htk 0,38
	Trombocita 188

Kiindulási állapot:

II-es típusú cukorbetegségben szenvedek, keringési, felszívódási problémáim vannak, továbbá laktóz intolerancia és ízületi panaszok.

2022 elején Covid fertőzés után az alábbi post covid tünetek jelentek meg nálam: fulladásos köhögés, memóriavesztés.

2022 június elején kezdtem el fogyasztani a Purtiert.

Adagolás:

Eleinte napi 1 kapszula néhány napig, majd 2x1 kapszula, az utolsó doboznál ismét napi 1 kapszula elszopogatása nagyon bevált (nyálkahártyán keresztül felszívódás). Tartottam néhány hónap szünetet, a második szettet is napi 2x1 kapszulával folytatom.

Folyadékbevitel:

sajnos csak kb. 1 litert víz naponta.

Főként a Covid utáni fulladásos köhögés miatt kezdtem el fogyasztani a terméket, ami rövid időn belül teljesen megszűnt és azóta sem tért vissza.

A kúra elején az ízületi fájdalmak felerősödtek, majd idővel enyhültek.

A vércukorszintem ingadozott, de a terápia végére kissé javult, bár szigorú diétát nem igazán tartok. Az első hetekben nagyon aluszékony voltam.

Mára már elmondhatom, hogy a memóriazavarom kissé javult. Sokkal energikusabb vagyok, jól érzem magam, de a szívbetegség, cukorbetegség és a felszívódási zavarok miatt folytatom a kúrát.

Egészségügyi kihívásaimban sokat segített a Purtier!



Adagolás:
1x1 db, majd 2x1 db

DAGANAT

#43

EMLŐDAGANAT

Zsuzsanna, nő (53)

Kiindulási állapot:

2017 szeptember: III-as stádiumú emlődaganat, áttét nélküli (2cm dudor, invazív - fél éves túlélési időt jósltak az orvosok).

A biopsziát elvégezték, így állapították meg a problémát, de műtetre nem került sor. Alternatív módon kezeltem magam, gyógyszert nem szedek.

2022 novemberében kezdtem el a Purtier használatát. Ekkor 4,5cm volt a daganat, ráadásul fekélyes is (vérzett és gennyes váladék folyt belőle).

Karácsonyra már javult az egészségügyi állapotom (kevesebb volt a váladék mennyisége is).

Május - júniusban abbamaradt a váladékozás, részben behegedt a seb, és folyamatosan húzódik össze. Most a 7. doboz tartalmát fogyasztom.



Adagolás:

1-3 hónap: 1x1 db;

4. hónaptól: 2x1 db; majd 1x1 db

Ami még számomra fontos, hogy az éjszakákat átalszom, sőt amióta szedem a kapszulát, minden nap ebéd után is alszom 20 percet (kívánja a szervezetem), viszont este nem vagyok fáradt. Két munkahelyen dolgozom, aktív társadalmi életet élek, önsegítő kurzusokra járok.

Kedélyállapotom nagyon jó, pozitívan gondolkodom. Mentálisan nagyon sokat segített rajtam a kapszula, amit a külsőm is tükröz.

A jövőben folytatom a következő, második kúrát, amit napi két kapszulával tervezek elfogyasztani majd. Számomra most ez a termék adja meg a kellő biztonságot, hogy hozzájussak a megfelelő vitaminokhoz, és az összejt terápiás hatásával begyógyítsam a sebet a daganat helyén, egészséges és aktív életet éljek.

MÉHDAGANAT

Magdolna, nő (51)

Kiindulási állapot:

Méhdaganat, amely 2022 októberben derült ki

Tünetek:

Túl erős vérzések, rendszertelen menstruáció, II-es stádiumnál észlelt, de időben észrevett daganat, mióma.

Októberben a tumormarker dagana-
tot jelzett, amit a novemberi minta-
vétel igazolt, és megállapították, hogy
II-es stádiumú daganatom van, amire
műtétet javasoltak. A Puriert 2022.
december 11-én kezdtem el használ-
ni. Január 6.-án készült újabb tumor-
marker, amely már normál értékeket
mutatott!

Január 17.-én volt a műtét. Az operáció után a szövettani eredmények
alapján visszaminősítették I-es stádiumúra a daganatot, és nem kellett
sugárkezelésre sem mennem.



Adagolás:

Napi 3x2

Most 1x2

Laboratóriumi lelet

Azonosító: CS03176990

Laboratóriumi lelet: 2022. október 21.

Páciens		Beküldő			
Mintavétel: 2022.10.21 Regisztráció: 2022.10.21 12:47		Beküldőkód nélkül beutaló (000000100)			
		Továbbító kód: Cím:			
Vizsgálat	Eredmény	Minősítés	Referencia*	Mértékegység	
KLINIKAI KÉMIA					
Laktát dehidrogenáz (LDH)	363		240 - 480	U/L	
TUMOR MARKEREK					
CA 125	18.2		< 30.2	U/mL	
HE4 (Humán epididymis protein 4)	162.0 +		< 74.3	pmol/L	
Premenopausa rizikó index (ROMA)	57.2 + Alacsony kockázat: < 11.4 % Magas kockázat: > 11.4 %		< 11.4	%	
Postmenopausa rizikó index (ROMA)	33.7 + Alacsony kockázat: < 29.9 % Magas kockázat: > 29.9 %		< 29.9	%	
CA 19-9	12.0		< 30.9	U/mL	
CA 72-4	1.0		< 6.9	U/mL	
Alfa-fetoprotein (AFP)	4.3		< 8.1	U/mL	
CEA	< 0.5		< 2.5	ug/L	
Szöveti polipeptid antigén (TPA)	17		< 75	U/L	

#46

Laboratóriumi lelet: 2023. január 6.

Mintavétel: 2023.01.06	Regisztráció: 2023.01.06 15:03	További kód: Cím:		
Vizsgálat	Eredmény	Minősítés	Referencia*	Mértékegység
KLINIKAI KÉMIA				
Laktát dehidrogenáz (LDH)	385		240 - 480	U/L
TUMOR MARKEREK				
CA 125	8.5		< 30.2	U/mL
HE4 (Humán epididymis protein 4)	70.8		< 74.3	pmol/L
Premenopausa rizikó index (ROMA)	15.0 + Alacsony kockázat: < 11.4 % Magas kockázat: > 11.4 %		< 11.4	%
Postmenopausa rizikó index (ROMA)	11.0 Alacsony kockázat: < 29.9 % Magas kockázat: > 29.9 %		< 29.9	%
CA 19-9	18.0		< 30.9	U/mL
CA 72-4	0.8		< 6.9	U/mL
Alfa-fetoprotein (AFP)	4.3		< 8.1	U/mL
CEA	0.7		< 2.5	ug/L
Szöveti polipeptid antigén (TPA)	24		< 75	U/L

Kórszövettani lelet

Kórszövettani lelet: 2022. november 16.

Beteg neve:	Sorozási:	2022010080
Születési ideje:	TAJ száma:	
Anyja neve:	Vizsgálat ideje:	2022.11.16. 14.07
Lakcíme:	Naplószám:	001010080

Beküldött anyag megnevezése: Corpus kaparék

Külvizsgálat:

5,1 g tömegű minimális nyvadékok tartalmazó kaparék. E.1.cs. FE/HA/BK (BR).

3/3 + p53, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 Górcső alatt:

Abrutum jelzésű minta: A vizsgált metszetekben komplett glandularis struktúrákat, illetve atypusos mirigyeket képező, endometrioid jellegű daganat látható helyenként a sejtfészkek közepén necrosisokkal. Solid struktúrák 5%-nál nagyobb arányban azonosíthatók. A sejtmagokban mérsékelt pleomorphismus látható. Immunhisztokémiai reakciók: p53-al mozaikszerű pozitívítás látszik (p53 vad típus). Mikroszatellita instabilitásra irányuló immunhisztokémiai reakció az MSH2 és MSH6 mismatch repair fehérjék hiányát igazolja.

Diagnózis:

Adenocarcinoma endometii. M8140/3. C5490. Endometrioid típus. G11.

p53 vad típus.

Mismatch repair deficiens (az immunhisztokémiai reakció MSH2 és MSH6 mismatch repair fehérjék hiányát igazolta, ez a konstelláció Lynch szindrómára utal).

#47

Kórszövettani lelet: 2023. február 3.

Beteg neve:	Sorozási:	2023000559
Születési ideje:	TAJ száma:	
Anyja neve:	Vizsgálat ideje:	2023.01.18. 09.12

Külvizsgálat:

156,8 g tömegű uterus, méretei: SI: 100, LI: 70, AP: 40 mm. A portio 40x30x12 mm-es. A preparátum bal oldalán a resectio felszínét alicánkéssel, a jobb oldalán tussal jelöltem. A preparátum metszlapjain szabad szemmel daganatos infiltrátum egyértelműen nem azonosítható, az endometrium vastagsága 3 mm. Megfigyelhető egy submucosus 18 mm legnagyobb átmérőjű ürvényszerű, kötegzett metszlapra szürkésfehér göb is. A fundusnak megfelelően egy polypoid terület azonosítható, 20x10x5 mm-es, mely az endometriumra lokalizálódik. Bal oldali adnexum 45 mm hosszúságú, 2 mm átmérőjű tuba, környezetében 20 mm átmérőjű, vizuálisan benne cista található. Az ovarium 25x10x10 mm-es 1-el indul. Jobb oldali adnexum 50 mm hosszúságú, 3 mm átmérőjű tuba, 22x18x10 mm-es ovariummal 11 vel indul. D1, C51-BK.

11/14 Mikroszkópos leírás:

A portio felszínén elsősorban columnaris hám mutatkozik. A cervixben eltéréstől mentes mirigyek figyelhetők meg, stromalis invasiót mutató daganatszövet nincs jelen. A nyomágokban nucleatis atypia, emelkedett számú mitosis, necrosis jelei nem látszanak. Az endometriumban proliferációs szak jellegzetességei mellett göcs jelleggel hyperplasiás területek mellett komplex mirigy struktúrák mutatkoznak nucleatis atypiaival. A glandularis struktúrák emelkedett számban mutatkoznak, a stroma felé képest arányuk megnövekedett. A szabad szemmel látott polypoid képletnek megfelelően adenocarcinoma jellegzetességeit kimerítő kép azonosítható cribriform struktúrák kíséretében. A daganatos folyamat az endometriumra lokalizálódik és többnyire exophyticus jellegű. Localsan submucalis jellegű területek is megfigyelhetők a mirigy struktúrák elmosódottságával, ezen területek nem utelheők meg. A solid komponens aránya összevetésben 5% alattinak tűnik. Az adnexumok részéről kóros eltérés nem látszik, a bal tuba környezetében azonosított cista serotus cystadenoma képevel egyeztetendő össze. Híne.

Diagnózis:

Endometriális endometrioid adenocarcinoma, Grad. 1, p1 Ia, 10 Y0 Pn0, FIGO IA, M8380/3.

PAJZSMIRIGY DAGANAT

Krisztina, nő (47)

Kiindulási állapot:

2018-ban kezdődtek a problémáim: elkezdett hullani a hajam, gombócot éreztem a torkomban és fáradékony voltam, elkezdtem orvosokhoz járni, míg a végén az endokrinológus megállapította, hogy pajzsmirigyemmel probléma van. A biopszia megállapította, hogy papillaris carcinomám van. Műtétet javasolt az orvos, a bal oldali lebeny eltávolításra került, de a citológiából kiderült, hogy nyirokcsomó áttétek is voltak. Nálam nem került sor a jobb lebeny eltávolítására, így radiojód kezelést sem kaptam.

Irritabilis bél szindrómát mutattak ki nálam valamint vese cisztát.



Adagolás:
2x1 db

Purtier használatának kezdete:

2022 december. Két dobozt 2x2-es dózisban szedtem be, de akkor átmenetileg felerősödtek a hasi panaszaim.

- Kezdetben szomjúság érzés kapott el.
- 2. héten hatalmas fáradtság.
- 3. héten megállt a hajhullásom.
- 2. doboz után észrevettem, hogy javult a szemem (csak olvasó szemüveg kell, nem kell feltennem sms íráshoz, mint előtte).
- 3. doboznál nagy fájdalom lépett fel az epe-máj tájékon. A 2023 elejei ultrahangon a vese cisztám már nem volt látható. A bélszindróma is nagyban javult.

A kontroll-ultrahang vizsgálat a kúra után nem igazolt rendellenességet a pajzsmirigynél, bízom a jövőben és abban, hogy a maximumot megtettem az egészségemért.

Sokkal jobban alszom, kipihenten ébredek, nyugodtabb vagyok és pozitívabb minden téren. A családom, barátaim is észrevették a változást.

Ambuláns lap: 2021.11.01.

AMBULÁNS LAP
024223023

Diagnózis

Kód	DIAGNÓZISOK megnevezése	D
C73H0	A pajzsmirigy rosszindulatú daganat	N
90503	Carcinoma papillare, k.m.n.	N

Beavatkozások

11041	Vizsgálat	1	750
-------	-----------	---	-----

Anamnézis

2019. szeptember 30-án cytológiával igazolt 1 cm-es papillaris cc. miatt a bal lebenyt és az isthmust a centrális nyirokcsomókkal együtt eltávolították. A szövettan 6 dból 4 tumoros nyacs-t mutatott annak ellenére, hogy a primer folyamat 9 mm-es volt.
2019.08.30. FTAB történt a bal lebenyben levő 10 mm-es, mikromeszesedést tartalmazó göbbsől, a cytologia papillaris cc-t igazolt. Kétoldali total thyreoidectomy elvégzése javasolt, melynek megbeszélése céljából kérem jelentkezzen Profeszor Úr szakrendelésén a
2019.10.30. Ez alapján sajnos komplettáló műtét szükséges, mert egyébként nem tudjuk tovább kezelni. A beteg most nem tud még a műtét gondolatával megbarátkozni, részletesen tájékoztattam az előnyökről és hátrányokról, akkor is gondolni tudjuk, ha most nem történik műtét. Januárra beszéltek meg időpontot prof. úrral. Most TSH TG aTG, RA09.

A műtét után korai endokrin kontrollra jelentkezzen.
2019.11.05. Okt. 30-án TSH: 4,130 mU/L; A-TG: 10,9 IU/ml; HTG: 12,7 ng/ml; UH-n a bal lebeny helyén maradék nem látszik. A norm. nagyságú jobb lebeny göbmentes, kóros nyirokcsomó nem ábr. A beteg kérése az volt, hogy várni szeretne a műtéttel. Reggel 50 ug Letromot adok, melyet minden reggel éngyomorra szedjen kizárólag egy korty vízzel, majd fél órát várjon az étkezéssel, kávézással. Sebészeti vizsg. után kontroll, januárban.
2020.01.02. Sokat gondolkodott, és szeretne még várni a komplettáló műtéttel, nagy szorongás ez számára. Egyelőre csak ellenőrizzük a hormonpótlást.
2020.03.10. A pajzsmirigy hormon pótlás megfelelő, TG a maradék pajzsmirigy állományának megfelelő érték, a normális nagyságú jobb lebenyben UH-n göb nem ábrázolódott. Változatlan kezelés.
2020.06.02. Következő UH ősszel esedékes. Tele van aggodalommal, de a komplettáló műtétre még mindig nem szánta rá magát. Syntroxinra váltunk, felirom és küldöm számára a lelettel.
2020.06.02. TSH értéke még nem optimális, omiatt emelem a pajzsmirigy hormon pótlást: egyik nap 50, másik nap 75 ug-mal szedje a Syntroxint, sajnos nincs 62 ug-s kizserelés. TG értéke tovább csökkent, ami megnyugtató. Receptet küldök.
2020.09.02. Csipő, derék és izületei fájnak. Hangulata ingadozó. Syntroxinból 50-est szed 3 hete, mert a gyógyszerárban nem volt 75-os. A pajzsmirigy hormon pótlás megfelelő, TG jól mérhető, megfelel a maradék pajzsmirigy szövetnek, a korábbiakhoz viszonyítva alacsonyabb. UH-n kórosat nem látnak le. Változatlan kezelés. Kérem 3 hónap múlva háziorvosával ellenőriztesse a TSH értéket, mert még nem telt el elegendő idő a gyógyszer dózisának váltása óta. Endokrin kontroll fél év múlva, a recepció egyeztetésen időpontot.

Gy: Syntroxine 50 ug, Szelén, D vit rendszertelenül,
Covid ellen két oltása van

2021.12.01. Jobb csipő és comb fájdalom kezdődött, emiatt megijedt. 2021. szept-ben UH-on a jobb lebeny norm. nagyságú és szerkezetű volt. Bal oldalon kórosat nem láttak, path. nyirokcsomó sem ábr. Hasi UH bal vese cystán kívül mást nem mutatott. F.o-gágészeten rhinitis allergiát véleményeztek. CT nem történt a pajzsmirigy probléma miatt. Ebben a betegségben nyugodtan végezhető. 2021. januárban gerinc panaszok miatt már vizsgálták, ekkor MR készült, polydiscopathiát mutatott, gyöki érintettség nélkül.
FM: a nyakon kóros nem tap. A jobb lebenyt is alig érzem. Bal oldalon a fejbiocentő izom megérint két apró ny.cs. tap.
TSH TG

Vizsgálatok

2021.12.01 12:04 - Pajzsmirigy+AT (RK11)
TSH: 1,790 mU/L; HTG: 6,5 ng/ml;
ELL: (N) {Autovalidált lelet, a felelős diplomás:
Ellenőrizte:

Epikrisis:

2021.12.02. A pajzsmirigy hormonpótlás megfelelő. TG értéke alsó tartományban, nem változott, a maradék méretének megfelelő. Változatlan kezelés. Kontroll fél év múlva.

Pécs, 2021.12.01

Lelet: 2022.09.13.

I. lelet



Vizsgálat ideje: 2022.09.13. 10:51

Ellátás azonosító: 00001914

Iránydiagnózisok: I10H0/3 - Magasvérnyomás-betegség (elsődleges)

Beavatkozások: 36110 - Nyaki lágyrészek UH vizsgálata (1x897p); 36111 - Pajzsmirigy UH vizsgálata (1x920p); 36117 - Nyálmirigy UH vizsgálata (1x260p); 36123 - Pleuraür UH vizsgálata (1x252p); 36130 - Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat (1x944p); 36150 - Kismedence transzabdominális UH vizsgálat (1x598p); 36138 - Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata (1x356p)

Radioológiai vélemény:

36110 - Nyaki lágyrészek UH vizsgálata
36111 - Pajzsmirigy UH vizsgálata
36117 - Nyálmirigy UH vizsgálata
(Samsung HS50)

A pajzsmirigy jobb lebenye norm. nagyságú, szerkezetű, benne medialisan egy 2-3 mm nagyságú cystosus képlet látható.

A bal lebeny eltávolítva, itt jelenleg 6x5 mm nagyságú pajzsmirigy szövet látható, mely homogén szerkezetű.

A nyálmirigyek norm. nagyságúak, szerkezetűek, ductus tágulat nem látható.

Bal oldalon a nyak középső harmadában kissé dorsalisán egy normális szerkezetű, 17x5 mm nagyságú nyirokcsomó látható.

Suprclavicularisan dorsalisán egy hasonló norm. szerkezetű 8x3 mm nagyságú nyirokcsomó is látható.

Patológias nyirokcsomó nem ábrázolódik.

36123 - Pleuraür UH vizsgálata
36130 - Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat
36150 - Kismedence transzabdominális UH vizsgálat
36138 - Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata
(Samsung HS50)

A pleura sinusokban folyadék nem látszik.

A máj nem nagyobb, norm. szerkezetű, homogén.

Az epehólyag összehúzódot.

Az intrahepaticus epeutak nem tágak.

A hasnyálmirigy nem szélesebb, állományában kóros eltérés nem látszik.

A hasi aorta nem tág.

Mindkét vese norm. nagyságú, helyzetű, kő, úregrendszeri tágulat nem látszik.

A bal vesében parapelvicusan az alsó harmadban jelenleg is egy 9 mm-es, felső harmadban egy 13 mm-es cysta látható.

A lép norm. nagyságú, szerkezetű, homogén.

A húgyhólyag vizelettel telt, fala nem vastagabb.

Az uterus felső dorsalis harmadában a szerkezet inhomogén jellegű, itt egy kb. 3,8-4 cm nagyságú kerekded képlet sejthető.

A vizsgált régiókban belfali megvastagodás nem mutatható ki.

Vélemény:

Cystae renalis l. s.

Myoma uteri?

Nőgyógyászati konzilium javasolt.

Közreműködő asszisztens:

2022.09.13.

Ambuláns lap: 2022.12.07.

A M B U L Á N S L A F

Diagnoses

Kód	DIAGNÓZISOK megnevezése	D
C73H0	A pajzsmirigy rosszindulatú daganata	N
80503	Carcinoma papillare, k.m.n.	N

Beavutkoz	sok		
11041	Vizsgálat	1	750

Anamnēzis

2019 szeptember 30-án citológiaiával igazolt 1 cm-es papillaris cc. miatt a bal lebenyt és az isthmust a centrális nyirokcsomókkal együtt eltávolították. A szövettan btből 4 tumoros nyecs-t mutatott annak ellenére, hogy a primer folyamat 9 mm-es volt.

2019.08.30. FTAB történt a bal lebenyben levő 10 mm-es, mikromereszedést tartalmazó gobból, a cytologia papillaris cöt igazolt. Kétoldali totál thyreoidectomia elvégzése javasolt, melynek megbeszélése céljából kérem jelentkezzen
szakrendelésén a
Professzor Úr

2019.10.30. Ez alapján sajnos komolyabb műtét szükséges, mert egyébként nem tudjuk tovább kezelni. A beteg most nem tud még a műtét gondolatával megbirkózni, részletesen tájékoztatam az előnyökről és hátrányokról, akkor is gondolni tudjuk, ha most nem történik műtét. Januárra beszélnek meg időpontot prof. úrral. Most TSH TG aTG, RA09.

A műtét után korai endokrin kontrollra felmentkezzen.

2019.11.05. Okt. 30-án ESH: 4,130 µg/l; A-TG: 10,9 IU/ml; HFG: 12,7 ng/ml; UH-n a bal
lőbény helyén maradték nem láthatók. A norm. nagyságú jobb lebeny gúbtans, kóros
nyirokcsomó nem ábr. A beteg kezelése az volt, hogy várni szeretne a műtéttel. Reggel 50 µg
Letroxot adott, melyet minden reggel éhgyomorra szedjen kizárólag egy korty vizivel, majd
fél órárt várjon az étkezéssel, kávéval. Sebészeti vizsg. után kontroll, januárban.

2020.01.02. Sokat gondolkodott, és szeretne még várni a komplettáló műtétrel, nagy szorongás ez számára. Egyelőre csak ellenőrzőük a hormonpótlást.

2020.03.10. A pajzsmirigy hermen pótlás megfelelő, FG a maradék pajzsmirigy állományának megfelelő érték, a normális nagyságú jobb lebenyben UH-n göb nem ábrázolódott. Változatlan kezelés.

2020.06.02. Következő UH ősszel esedékes. Tele van aggodalommal, de a komplettáló műtetre még mindig nem szánta rá magát. Syntroxinra váltunk, felírom és küldöm számára a lelettel.

2020.06.02. TSH értéke még nem optimális, emiatt emelem a pajzsmirigy hormon pótlást
:egyik nap . Másik nap 75 ug-mal szedje a Syntroxint, sajnos nincs 62 ug-s kiszerezés.
TG értéke tovább csökkent, ami megnövekedett. Receptet küldök.

2020.09.11. Csípő, derek és izületi fájtnak. Hangulata ingadozó. Syntroxinból 50 est szed 3 hete, mert a gyógyszerterákn nem volt 75-os. A pajzsmirigy hormon pótlás megfelelő, TG jól mérhető, megfelel a maradék pajzsmirigy szövetség, a korábbiakhoz viszonyítva alacsonyabb. UH-n kórosan nem írnak le. Válogatlan kezelés. Kérem 3 hónap múlva

háziorvosával ellenőriztette a TSH értéket, mert még nem telt el elegendő idő a gyógyszer-dózisának váltása óta. Endokrin kontroll fél év múlva, a recepción egyeztetetten időpontot 2021.12.01. Jobb csípő és comb fájdalom kezdődött, emiatt megijedt. 2021. szept-ben UH-on a jobb leheny norm. nagyságú és szerkezetű volt. Bal oldalon kereszt nem láttak, path. nyirokcsomó sem ábr. Has: UH bal vesze cystán kívül más nem mutatott. F-o-gégesztésen rhinitis allergiát vélelmeztek. CT nem történt a pajzsmirigy probléma miatt. Ebben a betegségen nyugodtan végezhető. 2021. januárban gerinc panaszok miatt már vizsgáltak, ekkor MR készült, polydiscopathia mutatott, gybkéi érintettség nélkül. PMG: a nyakon kereszt nem tap. A jobb leheny is alig érzem. Bal oldalon a fejtálcított izom mögött két apró ny.cs. tap. A pajzsmirigy hormonpótlása megfelelő. TG értéke alsó tartományban, nem változott, a maradék méréstének megfelelő. Változatlan kezelés. Kontroll fél év múlva.

Gy: Syntroxine 50 ug, Szelén, D vit rendszertelenül,
Covid ellen két oltása van

2022.12.07. Azeleti fájdalom perzisztálnak, de fájdalom csillapított nem szokott bevenni.
PM: a jobb lebeny nem tap., bal oldalon a musculus sternocleid. mast. mellett apró nyirokcsomó tap.

TSH TG

UH (RA12) Lelelet kérem, a recepciónkra adjá be (0. színt A szárny), vagy UH
elkészültéről kérem, értesítsen emailen vagy a recepció
telefonszámban hagyjon üzenetet: vagy További javaslat ennek
ismeretében, postán.

Pécs, 2022.12.07

Ultrahang: 2022.12.13.

ULTRAHANG VIZSGÁLATI LELET

Diagnózis:
E0790 Pajzsmirigy betegség, k.m.n.

Kontroll vizsgálat.

Beavatkozás:

pajzsmirigy uh

Lelet:

A pajzsmirigy jobb lebenye normális nagyságú, homogén szerkezetű, benne egy apró kolloid cysta látszik. A lebeny vascularisaltsága szabályos. A bal lebeny eltávolításra került, helyén maradék állomány nem látszik.

A nyaki nyirok régiókban pathológiás méretű vagy morfológiájú nyirokcsomó nem mutatható ki.

A nagy nyálmirigyek, nyaki nagyerek épek.

Vélemény:

St.p. lobectomia et SND l.s.

Recidiva, metastasis nem látszik.

Pécs, 2022.12.13

Ultrahang: 2023.02.20.

ULTRAHANG

Megjelent: 2023.02.20 14:48:00
azonosító:30262668

Diagnózis:
R1040 Egyéb és k.m.n. hasi fájdalom

Jobb oldali hasi panaszok.

Beavatkozás:

hasi uh

Lelet:

A máj normális nagyságú, sima kontúrú, homogén szerkezetű, benne góc nem látszik.
A.: epehólyag vékonyfalú, hig folyadék tartalmú, kőmentes, epeúti águlat nincs.

Pancreas, lép, vesék UH képe szabályos.

A hasban és kismedencében közepesen gázos belek és közepesen telel húgyhólyag mellett szabad folyadék, nagyobb nyirokcsomó. pathológiás bélfalmegevastagodás nem detektálható. Az uterus retro- flectált helyzetű.

Vélemény:

Negatív lelet.

Pécs, 2023.02.23

Radiológus szakorvos

VASTAGBÉL DAGANAT

György, férfi (67)

Kiindulási állapot:

Problémák kezdete 2023 január. Krónikus emésztési problémák (székrekedés és hasmenés váltakozása, aranyér problémák, gyulladás és vérzés, fájdalom, de csak végbél tájékon (hasfájás bélgörcsök nem voltak), magas vérnyomás. A vizsgálatok vastagbél tumort állapítottak meg.

2023. február 1.- én kezdtem el használni a terméket .

Adagolás:

2x1 kapszulát fogyasztottam, viszont a kúra végéhez közeledve már csak napi egyet szedtem.

Folyadék:

Napi 2-2,5 L

Február 20. -án megműtöttek, kivették a beteg bélszakaszt, ami kb. 10 cm nagyságú volt. Műtét utáni terápiára nem volt szükség. Az emésztésem a műtét után normalizálódott. Étvágyam jó, és a leadott kilókat sikerült vissza szednem. Fokozatosan erősödtem és a közérzetem is folyamatosan javult. Pszichésen sem viselt meg nagyon a műtét és a betegség.

Fogyasztás alatt gyakran éreztem ízületi fájdalmakat.

Régebben köszvényes panaszaim voltak, amik a szedés óta nem jelentkeznek.

Az ízületi problémák több hullámon át jöttek elő és tűntek el. Vérnyomásom jó, a közérzetem is, sokkal energikusabb vagyok, mint azelőtt.

Amit változtattam a táplálkozásban, hogy gyakrabban eszem, mint azelőtt, viszont kevesebbet.

Jól érzem magam, sokat köszönhetek a Purtier-nek a műtét utáni felépülésben.

DAGANAT

Gyula, férfi (52)

Kiindulási állapot:

2020 szeptemberében Covid-os lettem, ami után hónapokig több poszt-covid problémával küzdöttem.

2021-ben kétszer is elmentem a házi orvoshoz, aki elküldött laborba, majd ultrahangra, ahol találtak a hasnyálmirigyen egy 5,3 x 3,8 cm-es és egy 3,2 cm-es térfoglaló folyamatot, távoli áttét nem látszott.

A diagnózis első megnevezése hasnyálmirigyet átfedő rosszindulatú daganat, ennek kimeneteléről az orvosok meglehetősen sötét képet festettek.

Ezután CT vizsgálat volt, ahol megállapították, hogy neuroendocrin tumor van a háttérben.

2021 április elején 4 órás műtétet hajtottak végre és a hasnyálmirigy kb. 30%-át kivették. Szövettani leletet megkaptam: pT1N1 grade 1.

70 kg volt a testsúlyom, ami a műtét után 64 kg-ra csökkent, illetve nagyon legyengültem. További vizsgálatok voltak, de semmilyen áttét nem volt, így sem kemoterápia-, sem sugár kezelést nem kaptam.

Gyógyszerek:

Csupán két gyógyszert szedtem. Az egyik egy enzim gyógyszer (pankreász por - segíti a hasnyálmirigy működését) a másik pedig savlekötő, amit több mint 15-éve szedtem.

2022 szeptemberében kezdtem el a Purtier kúrát.

Folyadékbevitel:

2-3 L víz



Adagolás:
napi 2x1 db

#54

Az első hetekben fáradtságot éreztem, aluszékony voltam, de aztán fokozatosan megjött az erőnlétem és kb. az 5. hónaptól folyamatos javulást érzek.

A 7. hónapnál már 100%-os erőnléti állapotban voltam és a látásom is javult a bal szememen.

Most egy év elteltével 70 kg-os vagyok, teljesen visszaálltam a régi formámba, amit inkább a 10 évvel ezelőttihez hasonlítanék.

Nincs panaszom, nincs fájdalmam, még az időnként jelentkező fejfájás is elmúlt és a savlekötőnek is már csak töredékét szedem, illetve lassan szeretném elhagyni. A gyomorműködésem rendben, a mosdóba járás rendben, olyan mint gyerekkoromban és óramű pontossággal működik az emésztésem is.

A bőröm a kúra tizedik hónapjában elérte, vagy inkább visszanyerte a harmincas éveim állapotát, azaz megfiatalodott, teljesen feszes.

Az utolsó vérvételen az asszisztensnő megkérdezte, hogy miből van a bőröm, mit eszem, mert alig tudta átszűrni (ez 11 hónappal a kúra megkezdése után történt).

Ha őszinte akarok lenni, a munkabírásom, fizikumom, mentális állapotom olyan változáson ment keresztül, amin az egész család csodálkozik.

Ez történt eddig velem és ez igaz!

Köszönöm szépen Purti-er!



Lelet: 2023.03.25

Speciális biopsia szövettani lelet
(nyomtatva: 2021.03.26. 09:08 Validált végleges)

Név: [REDACTED] Naplósám: [REDACTED]
Született: [REDACTED] TAJ: [REDACTED]
Anyja neve: [REDACTED] Vizsgálat ideje: [REDACTED]
Cím: [REDACTED] Biopsia sorszáma: [REDACTED]
Beérkezés ideje: 2021.03.16. 15:15
Válasz ideje: 2021.03.25. 13:29

Beküldő intézet: Endoszkópos Szakrendelés (200123175)
Beküldő orvos: [REDACTED]
Beküldő BNO: K8690
Vizsgált anyag: colan 1.
Konzultans: [REDACTED] Orvosirnok: [REDACTED]

Mikroszkopos leírás:

Duodenumból származó tunica muscularis mucosae rétegét is tartalmazó nyálkahártya mintákat látunk, melyek közül az egyik mintában a simaizom rétegei között, valamint a mucosában is azonosítható daganatos elváltozást látunk, mely fészkekből épül fel, az izomfalban egymás mellett elhelyezkedő mozaikszerű megjelenésű sejtfészkek azonosíthatók. A daganatsejtek magjai kerekdedek, másutt kissé elnyújtottak, monomorph megjelenést mutatnak, a magkontúr helyenként kissé hullámos lefutású. A cytoplámaszegély keskeny. A magok chromatinsszerkezete finoman pettyezett.

Az elvégzett immunhisztokémiai vizsgálatok során a daganatot felépítő sejtek Pan Cytokeratin elleni antitesttel mag körül pettyezett pozitív reakciót adtak, valamint CD56, Chromogranin és Synaptophysin elleni antitestekkel ugyancsak pozitív jelölődést találtunk. Cytokeratin 7 és Cytokeratin 20 elleni antitesttel készült vizsgálat negatív eredményt adott. Ki-67, proliferációs markerrel 3 % alatti mag pozitív jelölődést találtunk. 10 nagy nagyítású látótérben 1 oszlo alak számolható.

A hisztomorphológiai kép és az immunhisztokémiai vizsgálatok eredménye alapján a látottakat grade I-gyel bíró neuroendocrin tumornak tartjuk.

Kórszövettani dg.:

Neuroendocrin tumor. Grade I. D139
Snomed kód: D1390; M82401.T64000

Elvégzett vizsgálatok: (WHO kódok szerint):

Kód	Beavatkozás megnevezése	Dátum	db
29000	Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel	2021.03.16. 15:01	1
29050	Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén	2021.03.16. 13:29	5

2021.03.25.

Konzultans

#56

KEMOTERÁPIA

Peter, férfi (70)

Kiindulási állapot:

Daganat műtét után kemoterápiás kezelést kapott, nagyon gyenge volt. Szobájában az ágyban feküdt és nem volt jártányi ereje sem.

Adagolás:

Naponta 2 x 1 kapszula.

Elkezdte szedni a Purtiert, alig egy hét elteltével felkelt és körbejárta a lakást. Pár hét után már kísétált a kocsihoz feleségével, amit óriási sikernek érez. Orvosa szerint is ez elképesztő és gyors mértékű javulás. Végre energiához jutott, így az életének ismét több értelme van. Újra bízik a jövőben, aminek családjá örül a legjobban.

GERINCVELŐDAGANAT

Ágnes, nő (65)

Kiindulási állapot:

2005.októberben állapították meg a 8 éve fennálló fájdalmaim, sokszor mozgásképtelen állapotom okát. Ehhez társult nagyfokú emésztési és bélfájdalom. 2005.július hónapban elvesztettem a jobb lábam teljes érzetét, estem-keltem, de a tűszúrást érzékeltem, melyhez fájdalom társult. Mélyérzés zavar. Több éves fájdalmak, vizsgálatok, amelyek nem derítették ki a tüneteim okát egy lumbális gerinc MR vizsgálat során térfoglaló folyamat képe rajzolódott ki. A következő MR vizsgálat alkalmával a gerinc Th.VII-XII magasságában kirajzolódott a tumor. Utána kezdődött meg a versenylfutás az életemért, mert a... Idegklinika orvosa szerint műthetetlen vagyok, mert a daganat a gerincvelőben van, amihez nem lehet hozzányúlni. Erős fájdalomcsillapítót javasolt és szemembe nézve közölte, hogy van 3-6 hónapom és iszonyú fájdalmak között meghalok.

Ez a „kedves” hír után lelkileg összetörtem. A családom szeretete és az élni akarásom erejével kerestük a megfelelő orvost, aki más lehetőséget is lát mint...

Professzorom felvázolva a lehetőségeket, a lehető leggyorsabban megműtött 2005.dec.13-án. A felépülésem hosszú volt. Jobb oldalam teljes érzéskiesése, járás tanulás, mozgáskoordinációs problémák, emésztési gondok, bélfájdalmak, alvászavar és nagyfokú fájdalom szindróma, ami miatt leszázalékoltak.

Az eltelt évek alatt kerestem a megoldást, hogy hogyan tudom túlélni a nehéz napokat, könnyebbé tenni az életemet. Sok egészségprogramban benne voltam, termékeket fogyasztottam, mire áldásként megismertem a Puriert.



Adagolás:

A 6 generációs termékkel kezdtem, végig fogyasztottam a kúrát. A 7. generáció megjelenése után elkezdtem a fogyasztását. Napi 2x1 kapszulával.

Mindig is sok folyadékot fogyasztottam, ezért a napi 2-3 liter nem esett nehezemre és nagyon kívántam is a vizet.

Tapasztalatom a termékkel:

Gyorsan éreztem a kapszulák beavatkozását:

- erős verejtékezés, jobb hangulat, alvás egész éjszaka
- fájdalmak felfokozódása-majd gyors elmúlása
- régi törések, szalag szakadások helyén zsiborgás, majd izmok szalagok ellazulása, ízületi fájdalmak megszűntek
- emésztési problémák javulása, majd ma már elmondhatom teljes normál működés, bélfájdalmak megszűnése
- asztma, reflux a múlté, teljesen jól vagyok, a gyógyszereket elhagytam
- járásom, egyensúlyom tökéletes
- bőröm, hajam sokat javult, a 2 olvasó szemüvegre nincs szükségem
- félelmeim, alvásproblémák elmúltak, hangulatom vidám-életszetető
- Covid okozta hatalmas fejfájásom, ami 1,5 évig kínozott, a Purrier szedését elkezdtem és 2 hét után megszűnt!

Nagyon hálás vagyok, életem sokkal könnyebb, vidámabb.

M5440 Lumbago isciabasi
Állapot leírása: (magyar nyelven)
1. Jobb felső végtag : ép

2. Bal felső végtag : ép

3. Jobb alsó végtag : járás nehezített

4. Bal alsó végtag : járás nehezített

5. Törzs, gerincoszlop : műtét utáni állapot, kötött izomzat

6. Vázizomzat : megtartott
Alkalmazott segédeszköz: nincs

Közlekedőképesség minősítése (vizsgálat és szubjektív megítélés alapján)

Életvitelszerűen ágyhoz kötött fekvőbeteg, a szállítása csak mentőjárművel biztosítható : nem

a. Járás : súlyosan nehezített(2)

b. Terhelhetőség: képtelen(3)

c. Jármű haszn. : súlyosan nehezített(2)
(tömegközlekedés)

Érvényes gépjárművezetői engedéllyel : rendelkezik

Állapota : végleges

Állapota fennáll: 2005. október óta.

Lelet :
Cervicalis és thoracalis gerinc MR vizsgálat, mely a cranio-cervicalis átmenettől az L.II. csigolya magasságáig történt sagittális T2 T1, coronalis T1, a C.IV-V., a Th.II. discus magasságában T2 súlyozott axialis, a Th.VII-XII. csigolyák magasságában széles blokkban T1 súlyozott axialis méréseket végeztünk.
A thoracalis elváltozás magasságában Magnevist kontrasztanyag adását követően a sagittális és az axialis T1 súlyozott méréseket megismételtük.

A Th.VII. és XII. csigolya magasságában a myelon orsószzerűen kiszélesedett, benne T2 méréseken magas, T1 méréseken jelszegény terület figyelhető meg, melyen belül a Th.XI. csigolya magasságában egy gírlandszerű, mérsékelt kontrasztanyag halmozást mutató szolid rész is megfigyelhető. Az elváltozás a myelon határait nem lépi túl. A teljes vertebrealis a Th.VIII. és a X. csigolya magasságában a canalis vertebralis körül liquortér alig ábrázolódik. A cystosus térfoglaló folyamat fölött és alatt körös jelmenet változás a myelonban és a conus medullarisban nem mutatható ki. A conus medullaris az L.I. csigolya első zárólemeze magasságáig ér. A csigolyák zárólemezein csontos felrakódások látszanak, a Th.XII. csigolyatestben egy 5 mm-es, kerek, a T1 és T2 méréseken magas jelfokozódás ábrázolódik (kis haemangioma).
A Th.IX. csigolya első zárólemeze magasságában ventralisan T2 méréseken magas, T1 méréseken jelszegény terület figyelhető meg. Hasonló jellegű elváltozás látszik a C.IV. és a Th.II. csigolyatestben, melyek szintén kis haemangioma. A cervicalis és a thoracalis csigolyák zárólemezein csontos felrakódások láthatók. A C.III., V-VI. és a Th.II. discus jelintensitása a T2 méréseken csökkent. A Th.II. discus 2-3 mm-rel körkörösén meghaladj a csigolyatest ívét, gybkí compressio nem látszik. A C.V. discuson egy 3 mm-es, 10 mm szélességű, durzszakot modeláló kis sérves előboltosulás ábrázolódik.

Vélemény:

Térfoglaló folyamat a Th.VII-XII. csigolya magasságában a myelonban, mely MR kép alapján astrocytoma.

Kiindulási állapot:

Az elmúlt 5 év alatt, alattomos módon a bőrömön több helyen megjelent a basalioma és az időszakos atópiás ekcéma, ami pillanatnyilag az orvostudomány jelenlegi állása szerint egy gyógyíthatatlan (csak kezelhető) betegség.



A képek bal oldalán a 2023.10.24. napon készült mérési állapot, a jobb oldalán pedig a 2024.01.23. napon készült mérési állapot látható. A változás jól szemléltet sok mindent, de ami a legfontosabb, a megindult gyógyulási folyamatot, a beteg sejtek csökkenését és a tartalék egészséges új sejtek megjelenését, amit a szervezetem öngyógyító mechanizmusának köszönhetek azáltal, hogy beindult az őssejt termelés.

A fájdalom, ami miatt szakorvoshoz fordultam, hogy az addig allergiának, illetve rovarcsípésnek hitt tünetek már elviselhetetlenre erősödtek, állandósult a bőrviszketés és a kiütéseket herpesz szerű nedves felületű sebek váltották fel a testemen és fejbőrömön egyaránt. A hámsérülések, karcolások már lassan sem gyógyultak. Irritáló volt számomra a napfény, ezért igyekeztem nyáron is zárt ruházatot viselni.

Tapasztalat a kúra alatt:

2023.09.01. naptól kezdtem a Purtier kúrát, hatodik generációs termékkel. Egészen elképesztő javulást tapasztaltam már 6 hét után.

1. hónap: Azonnal megemelkedik a víz/folyadék fogyasztás; mérséklődik a bőrviszketés; alvás minőségének és hatékonyságának javulása; edzés utáni rehabilitációs idő csökkenése; gyulladásos pattanások az arcomon és végtagjaimon

2. hónap: Megszűnik a bőrviszketés; a felületi horzsolások és hámsérülések begyógyulnak; arcomon és kézfejemen lévő májfoltok halványulása, eltűnése; ránc kisimító hatás; felgyorsult az anyagcserém, diéta

nélkül és emelt; vízfogyasztás mellett is -3 kg súlycsökkenés; energia szintemelkedés; fizikai gyorsaság; intenzív és gyorsabb gondolkodás



3. hónap: A basalioma foltok hámosodása, a herpesz sebek (atópiás ekcéma) gyógyulása, már nincs új seb. További fizikai teljesítmény növekedés.

4. hónap: Megszűnt a terepfutások alkalmával észlelt alkalmoszerű vizelettartási probléma; állandósult a boldogságérzet; javult az emésztésem, erősödött a gyomor és bélrendszerem.

Adagolás:

Én a terméket, egy hétig 2×1 kapszula, majd 2×2 kapszula adagolásban fogyasztottam. Így még decemberben a végére is értem.

2024. februártól 2×1 adagban szedem a hetedik generációs terméket azért, hogy a maradék 30%-os rákos sejtelhalást támogassam.





#64

Előre bocsátom, soha semmilyen szépségészeti beavatkozást nem vettem igénybe kozmetikai tetováláson kívül. 56 éves vagyok, születésem óta száraz, vízhiányos fehér bőrű, jól látható szeplőkkel.

Természetesen a fent leírtak miatt is mindig prioritás volt a bőrápolás, de ilyen még egy készítmény sem tudott a bőröm minőségén javítani.

Sportsérülés:

2024. február hónapban az edzőteremben a saját hibám okán a jobb sípcsontomra ráesett egy 20 kg súlyú súlyemelő gyakorlóruúd, elég hosszan mély sebet ütött, amit 12 öltéssel húztak össze.

A korábbi térdműtétem után ugyan így várták a metszést, így számíthattam újra egy maradandó hegre.

Ami miatt ezt leíró az az, hogy a sérülés helye 3 hónap elteltével nem csak begyógyult, hanem szinte nyomtalanul el is tűnt.



Sportteljesítmény növekedés:

Egészen elképesztő javulást tapasztaltam már 1 hónap után a fizikai állóképességem és a terhelhetőség területén egyaránt. Ezért neveztem 2023. október hónapban a „Sherpa Rally” - Az első magyarországi teherhordó versenyre. A hivatásos teherhordók mintájára mindenki kipróbálhatja magát élesben, az emberi teljesítőképesség határait súrolva, szervezett keretek között.

Női futam 20 kg-mal hátizsákban, a súlyt a szervezők biztosítják, a hátizsákról a versenyzőknek maguknak kell gondoskodni. Maga a feladat egyszerű, a 20 kilós hátizsákot a szalaggal kijelölt ~4 kilométeres útvonalon, ~300 m emelkedéssel, 2:00 óra teljesítési időn belül kell a Nagy-Eged Hegyre felvinni, és ott le is tenni. Lejönni már „üresen” kell.

A szintmetszet alapján az útvonal három szakaszra volt osztható, 2 km sík földút + 1 km köves emelkedő + 1 km köves, szűk és brutális emelkedő. A hátizsák nehéz volt, igazi kemény kihívás, én 48 perc célidővel 13 női induló közül a dobogó III. fokán végeztem.

(4) A 2023. évi szezont áprilisban egy 200 km hosszú teljesítménytúrával kezdtem „Petőfi 200 TT” amit sikerült a meghatározott 55 órás szintidőn belül teljesíteni. A Purtier hatására folyamatosan éreztem, hogy hónapról hónapra erősebb vagyok. Ezért elhatároztam, hogy a szezont is 200 km-rel zárom, kíváncsi voltam, időeredményben mérhető lesz-e az érzés. Decemberben neveztem a „ Balathlon instant 211 TT”-re, ahol a feladat 50 órán belül az aszfalton körbe gyalogolni a Magyar tengert.

Nekem minimális kitérőkkel 216 km-t sikerült megtenni 48 óra alatt, ami részarányosan 200 km-re 45 órát jelent.

A két kihívás között 8 hónap telt el úgy, hogy 10 órát sikerült javítani, ami külső segítség nélkül nem valósulhatott volna meg.

HEPATICUS CYSTA

Tamás, férfi (51)

Kiindulási állapot:
2019. óta ismert cysták és 2021 óta ismert haemangioma.

Kúra időtartama:
2023. október-2024. április

Adagolás:
Első pár nap 2x1 kapszula, majd 1 hónapig 2x2 kapszula, majd ismét 2x1 kapszula a kúra végéig.

Vízfogyasztás:
Napi átlag minimum 2 liter.

A Purrier hatásának leírása:
A kapszula 2x2-es fogyasztás alatt erősödő fájdalom jelentkezett a korábbi sérüléseknél. Fej, alsó végtagok, térd, szív tájék. Ezek a 2x1-es adag szedése alatt hullámozóan rövidebb ideg visszatértek, majd 4. hónap körül elmúltak.
Leleten olvasható, hogy a legnagyobb cysta felére csökkent (8 mm-ről 4 mm-re), a korábban látható haemangioma nem látható - nem ábrázolódik a 2024.03.06-i vizsgálat alapján.

#96

Lelet: 2024.03.06

Családi anamnézis							
	Szív- érrend- szert	Légző- szervi	Daga- nat	Emésztő- szerv	Anyag- csere	Páci- ch.	Halál
Apa	-	-	-	-	-	-	-
Anyja	-	-	-	-	-	-	-
Testvér	-	-	-	-	-	-	-

Veszélyességi tényezők
Eszméletvesztés: Nincs megadva
Epilepsziás megbetegedés: Nincs

Jelen panaszok
1991-ben autóbaleset után koponya műtét.
2019 óta ismert hepaticus cysták és cholesterosis.
2021 aug óta ismert haemangioma az S4-ben 13x20 mm. A májban számos cysta.
2022 feb. Cystae hepatis az S7-8-ban 8 cm átm. A haemangioma 11x 18 mm
Májfunkciókban eltérés nem volt. Hasi panaszokat a fentiek nem okoznak.

Státusz
Teljes has és kismedence UH-vizsgálat
A máj mérs. maius, reflectivitása kissé fokozott, szerkezete homogén, benne számos változó méretű hepaticus cysta, a legnagyobb az S7-8-ban a rekesz alatt átm. 46x35 mm. Az S4-ben korábban látott kb 1 cm-es haemangioma jelenleg nem ábrázolódott.
Az intra- és extrahepaticus epeutak nem tágabbak.

Kiindulási állapot:

2021-ben Non-Hodgkin lymphomát (nyirokrendszer daganatos elváltozása) diagnosztizáltak nálam. 2021 július végén ért véget a kemoterápia, teljes sikerrel. Viszont rá 1 évre, elkezdődött egy olyan folyamat, ami miatt endokrinológushoz fordultam. A hormonrendszerem felborult, pánikrohamok indultak be, amiket meditációval szinten tudtam tartani, de ahogy kimaradt, rögtön újraindult a pánik. A vizsgálatok kimutatták, hogy valószínűsíthető, hogy a kemo hatására az agyalapi mirigy sorvadásnak indult, ez okozhatja a hormonzavart.



Kaptam tesztoszteron injekciót, amivel 3 hónapra elértük, hogy normál értéken volt a tesztoszteron szint, de ez kiürült és új injekciót kellett volna kapnom. Ekkor találkoztam a Purtierrel, amit 2023.november 2-án kezdtem el szedni.

Adagolás:

2x2 kapszula, volt két hét, amikor felemeltem 2x3-ra, de ezt soknak éreztem és visszatértem a 2x2-re. Emellett legalább napi 3 liter vizet iszom.

Tapasztalatom a termékkel:

Már az első napokban éreztem a változásokat az energiámban, aztán egyre stabilabb lett az idegrendszerem is.

Egy cisztám volt a herevezetékénél, több mint 10 éve, ez 1 hónap alatt felszívódott. 2024. januárjában elmentem egy teljes vérvizsgálatra. Az eredményekben látszott, hogy a tesztoszteronszint növekedett, illetve a többi hormon is harmonikus állapotba került a szervezetemben.

2024. február végén fejeztem be a kúrát, azóta is jó az állapotom. Néha, ha stresszes időszakom van, akkor pár napig szedem a kapszulát, de nem rendszeresen.

2024.08.05-én a PET CT vizsgálat során kiderült, hogy a májам 4,5 cm-rel kisebb lett, kiürült a felhalmozódott méréganyag. Összességében teljesen meggyógyultam és mentálisan, energiaszintben is stabilá váltam. A környezetem is látja a pozitív változásokat.



ÖSSZEFOGLALÓ SZAKORVOSI JELET

Beteg neve:
Születési idő: 1981.07.26.
Lakcím:
TAJ:
Naplószám:

Péter

Anamnézis:

Non-Hodgkin lymphoma miatt Haematológiai követés alatt állt. PET CT-n recidíva nem került lefedésre. Korábban R-CHOP kezelést kapott. Itasi CT sigma divertikulumokat mutatott.
Hormonális kivizsgálás céljából kereszte fel rendelésünket. Kardiológiai szakvizsgálat kórus eltérést nem talált.
Lefagyasztott spermasejtek vannak utólvá.
Gyógyszereket rendszeresen nem szed. C'AVI: nem ismeri.

Status:

Nas puha, betap. kórus nem tap, máj és lép nem elérhető, pajzsmirigy norm. tap. vc: 5,9 mmol/l.

Labor-értékek:

2022.11.10. vc: 5,4 mmol/l, TSH: 1,34 mIU/l, VitD3: 65,3 nmol/l, chol: 6,4 Tg: 2,2 vese- és máj-
rendezettek
2022.12.05. ACTH: 17,8 pmol/l, FSH: 3 U/l, LH: 1,5 U/l, PRL: 116 mIU/l, T: 7,18 nmol/l, SHBG: 19
nmol/l, DHEAS: 5,73 umol/l, kortizol: 617,6 nmol/l
2022.12.13. kortizol: 462,4 nmol/l
2023.01.17. vc: 5,5 mmol/l, vese- és máj-
rendezettek, vas: 16,6, ACTH: 1,7 pmol/l, kortizol: 14,37
nmol/l, chol: 6,4 Tg: 2,2.

Sella MRI (2023.01.30.)

A sella és hypophysis nem nagyobb. A hypophysis ventrálisan, medialisán inkább keskenyebb, itt liquor helyezkedik el. Benne egyértelmű kórus eltérés kontrasztanyag adása után sem látható. A hypophysis nyél egyenes állású. Corpus pineale cista látható 10 mm nagyságban.
Vélemény: Kismértékű részleges empty sella. Corpus pineale cista

Vélemény:

Sella MRI-n empty sella került lefedésre, mely az FSH, LH termelést befolyásolja, következményes hypogonadotrop hypogonadizmussal.
A beteggel történt egyeztetést követően Nebido inj. kezdünk inni, Ezt támogatva felírjuk. Megkérjük tisztelt háziorvos kollégát ennek beadására.
Hypophysis-mellékvese tengely rendezett, DXM-re megfelelő supressio. Pajzsmirigy szemponijából euthyreosis.
Labor kontroll 2023. Április végén esedékes: tesztoszteron, GOT, OPT, ALP, GGT, PSA.
Lelettel kontroll.

Diagnózis:

St. post ehemoth pp lymphomam
Centralis hypogonadizmus, centralis Cushing in obs.

, 2023. február 09.

belgyógyász-endokrinológus orvos

#69

06/2023.09.05.

Nevezés	Eredmény	Referencia	Mértékegység
Transzferrin telítettség	49	20 - 55	%
Koleszterin	5,66	2,60 - 5,20	mmol/l
Trigliceridek	1,90	0,70	mmol/l
HDL-koleszterin	1,18	1,04 - 1,50	mmol/l
Laktát-dehidrogenáz (LDH)	143	248	U/l
Endokrinológia			
D-vitamin (25-OH)	104,1		nmol/l
D-vitamin hiány (<25 nmol/l)			
Elégtelen mennyiség (25 - 75 nmol/l)			
Megfelelő szint (75 - 250 nmol/l)			
Túlzott bevétel (>250 nmol/l)			
Totál tesztoszteron	8,43	6,10 - 27,10	nmol/l
Kortizol (szérum)	549,44		nmol/l
6 éves kor felett délelőtt 185-624 nmol/l, délután <276 nmol/l			
Validálta: .			

2023.10.10.

Nevezés	Eredmény	Referencia	Mértékegység
Teljes vaskötő kapacitás	60,7	42,8 - 85,6	mmol/l
Transzferrin	2,4	2,0 - 3,6	g/l
Transzferrin telítettség	20	20 - 55	%
Koleszterin	5,10	2,60 - 5,20	mmol/l
Trigliceridek	1,50	0,70	mmol/l
HDL-koleszterin	1,11	1,04 - 1,50	mmol/l
Laktát-dehidrogenáz (LDH)	148	248	U/l
Cink (Zn)*	Polyamatban		
Endokrinológia			
D-vitamin (25-OH)	113,3		nmol/l
D-vitamin hiány (<25 nmol/l)			
Elégtelen mennyiség (25 - 75 nmol/l)			
Megfelelő szint (75 - 250 nmol/l)			
Túlzott bevétel (>250 nmol/l)			
TSH	0,737	0,380 - 5,330	mIU/l
Szabad T4 (fT4)	11,09	7,00 - 15,96	pmol/l
Szabad T3 (fT3)	5,92	3,80 - 6,00	pmol/l
Totál tesztoszteron	7,56	6,10 - 27,10	nmol/l
Vitaminok, nyomelemek			
Szelén*	Polyamatban		
Allergia/intolerancia			
Teljes panel - 295 allergén*	Polyamatban		
Hisztamin intolerancia (DAO)*	Polyamatban		
Validálta: .			

A leletet a Kft. készítette a laboratóriumi információk rendszerében.
 *al jelölt vizsgálatokat közreműködő partner végezte.
 Amennyiben egy vizsgálatnál a referenciatartomány mezője üres, az az adott paraméternél nem értelmezhető.
 A laboratóriumi leletet a szakma szabályainak megfelelően mindig a körleírással és a klinikai tünetekkel együtt szükséges értékelni, ezért keresse fel kezelőorvosát!
 Aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

Haematológiai szakambulancia

Oszt. vez. főorvos:

Tel : 1

NFAK

Fax : .

NNK ..

AMBULÁNS KEZELŐLAP

Beteg neve	Péter	KBA
Születéskori név		Ismeretlen
Születési dátum	1981.07.26	TAJ
Anyja neve		Naplószám
Lakcím		Térítési kategória : 1
Telefonszám		
Felvételi dátum	2023.09.18 07:58	
Beküldő	Haematológiai szakambulancia	

Anamnézis

A sternumot infiltráló nagy kiterjedésű mediastinalis térfoglalás szövettani vizsgálata DLBCL-t (GC subtypus/PM DLBCL) igazolt. Spermafigyaszást és beleegyezését követően R-CHOP kezelést indítottunk. (2021.03.29-én)

HBV és HCV-negatív

2021.03.22-i PETCT: Vélemény: High-grade lymphoma manifestációknak megfelelő, az előlso mediastinumot kitöltő, az egész sternumot destruáló, a ventralis mellkasfali subcutisba, illetve a jugulumba is propagáló, környező képletektől el nem választható, intenzíven akkumuláló ? Bulky? megjelenésű, kiterjedt, conflualo, konglomerátumszerű lágyrésztörzsek, illetve környezetükben különálló farmakon dúsító supradiaphragmaticus nyirokcsomók észlelhetők. A normál méretű pajzsmirigy mérsékelt farmakon felvétellel körjelző értéke nem egyértelmű. Gastritis? A sternumot destruáló eltérések mellett diffúzamérsékelt fokozott csontvelői aktivitás észlelhető, határozott göccs jelleg nélkül.

2021.03.29-2021.07.19-ig 8 ciklus R-CHOP(14) kezelést kapott.

2021.05.31-i PETCT: Vélemény: Az előzőleg észlelhető, sternumot destruáló, kiterjedt pra- és retrosternalis terjedést mutató konglomerátumszerű törzsek, illetve a környező nyirokcsomók igen kifejezett morfo-metabolikus regressziót mutatnak, a SUV csökkenés mértéke közel 80%-os, az identicusan detektálható diszkrét residuális aktivitás-többlet a májparenchyma aktivitását már nem haladja meg, mely az alkalmazott terápia eredményességére utal. Deauville score 3. Más lokalizációban FDG-avid macroscopos lymphoma manifestációra utaló eltérés nem jelent meg. Összesen 8 ciklus R-CHOP(14) kezelés adása javasolt. (dr. R.P)

2021.09.07-i PETCT: Vélemény: Jelenleg metabolikusan aktív lymphoma manifestációra utaló körülrán dúsító góc nem észlelhető. Metabolikus CR véleményezhető. A destruált sternumnak megfelelően patológiás-fokális farmakon dúsulás nem azonosítható. Az előzőleg észlelhető pra- és retrosternalis lágyrész-többletek további morfológiai regressziója látható, identicusan a vérpool aktivitását meghaladó körjelző-körülrán tracer akkumuláció nem észlelhető. Más lokalizációban aktív lymphoma manifestációra utaló körülrán akkumuláló góc nem jelent meg. Deauville score 2. A szájjad-garatív régióban észlelhető sávszerű-szimmetrikus aktivitás-többlet vaz. nem körjelző (aszpecifikus esetleg inflammatorikus eredetű lehet). Haematológiai teendőt nem igényel

2022.03.07-i PETCT: Vélemény: Relapsusra/progresszióra utaló eltérés nem észlelhető. Továbbra is metabolikus CR véleményezhető. A körjelző farmakon dúsítást nem mutató, destruált sternum környezetében követett sávszerű lágyrész-többletek kiterjedése tovább mérséklődött.

2023.02.07-i PETCT: Vélemény: Egyértelműen relapsusra/progresszióra utaló eltérés nem észlelhető. A sternumban követett lyticus területek kiterjedése tovább mérséklődött, fokozódó scleroticus sternum átépülés látható, továbbra is patológiás farmakon dualitás nélkül. A sternum környezetében követett sávazero residuális lágyrésztöbbletek kiterjedése tovább mérséklődött, patológiás farmakon dualitás továbbra sem mutatnak. A tömegesebbé váló, szokásosnál intenzívebb farmakon dualitást mutató tonsillák inkább reaktív/inflammatorikus eredetűek lehetnek. F. O-G kontroll javasolható. PETCT vizsgálatkor fájt a torok. 2023.07.24: Soron kívül érkezik. Az elmúlt hét folyamán 2 alkalommal profíz éjszakai izzadás jelentkezett. Előtte fényirást követően subfebrilis volt. Javult 3 napig napi 500 mg azithromycin szedése. LDH emelkedett, emiatt PET/CT kontrollt kérünk (2023.07.31.) Leleteivel 2023.08.07-én kérjük jelentkezzen Haematológiail Szekambulanciánkon.

2023.08.07: PETCT eredményét érkezik. 2023.07.31-i PETCT: Vélemény: Relapsusra/progresszióra jellegzetes eltérés nem azonosítható. A szimmetrikus tonsillaris aktivitás-többlet reaktívnek imponál, a tonsillák az előző vizsgálattal összevetve kevésbé tűnnek tömegesnek. A sternumban követett lyticus eltérések diszkrét további regressziója, a scleroticus sternalla átépülés diszkrét további fokozódása, a parasternalis sávazero lágyrésztöbbletek további partialis regressziója látható. A bal inguinális és bal parailiacalisan megjelölő, körös mérhető alatti, diszkrét/inersékelt metabolikus aktivitású nyirokcsomók elsősorban reaktívnek imponálnak. Egyelőre bemat. teendőt nem igényel. Kontroll 2023.09. 18.(LDH és CRP) 2023.09.18. panasza nincs, vérképe jó. Teendőt nem igényel. Kontroll: 2024.01.22.

Státusz

Mellkasi, hasi panaszai nincsenek. Kp. fejlett és táplált, jó általános állapotú. Éber és orientált. Cardiopulmonalis statusa stabil. Akut neurológiai kórel nincsen. ECOG:0.

Labor vizsgálatok

KLAB Központi laboratórium
2023.09.18 08:01 - (L-SURGOS) Sürgős
kérdőlap

	Érték	Egység	AbnReferencia tart.	
Fehérvércsejt	6.66	G/l	4.50-10.00	F
Neutrofil sz	3.26	G/l	2.00-8.50	F
Neutrofil %	48.8	%	45.0-75.0	F
Limfocita sz	2.55	G/l	1.00-5.00	F
Limfocita %	38.3	%	25.0-45.0	F
Monocita sz	0.63	G/l	0.01-1.00	F
Monocita %	9.5	%	2.0-8.0	F
Eozinofil sz	0.11	G/l	0.00-0.50	F
Eozinofil %	1.7	%	0.0-4.0	F
Bazofil sz	0.07	G/l	0.00-0.50	F
Bazofil %	1.1	%	0.0-1.0	F
IG	0.04	G/l		F
IG %	0.6	%		F
NLR	1.3		0.0-6.0	F
Vörösvértest	5.06	T/l	4.50-5.90	F
Hemoglobin	150	g/l	140-175	F
Hematokrit	44.3	%	40.0-52.0	F
MCV	87.5	fl	80.0-96.0	F
MCH	30	pg	28-35	F
MCHC	339	g/l	320-360	F



DIAGNOSZTIKAI, ONKORADIODIOLÓGIAI, KUTATÁSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT



Orv. vez. főorvos:

PET/CT VIZSGALATI LELET

Név Páter Nyilvántartási szám
Születési dátum 1981.07.26
T.A.J
Anyja neve
Lakcím
Beutaló orvos
Beküldő
Hemionkológiai szakambulancia

Siemens Biograph TruePoint 64 PET/CT	Lékepezett tárgy	Környezeti hőmérséklet
Radiofarmakon (RF) 18F-FDG	RF beadástól eltelt idő (ó: p):	01:06
Injektált aktivitás: 441 MBq	PET ábrázolóknak száma:	8
RF beadás helye: bal kézfej	PET edelgyújtási idő (perc):	3.0
RF beadás ideje: 07:52	Premedicatio:	-
		CT paraméterek
		CT kontrasztanyag
		Vércukorszint
		Testsúlymagasság

Indikáció:

NHL, restaging

Kontroll PET/CT, az előző 2023.07.31-i vizsgálatával összevetve:

Lelet:

A továbbra is szimmetrikusan klassz tömegesebb tonilla palatínának megfelelően érdemben változatlan, szimmetrikus tracer beépülés észlelhető SUV(bm)max: 7,3. Egyebekben a gerát és a gége érdemi eltérés nélkül ábrázolódnak. A nyaki, supraclavicularis, axillaris és mediastinális régiókban megnagyobbodott, vagy körülírtan akkumuláló igli továbbra sem azonosítható. A sternumnak megfelelően szignifikáns változást nem mutat, kiterjedt, inhomogén scleroticus átépülés látható, mely érdemi farmakon dúsítást továbbra sem mutat. A sternum környezetében követett keskeny-sáv szerű légyszűrés-többletek kiterjedése érdemben nem változott, kórosan továbbra sem akkumulálódnak. A pulmonalis status érdemben továbbra sem változott, a tüdőben FDG-t halmazó góc nem jelent meg, az előzőleg észlelhető residuális pleuropulmonalis eltérések változatlanul ábrázolódnak. A tüdőben malignitásra utaló novum/progrediáló góc továbbra sem észlelhető. Pleuralis, pericardialis folyadékgyülem továbbra sem észlelhető. Az emlők érdemi eltérés nélkül ábrázolódnak. A máj mérete csökkent (cranio-caudalis kiterjedés 19 cm-ről 15,5 cm-re csökkent), intrahepaticusan FDG-t halmazó góc továbbra sem detektálható. A lép, a pancreas és a mellékvesék jelenleg is érdemi eltérés nélkül ábrázolódnak. A vesékben és a hólyagban normál kiválasztásnak megfelelő aktivitás detektálható, üregrendszeri tárgyat egyik oldalon sem ábrázolódik. Az előzőleg a bal inguinális és periaxillaris régiókban ábrázoló góros mérethárta nem meghaladó, mérsékelt dúsító nyirokcsomók morfo-metabolikus regressziója látható, méretük néhány mm-re mérséklődött, fokozott farmakon dúsítást már nem mutatnak. Aktuálisan az infradiaphragmaticus nyirokregiókban megnagyobbodott vagy körülírtan akkumuláló igli, már nem látható. Jelenleg is helyenként mérsékelt, segmentális, aspecifikus intestinális aktivitás észlelhető, melyen belül aktuálisan a coecumnak megfelelően egy 1,5 cm körüli, relatíve körülírt aktivitás-többlet is elkülöníthető, SUV(bm)max: 5. A prosztatának, illetve a vesicula seminalisoknak megfelelően patológiás-fókális FDG halmazás jelenleg sem detektálható. Ascites nem jelent meg. A leképezett csontrendszerben malignitásra utaló körülírtan akkumuláló góc nem jelent meg (sterilis sem). A csontvelői aktivitás diffúzan sem vált érdemben fokozottá.

Vélemény:

Relapsusra/progrediálásra utaló jel továbbra sem azonosítható, metabolikus CR véleményezhető. A scleroticusan átépült sternumnak megfelelően patológiás FDG akkumuláló továbbra sem azonosítható, a nem halmazó parasternalis sáv szerű légyszűrés-többletek érdemben változatlanul ábrázolódnak. A változatlan szimmetrikus tonillaris aktivitás-többlet továbbra is reaktívnak imponál. A máj mérete csökkent. Az előzőleg ábrázoló góros mérethárta alatti, mérsékelt metabolikus aktivitású, reaktív karakterű bal periaxillaris és inguinális nyirokcsomók morfo-metabolikus regressziója látható. A coecumnak megfelelően észlelhető relatíve körülírt aktivitás-többlet hátterében polip lehetősége felmerül.

2024.08.05

radiológiai szakorvos

nukleáris medicina szakorvos

#72

DEPRESSZIÓ

#73

DEPRESSZIÓ

Krisztián, férfi (24)

Kiindulási állapot:

Kisgyermekként sokat jártam gyermekpszichológushoz, időnként homeopátiás szorongás csökkentőt is szedtem. Végül aztán ami a legjobban bevált, az nem más mint egy terápiás kiskutyus, egy tacskó, ami főként az éjszakai félelmeim feloldására nyújtott segítséget.

Az érettségi előtti feszültség oldására a pszichiáter írt ki gyógyszert is, de úgy éreztem nem tudok tőle a tanulásra fókuszálni, így abbahagytam a szedését. Azóta nem fogyasztok gyógyszereket.

Zárkózott természetű vagyok. 24 évesen egészségügyi kihívásként az érzelmi labilitás, gyakori depresszív hangulat, tömegiszony, antiszociális hozzáállás, 6 éves testépítésnek köszönhetően ízületi panaszok, és láncdohányosként az elektromos cigaretta káros hatásai szerepeltek.

2022.08.07-én kezdtem el fogyasztani a Purtiert.

Adagolás:

Napi 1 kapszulával kezdtem 2-3 napig, majd 2x1 kapszula. Egy hét után emeltem az adagot 3x2 kapszulára. Az utolsó doboznál csökkentettem vissza fokozatosan az adagot, napi kb. 4 liter víz fogyasztása mellett.

Az elmúlt időszakban kicsit több a nevetés. Az edzések okozta ízületi panaszok megszűntek. Már néhány nap Purtier fogyasztását követően a tüdőm elkezdett tisztulni. Sikerült megválnom az elektromos cigarettától, de a nikotin függőség más formában megmaradt.

A kúra befejezése után kissé nyitottabb lettem.



Lelet: 2021.10.20

Beküldő:
Kezelés dátuma: 2021.10.20 10:54 - Naplószám:
Lelet:
Dg: Heveny subendocardialis szívizomelhalás., Pitv.fibr.
Mitralis billentyű: vékony, hátsó anulus meszes MI: III
Aorta gyök: 27 mm Aorta billentyű: scler. Ao vmax: 1,2 m/s AI: I
Tricuspidalis billentyű: vékony, TI: III-IV Becsült pulmonalis systolés nyomás: 45 Hgmm
Pulmonalis billentyű: vékony
Bal kamra végdiastolés átmérő: 55 mm Bal kamra végsystolés átmérő: 42 mm
Septum vastagsága: 9 mm Hátsó fal vastagsága: 10 mm
Bal pitvar: 35x63 mm Jobb pitvar: 35x58 mm Jobb kamra: 39 mm TAPSE: 13 mm
Ejektions frakció: Teicholz: 35 %
Doppler: E: - m/s A: - m/s
Vélemény:
Tágabb bal pitvar és jobb szívfél, jelentősen csökkent bal kamrai pumpafunkció. A septum egésze, a szívcsücs és az anterior fal hypo-akin.
Enyhe AI.
Közepes fokú MI, jelentős TI.
Csökkent longit. funkció.
Emelkedett számított pulmonalis systolés nyomás.
Pericardium szabad.
Intracardialis thrombus nem látható.

Lelet: 2023.03.24

TAJ szám:
Dátum: 2023-03-24
Anyja neve:
Orvos:
Cím:
#

Anamnézis:

Kontrollra érkezett. Ujkeletu kard. panaszt negal.

Gyógyszer: Nebivolol 5mg 1x1, Entresto 24/26mg 1x1, Jardiance 25mg 1x1/2, Xarelto 20mg 1x1, Verosprion 25mg 1x1/2 Furosemid + Kalium R heti2x1 Milurit 100mg 1x1, Rosuvastatin 40mg 1x1, Metolthyrin 10mg heti 2x1/2

labor eGFR:56 glu:4.1 HbA1C:6.1 lipidek rendben, GGT:170 seBI: 36.3 (indirekt) egyebeket lásd leleiben

Státusz:

EKG: Pitvarfibrillatio, kp. R tengely, Fr: 94/min, QRS: 97msec, QTC: 478msec, norm. repol. Sec. repol. eltérések.

RR 110/70Hgmm

Fluikális vizsgálat során kompenzált keringés, norm. szívhátárok , ritmusos tiszta szívhangok, relevans zorej nem hallható. Rekeszek kitérnek pulmo tszta.
Ts: 49 kg Tm: 138 cm BMI: 25.73 kg/m2

ECHOCARDIOGRAPHIA

Mitralis billentyű: anulus scler MI: II-III
Aorta gyök: mm Aorta billentyű: scler Ao vmax: 1,2m/s, AI: I
Tricuspidalis billentyű: vékony, TI: II Becsült pulmonalis systolés nyomás: 30 Hgmm
Pulmonalis billentyű: vékony
Bal kamra végdiastolés átmérő: 46mm Bal kamra végsystolés átmérő: 29mm
Septum vastagsága: mm Hátsó fal vastagsága: mm
Bal pitvar: 43x68mm Jobb pitvar: 40x60mm Jobb kamra: 35mm
Ejektions frakció: Teicholz: (60-10) 50 %

Vélemény: Normális tágasságú szívregek, kissé csökkent bal kamrai pumpafunkció. Korult inferior hypoakinezis. Assynchron falmozgások.
Relaxatio zavarra jellemző mitrális beáramlási görbe.
Enyhe MI, AI, TI.
Pericardium szabad.

Javaslat:

Kissé csökkent eGFR és életkora miatt Xarelto helyett Eliquis 2x5 mg legyen. Entresto adagja 49/51 mg 2x1/2 szedése javasolt, egyéb terápia folytatása változatlanul.(gyógyszerjavassalattal ellátva)

Kntroll: friss laborokkal 1/2 év múlva.

Diagnózis:

1. Heveny subendocardialis szívizomelhalás
2. Mitralis billentyű: vékony, hátsó anulus meszes
3. Aorta gyök: 27 mm Aorta billentyű: scler
4. Tricuspidalis billentyű: vékony, TI: III-IV
5. Becsült pulmonalis systolés nyomás: 45 Hgmm
6. Pulmonalis billentyű: vékony
7. Bal kamra végdiastolés átmérő: 55 mm
8. Bal kamra végsystolés átmérő: 42 mm
9. Septum vastagsága: 9 mm
10. Hátsó fal vastagsága: 10 mm
11. Bal pitvar: 35x63 mm
12. Jobb pitvar: 35x58 mm
13. Jobb kamra: 39 mm
14. TAPSE: 13 mm
15. Ejektiós frakció: Teicholz: 35 %
16. Doppler: E: - m/s A: - m/s
17. Vélemény: Tágabb bal pitvar és jobb szívfél, jelentősen csökkent bal kamrai pumpafunkció. A septum egésze, a szívcsücs és az anterior fal hypo-akin.
18. Enyhe AI.
19. Közepes fokú MI, jelentős TI.
20. Csökkent longit. funkció.
21. Emelkedett számított pulmonalis systolés nyomás.
22. Pericardium szabad.
23. Intracardialis thrombus nem látható.

Státusz:
Dátum:
Orvos:
Cím:
#

Adagolás: Napi 2x2 kapszula

Kiindulási állapot és a Purtier hatásának leírása:

Érdekes jelenségnek számított a következő: tavaly térdre estem. Annyira megütöttem magam, hogy 1-2 percig azt sem tudtam hol vagyok. Nagyon fájtak a térdeim, nehezen álltam fel. Néhány hét alatt ez meggyógyult.

Amikor januárban elkezdtem szedni a Purtiert ez a fájdalom szinte ugyanolyan erősen előjött, begyulladtak a térdeim, forrók voltak érezhetően, és pirosak. Két nap után nyomtalanul eltűnt minden!

Hasonló fájdalom néha megjelentek a derekamban, karomban. De azokra nem tudtam visszaemlékezni pontosan, hogy mihez kapcsolhatóak.

Gyerekkorom óta fázós voltam. Egyedül terhesség ideje alatt néhány hónapig nem fáztam. De azóta is mindig, ha 25 fok alatt volt az idő; bokáznit például sose hordok!

Február közepén feleltem, hogy valami nem úgy van velem, mint eddig. Néztam az időjárást: nem volt meleg. És akkor eszembe jutott, hogy a Purtier valószínűleg a mikrokeringésem is dolgozott, mert ez a fázás, didergés megváltozott bennem. Elmúlt. Egyszerűen nem fázok. Aminek nagyon örülök.

Két évig hiperventilációim voltak. Ez valószínű, hogy a gyerekkoromban kezdődött kalcium hiány miatt volt. A heves szívverés, gyengeség, idegkimerülés, levegőhiány jellemezte egyre sűrűbben a napjaimat.

Január elején kezdtem el szedni a Purtiert, és január végére teljesen elmúltak ezek a fenti tünetek. Nem kell leüljek pihenni, nem szakad rám a fáradtság, a heves szívverés, semmi rossz érzet; szellemileg is sokkal stabilabb vagyok.

Lelki állapotom: gyerekkoromból származó önértékelési problémák néha kicsapódtak rajtam, néha a stressz nagyon odavágott és egyre sűrűbben (ezek összeköthetők a kalcium hiánnyal és a hiperventilációkkal). Ilyenkor nagyon kevésnek, gyengének, „gyenge elméjűnek” éreztem magam, mint aki nem képes gondolkodni, mintha blokkolódott volna az agyam. Ez utóbbiak akkor kezdődtek, amikor néhány éve Covidos voltam, állítólag egyes embereknek a „vírus” az idegrendszerét támadta.

Ha sietni kellett valahova, ha késésben voltam, ha nem tudtam úgy elvégezni bármilyen dolgomat, ahogyan én szerettem volna, ezek a tünetek sokszor egyszerre ütöttek ki rajtam és lehangoltak! Bezárkózottnak, kilátástalan helyzetűnek éreztem magam, holott semmi okom nem volt rá!

Ez annyira megváltozott a Purtier használata után másfél hónappal, hogy amikor két hétig szerveztünk egy rendezvényt, egyszer sem fáadtam el, nem volt nehéz semmi, akármennyit vezethettem, telefonálhattam, dolgozhattam, nem éreztem fáradtságot, sem levertséget. Sőt, ha rossz híreket kaptam sem rengettek meg.

Nagyon egyszerűen mondva: nagyon jó lelkiállapotban érzem magam! Boldog vagyok! És nagyon hálás vagyok, hogy az önértékelésem is stabilizálódott!

És ennek a férjem is kimondhatatlanul örül! Szerintem jobban, mint a saját tapasztalatának!

Kiindulási állapot:

Szívrogtatózavarban szenvedtem, magas vérnyomásom volt, depressziós tüneteim voltak és visszakerem (zenész voltam fiatal koromban ez is nagyban közrejátszott).

Adagolás:

1- 3. hónap napi 2x1

4. hónaptól napi 1 reggel

Gyógyszerek:

Coverex - reggel 1, Bisoprolol - reggel 1

Vízfogyasztás:

1,5 L

A Purrier-t 2023 áprilisában ismertem meg. A depresszív tünetek már az első hónapban javultak, kedélyállapotom jobb, energiám több, a munkakedvem megnőtt. Sokkal jobban és mélyebben alszom. Eddig, ha felébredtem éjszaka, volt, hogy 2-3 órán át sem tudtam visszaaludni. Mióta a Purrier-t szedem, már 3-5 nap után azt vettem észre, hogy éjszaka visszaalszom és reggel kipihten ébredek.

Évek óta magas vérnyomásom volt, amit a gyógyszerekkel sem tudtak beállítani (folyton ingadozott). Purrier szedése óta már nem ugrál a vérnyomásom, stabilan 125/90 körül mozog. Szívrogtatózavarom április óta hatékonyan megszűnt (azóta nem éreztem erősebb szívdobogást), visszereimen is dolgozott a kapszula. Azóta sokkal kevesebbet görcsöl a lábam.

Összességében rengeteg pozitív hatása van eddig a Purriernek a mindennapjaimra, sokkal vidámabb vagyok és pozitívabb, aminek a szerettem örülnek a legjobban.

EMÉSZTÉS

BÉLGYULLADÁS

Attila, férfi (47)

Kiindulási állapot:

27 éve fennálló bélgyulladás - Colitis ulcerosa. 2023. június első hetében kezdtem el szedni a Purtiert.

Adagolás: napi 2x2

4. doboztól: 2x1 db

Vízfogyasztás: 3 L vagy több

Gyógyszer: Budenofalk és Salofalk - egyik sem hatott. Kúra előtt Herba-fulvot ittam (huminsav).

Az első doboz beszedése után még lényeges változás nem történt. A második felénél kezdtem érezni komolyabb javulást. Energiám lényegesen több volt. Az egyes ételek fogyasztásakor nem voltam rosszul, amiket addig teljesen ki kellett hagynom az étrendemből.

Nagyon sok mindent nem ehettem. Fájdalmaimra nagyon erős fájdalomcsillapítók sem mindig hatottak. Orvosi javaslatra opiátokat szedtem. Sokszor véres volt a székletem, vagy olyan hetekig tartó hasmenésem volt, amitől a munkám nem tudtam elvégezni és otthonról sem tudtam elmenni.

A 2. doboz fogyasztása hozta meg a komolyabb eredményt. A 3. doboztól pedig a tejes kávé kivételével, szinte mindent fogyaszthattam. A kúra alatt semmilyen más gyógyszert nem szedtem, csak vitaminokat. A fájdalomcsillapítókra pedig már egyáltalán nem volt szükségem. Mostanra teljesen tünetmentes vagyok (2023 szeptember)!

A férfiasságom és az energiám 20 éves korom szintjére ugrott vissza, aminek nagyon örül a feleségem is.

Jelenleg a 7. doboznál tartok. Az utolsó doboz szedésekor elkapott egy vírusos hányás- hasmenéses betegség, amit 3 nap alatt teljesen kihevertem. Ez régebben hetekig is eltartott.

Az életem sokkal komfortosabb és fájdalommentes lett a PURTIER-nek köszönhetően.

PUFFADÁS

Róbert, férfi (47)

Kiindulási állapot:

Nem volt komoly problémám, csak étkezések után jelentkeztek néha puffadások. Igazából megelőzés céljából kezdtem el a Purtiert fogyasztani 2023 áprilisában.

Szedés megkezdése után az 1. héten csak a jobb alvásminőség volt megfigyelhető. A 2. héten az étkezések utáni puffadás teljesen megszűnt. Vele egy időben hol erősebb, hol gyengébb mellkasi (szív környéki) fájdalom kezdődött, ami kicsit frusztrált is, de a termék szedését nem hagytam abba. Ez ahogy jött, úgy el is múlt pár nap után és azóta sem tért vissza. Ami még érdekes, hogy pár napig a hangulatom ingadozó volt, de ez is csak átmenetileg.

Minden reggel fekvőtámaszozok, eddig napi 20-at szoktam, de mióta a Purtiert szedem könnyedén megy a 40 is. Teherbírásom sokkal jobb. Építkezési vállalkozóként dolgozom és mint jó főnök néha segítek a munkásaimnak, pár hónapja azzal fenyegetnek felmondanak, mert nem bírják velem a tempót.

Amit még megemlítenék a termék nagyon jó a potenciára is.

A Purtier-nak köszönhetően újra 30 évesnek érzem magam a munkabírásom, olyan mint régen, minden reggel kipihenten ébredek kevés alvás után is.



Adagolás: 2x1,
első hét után 2x2
Vízfogyasztás: 2,5 L

Kiindulási állapot:

22 éves vagyok. Jessicának hívnak. Hogy miért is a korommal kezdek először? Az mindjárt kiderül.

Külsőleg akár egy tini, úgy nézek ki. Viszont ez sajnós a belsőmről, ami az egészségemet illeti, nem mondható el. Belsőm egy idős nő szervezetének felel meg.

Már a születésemkor megjelentek nálam az első problémák, nem tudtam könnyen világra jönni úgy, mint a többiek. A szülésnél megrántották a fejemet, emiatt epilepsiám lett. Ezt szerencsére nagy részben kinőttem, viszont valamennyire továbbra is jelen maradt az életemben. Ha dübörgő zenét hallok vagy intenzív fények érnek, mintha görcsölne az agyam. 2 hónapos koromban kialakult az ekcéma. 4 hónapos koromban az allergia, begyulladt a szemem, folyt az orrom és viszketett a fülem. 8 hónaposan nehézlégzéssel bekerültem a kórházba. Ott megállapították, hogy asztmám van és már kisgyermekként hormon tartalmú spray-t kaptam. Jellemző volt rám, hogy minden vírust, baktériumot mágnesként vonzottam, és ha összeszedtem valamit, belázasodtam. Vesepanaszok miatt is sokat feküdtem a kórházban. A szteroid tartalmú spray-től megnőtt az étvágyam, szinte az evés jelentette a kedvenc időtöltésemet, ezért már kiskoromban elhíztam, sokan csúfoltak emiatt, lelki problémáim is lettek.

Sajnos epehólyag fejlődési rendellenességgel születtem, ami megkeserítette az életem. Ugyanis akármit ettem, ami túl volt fűszerezve, másnap szintisza sárga epét hánytam, egy nap akár 6x is.

Ahogy "idősödtem", emésztési zavaraim kezdődtek, naponta akár 10x is hánytam. Persze, ezek után következtek a mandula-, illetve torokgyulladások, asztmás rohamok. Könnyen felfáztam.



Adagolás:
1x1, 2x2 (nyálkahártyán
valófelszívódás)

Nálam egy átlagos betegség kétszer annyi ideig tartott. Ebből kifolyólag kaptam mindenféle immunerősítőt szájon át, illetve injekció formájában.

13 éves koromban aranyerem alakult ki.

16 éves koromban 5 centiméteres petefészek cisztát diagnosztizáltak, ami miatt fogamzásgátlót szedek.

Számtalan dologra vagyok, illetve voltam allergiás. A virágpor garantált meghívást jelentett az asztmámnak. Ezen kívül még a nap- és alkohol allergia is kialakult.

Két éve leukémia lehetősége merült fel nálam. Nem könnyű ennyi betegség és megpróbáltatás után ezzel a gyanúval élni.

21 évesen kialakult egy komoly bélbetegségem. Nem tudtam megenni semmilyen lisztes, cukortartalmú, édesítőszerrel ellátott, illetve tejes élelmiszert. Még bizonyos zöldség, illetve gyümölcs fajtáktól is rosszul voltam, mint például a paprikától. Ha olyat ettem, elképesztően puffadtam, szúrt jobbról-balról a hasam, az egész hasfalam, mintha le akart volna szakadni. Többször előfordult, hogy akár 1,5 hétig sem volt székletem. Gyomorsavtúltengés miatt többször hánytam, sőt ez asztmás rohamot is provokált.

2023 július 1. volt számomra az a nap, ami egy új reményt hozott a teljeskörű életre.

Egy hét sem kellett és a Purtiernek köszönhetően a bélbetegségem teljesen elmúlt! Számomra ez felér egy csodával. Ehetek mindent, igaz könnyes szemmel az örömtől. Nincsen kellemetlen puffadásom, illetve hasszűrésom.

Most lett 3 hónapja, hogy használok ezt a terméket és már ütős csodák történtek az életemben. Rendszeresen érzek hasam különböző pontjain átmeneti szűró fájdalmakat. Helyre állt az emésztésem, előfordul lábszibbadás is. Szervezetem jobban igényli az alvást, aminek minősége jobb lett.

Elmúlt a nap-, alkohol illetve mára már a banán allergiám is. Eszek mindent, azóta sem epét, sem savat nem hánytam. Ha leülök valamilyen hideg helyre vagy ha nem figyelek oda, már nincs olyan, hogy másnap dől belőlem a véres vizelet, annyira megerősödött az immunrendszerem. Elmúlt az aranyerem.

Nemrég mandula gyulladásom volt, ami sokkal gyorsabban elmúlt a szokásosnál. Ekkor megemeltem a Purtier adagját 2x2-re, és 3 nap alatt

átment rajtam a betegség. Csak hőemelkedésem volt, és ami a legcsodálatosabb, az ilyenkor 1-2 hónapig elhúzódó asztmás rohamaim 3 nap után teljesen megszűntek, csakúgy mint a kiskoromtól jelentkező durva éjszakai rohamok.

Körmeim 2x gyorsabban nőnek, hajam selymesebb, bőröm egyre feszesebb és halványul a narancsbőröm is. Sokkal finomabb tapintású a bőröm.

Ez még csak 3 hónap eredménye, kíváncsian várom a további eredményeket!

Hálás vagyok, hogy a Purtiert szedhetem és már rövid időn belül ennyi pozitív változás van a szervezetemben!

REFLUX

László, férfi (45)

Kiindulási állapot:

Nyers húskészítmények fogyasztása után (kolbász, téli szalámi) körülbelül 1,5 órán keresztül nehezebben tudtam nyelni minden alkalommal, mint ha egy gombóc lett volna a torkomban. Reggelente erős köhögés gyötört. A Purtiert 2022. október 15.-én ismerem meg.

Kezdetben aluszékony lettem, és enyhe ízületi fájdalom jelentkezett. A tünetem február körül teljesen megszűnt, illetve sokkal kevesebbet köhögtem reggelenként is köszönhetően a Purtiernek.



#84

Adagolás:

2x1 db

később napi 2x2 db

REFLUX

Csilla, nő (63)

Kiindulási állapot:

Évek óta küzdöttem a reflux-szal, ami nagyon kellemetlen volt számomra. Ezen felül megelőzés céljából kezdtem el szedni a terméket, hogy megtartsam (esetlegesen javítsam) a jelenlegi egészségi állapotomat.

A terméket 2022.augusztusában kezdtem el szedni.

Adagolás:

Első doboz 2x1, majd pedig 2x2

Vízfogyasztás:

1,5 L

A 3. doboz elfogyasztása után elmúlt a reflux és azóta sem jött vissza.

Ciklusokban regenerálta a szervezetem, ami azt jelenti, hogy még 3x-4x éreztem az erősebb tüneteket, míg végül teljesen megszűnt a probléma.

Ismerőseim szerint jobban nézek ki és megfiatalodtam. Energikusabb vagyok és sokkal nagyobb a teherbírásom.

A Purtier kapszula mellett használom a Conscientious permetet is, amelytől fényesebb, egészségesebb a bőröm és a ráncokra is jótékony hatással van.

CS
#6



EMÉSZTÉSI PROBLÉMA

Eszter, nő (36)

Kiindulási állapot:

Emésztés probléma és laktózérzékenység, ami állandó hasmenéssel és nagyon erős fájdalommal párosult.

Achilles és sarok fájdalom, ami miatt a séta is nagy fájdalommal járt.

Vádlí fájdalma, ami egy sport sérülésből maradt fent. Túlsúly állandó evési kényszerrel. Menstruációs problémák.

Adagolás:

2023.12.18-án kezdtem el szedni a 6. generációs Purtiert reggel 2 és este 2 szemmel.

Tapasztalatom a termékkel:

Az első 3 hétben az emésztőrendszeremet teljesen kitakarította. Szédülés, hányinger, hasmenés és állandó fáradtság kíséretében napi 4 - 5 - ször jártam wc-re. A 4-dik hétre minden rosszullet megszűnt és az arcbőröm teljesen megváltozott. A pórusaim összehúzódtak, a bőröm sokkal fesesebb lett.

A második hónaptól az achilles, sarok és vádlí fájdalom megszűnt.

A menstruációm 4 hónap alatt kitisztult és szinte fájdalom mentessé vált. A vérzés mennyisége normalizálódott.

Az elfogyasztott étel mennyisége $\frac{1}{4}$ -ére csökkent, ezáltal a súlyomból is folyamatosan veszíték. A laktóz érzékenységem teljesen elmúlt!

Ajándék hatások: Sokkal fesesebb a bőröm. Energikusabb vagyok és sokkal kevesebbet alszom.



FÜLZÚGÁS

FÜLZÚGÁS

József, férfi (75)

Kiindulási állapot :

A fülzúgás kb. 5 éve kezdődött, ami valószínűleg egy korábban szedett vérnyomáscsökkentő gyógyszer mellékhatásának köszönhető. 50 éves korom után észrevettem a reuma első tüneteit, ami odáig vezetett, hogy a kúra elkezdése előtt már nem tudtam rendesen ökölbe szorítani a kezemet, és a karomat sem tudtam kinyújtani. Ezek a tünetek sajnos már a lábaimon is jelentkeztek.

Purtier használatának kezdete:

2022 szeptember.

Folyadékbevitel:

3 L

Innentől a feleség meséli el férje történetét: 2022 december elején (az 5. doboz Purtier-nél tartva) egyik este - lefekvéshez készülődve, a férjem furcsa arckifejezéssel, elgondolkodva üldögélt az ágy szélén. A kérdésemre: „mit csinálsz, meditálsz”? azt válaszolta: „nem... hanem azt figyelem, hogy nem hallok azt a „statikus zörejt”, ha nagyon koncentrálok, akkor is egy enyhe suhogást hallok csak (azóta ez az enyhe hang is megszűnt, kb. a kúra végére).

Ezen kívül mindkét kezén és lábfejein egyaránt reumatikus fájdalmak voltak. Hol jobban, hol kevésbé, de folyamatosan fájt neki. A kezeit nem tudta sem ökölbe szorítani, sem a tenyerét teljesen kinyitni.

A Purtier kúra elfogyasztása után pár héttel észrevette, hogy a kézfejében (bármennyire mozgatja is) napok óta nem érez fájdalmat. A lábfejében szintén, alig-alig érezhető. A kúra után, kb. 4 hónappal a lábfej reumatikus fájdalmai is megszűntek.

A fizikai és mentális erőnléte sokkal jobb, mint a kúra előtt volt. A haja kicsit dúsabb, kezdi visszanyerni a színét is. A haj sötétedésére a család hívta fel a figyelmét. Érezhetően fittebb, jobb a teherbírása, újra a régi formájában van, köszönhetően a Purtiernek.



Adagolás:

2x2 db

GERINCPROBLÉMÁK

#8

LUMBÁGÓ

László, férfi (62)

Kiindulási állapot:

2011-ben gerincsérv miatt a sportolást abba kellett teljesen hagynom. Évek óta lumbágóm van, amihez erős derékfájás társult. Munka közben részleges mellizom szakadást szenvedtem.

Adagolás: Napi 2x1

Vízfogyasztás: 1,5 L

2022. augusztusában kezdtem el szedni a Purtiert.

Kezdetben felerősödtek a derékfájdalmaim, utána viszont kb. 2 hónap elteltével rohamosan csökkenni kezdett a derékfájás, és azóta sem tért vissza, egyetlen napra sem.

Munka közben részleges mellizom szakadást szenvedtem. Erős fájdalmaim voltak és hosszú hónapokig tartó gyógyulás volt csak várható. A Purtier szedésétől számított 5. héten jelentős javulást tapasztaltam, jelenleg semmilyen fájdalmat nem érzek már.

Ezenkívül az időskori pigmentfoltjaim eltűntek a kézfejemről. Nőtt a fizikai teherbírásom, újra elkezdtem túrázni. Szinte minden ismerősöm, aki már régebben látott, megjegyzi, hogy fiatalabbnak nézek ki, mint 5 éve és hogy sokkal kipihentebbnek tűnök.

Többen az arcbőrömet dicsérik, és kérdezik használok-e valamilyen krémet.

06#

GERINCSEÉRV

Csaba, férfi (49)

Kiindulási állapot:

Vérnyomásprobléma (örökletes), 11 gerincserv, álmatlanság, térdfájás.

Problémák kezdete:

Első tünetek 18 éves koromban jelentkeztek, a munkámból adódóan (pék/cukrász) folyamatos napi fájdalommal éltem az életem, álmatlanságban szenvedtem és a térdem is évek óta fájt (sport).

Búvároktatóként dolgoztam, amíg jobban voltam. Sajnos megtörtént olyan is, hogy búvárkodás közben 15 méter mélyen becsípődött a hátgerincemnél az ideg és segítséggel tudtam csak feljönni a mélyből.

Nyaki gerincservem (ebből 3 van) műtötték 12 évvel ezelőtt. Egy ideig jó volt, aztán újra rosszabbodott az állapot. Bal karom évek óta úgy nézett ki, mint egy 90 éves karja (gerincserv tünet). 4 éve nem tudtam erősen szorítani.

Anno derékservemnél megtörtént, hogy egy ártatlan tüsszentés után "úgy maradtam", értsd a lépcsőkön kúszva másztam fel az emeletre. Nagyon megkeserítette az életem ez a betegség, és pár éve le kellett mondanom a búvárkodásról is.

Gyógyszert nem szedtem, viszont szükség szerint erős fájdalomcsillapítót igen (Xilox 50 mg).

Kúra kezdete: 2023. augusztus, azóta folytatom.

Vízfogyasztás: 3 liter felett. Étrendem nem változtattam.

Adagolás: Napi 2x1. Majd felemeltem 2x2-re, viszont 2 hét után csökkenteni kellett a rettenetes fájdalmak miatt.

Tapasztalat:

Minden fájdalom újra előjött, amit eddigi életem során éreztem, bal-esetek és ütések (motorozás és sportsérülések). A kúra megkezdése után pár héttel a karomon az izom újra elkezdett visszaépülni, újra erős a szorításom és abszolút nem fáj.



A 2. hónapban a bal combizmom összeesett egyik napról a másikra, amit követett hetekig a rettenetes lábfájás mindkét lábban. Ezalatt az idő alatt szinte menni sem tudtam. Három hét után a fájdalom egy nap megszűnt, az izom elkezdett visszaépülni.

Vérnyomásom magas, általában 190 körül volt. Extrém esetben volt (260/190).

Kapszula szedése után az első egy hétben olyan érzésem volt, mint akit fejbe vertek, majd a vérnyomásom beállt 150-re (gyógyszer nélkül).

Jól érzem magam, visszatért a régi életem (februárban merülni megyek). Energikusabbnak érzem magam. Minden reggel kipihenve, frissen ébredek. Köszönöm a Purtier-nek!

DERÉKFÁJÁS

Klára, nő (52)

Kiindulási állapot:

Krónikus derékfájás 25 éve, kosárlabdázás miatt enyhe térdfájdalmak, álmatlanság, változókori hőhullámok.

Purtier szedésének kezdete: 2022 december

Adagolás:

Eleinte naponta 1, aztán 2, később 2x1 kapszula, ekkor kezdődött a javulás. Megpróbálta emelni 2x2-re, de olyan erős derékfájdalom követte, hogy csökkenteni kellett az adagolást.

Vízfogyasztás: 1-2 L

A Purtier szedés kezdete után változókori tünetek teljesen megszűntek, nem voltak hőhullámok, így a nyugodt, pihentető alvás is visszatért. Ezzel egy időben a reggeli fáradtság is elmúlt.

A derékfájdalom jóval a kúra befejezése után kezdett extrém módon javulni. Ami azt jelenti, hogy most újra kosárlabdázik a fiatalokkal. Dobálja a palánkra elrugaszkodásból a labdát, amire már nagyon hosszú évek óta nem volt képes, mivel nem tudta terhelni sem a térdet, sem a derekát. A kosárlabdázás után nem érez fáradtságot, teljesen fitt és olyan aktív életet él, mint fiatal korában hála a Purtiernek.

Kiindulási állapot:

Évek óta gerincfájdalommal éltem, nagy valószínűséggel kezdődő gerincservem volt.

A szemeim nagyon hamar elfáradtak, azt éreztem, mintha homok lett volna a szememben.

Proszтата problémáim is voltak sajnos, ami abban mutatkozott meg, hogy sokat jártam mosdóba.

Purtier 2023. április 25.- én kezdtem el szedni.

Adagolás:

2 hétig 2x1 kapszula

3. hét után 2x2 kapszula

Folyadékbevitel:

2 L

#93

2 hónap után eltűnt a krónikus gerincfájdalom és azóta sem tért vissza. Élesebben látok, most már akár órákig is dolgozhatok a gép előtt, akkor sem fárad el a szemem.

Mostanában sokkal könnyebben elalszom, az alvásom pihentetőbb. Nem kelek fel éjszaka többször, mint azelőtt (mosdóba menni), csak reggel ébredés után megyek.

Teljesen elmúlt az évek óta tartó reggeli gyomoridegem, ami azt jelenti reggelente volt, hogy már ébredés után éreztem ezt a számomra kellemetlen érzést, még akkor is, ha semmi okom nem volt rá.

Külsőm megfiatalodott, az arcom kisimult és megváltozott az arcszínem is (rózsaszínű, üde, egészséges szín).

A körülöttem lévő emberek csodálkoznak a pozitív változáson, amit természetesen a Purtiernek köszönhetek.

GERINCSEÉRV

Hajnalka, nő (53)

Kiindulási állapot:

39 éves korom óta gerincsérvem van és pár éve vérnyomásom is magasabb a kelleténél.

A Purtiert vérnyomás csökkentés céljából kezdtem el szedni 2023. január 5.-én. Bíztram benne, hogy a gerincsérv problémákon is javítani fog.

Az első két hónap során nagyon fájt a gerincem, gerincsérvem és a hátam. Az adagoláson a 4. hónapban változtattam, 4 napig 2x2 kapszulát szedtem, ezután a problémáim enyhültek, majd teljesen elmúltak. Az 5. hónapban a máj környékén szúró fájást éreztem.

Sajnos 35 évig dohányoztam, ez a tüdőmet nagy mértékben károsította. A kapszula szedését követően rengeteget köhögtem, ez mára teljesen elmúlt.

Ezen kívül a vérnyomásom miatt 4 éve délutánonként mindig rosszul éreztem magam, ezt a Purtier megoldotta.

Vérnyomás gyógyszer:

Valsartan HTC Sandoz, 160mg/12,5mg

A terméknek köszönhetően látásom is javult. Úgy érzem újra élek és a lépcsőzés is sokkal jobban megy. Sokat dolgozom az energiám rengeteg. Külsőm megfiatalodott, barátnőm megjegyezte, hogy sokat fiatalodtam.



Adagolás:
2x1 db
(reggel, este)

#94

Kiindulási állapot:

Fejfájás 1984-től.

Gerinc probléma: 1993-ban jelentkezett.

Ízületi problémák: 1998-ban kezdtem észrevenni.

Magas vérnyomás, cukorbetegség 1998-ban derült ki, amikor először megmérte az orvos.

Szívprobléma: szívnagyobbodás, bal kamra szívbillentyű nem zár rendesen, 2003-ban derült ki.

A fejfájás 1984-től folyamatos volt, 1991-ben megpróbáltam utána járni a problémának. Több vizsgálatot is csináltak, (röntgen, CT) hogy volt-e koponyatörés korábban, vagy valamilyen daganat, ami okozhatja a folyamatos fájdalmat.

A szívproblémámból adódóan állandó fáradtság volt jelen, nem bírtam a terhelést, lépcsőzni is csak jóval lassabb tempóban tudtam és légszomjamb volt. Heti 2-3 alkalommal hajnalban arra ébredtem, hogy nem kapok levegőt, szorított a mellkasom, vert a víz.

Ízületi problémák: bokáim, térdeim, ujjaim nagyon érzékenyek voltak a hidegre. Ha megfáztam nagyon fájtak az ízületeim, ekkor a kezeimmel is nehezebben tudtam szorítani.

A gerinc probléma: 1993-ban jelentkezett egy rossz emelés következtében, és onnantól kezdve minden évben 2-3-szor a derekamnál becsípődött az idegszál. Ilyenkor 1,5-2 hétig ülni, feküdni, állni, de járni sem bírtam. 2002-ben, amikor a bal lábam érzéketlenné vált, megijedtem, mert a lábamat szó szerint húztam magam után. Ekkor vettem komolyan a problémát, elmentem orvoshoz és kiderült egy MRI vizsgálat során, hogy 3 gerincseírvem van, 2 a derekamnál és 1 a nyakamnál. Az orvos műtétet javasolt. Mielőtt műtétre való időpont egyeztetésre került volna, az egyik ismerősom ajánlására elkerültem egy szakemberhez, aki helyrehozta annyira a problémámat, hogy úgy döntöttem a végső esetben megyek csak műtétre. Próbáltam magam kímélni amennyire lehetett, de évente többször rettenetes, heteken át tartó fájdalmaim voltak.

2022.07.02.-án kezdtem el szedni a Purtiert.

Adagolás:

Másfél hónapig 2x1 (1 reggel, 1 este), két hétig 2x2 (2 reggel, 2 este), majd a kúra végéig 2x1 (1 reggel, 1 este).

Vízfogyasztás:

2-3 L

3 nap után sokkal jobban aludtam, kipihenten ébredtem és azóta érezhetően több az energiám és a közérzetem is sokkal jobb. 3 hét után javult a látásom olyan mértékben, hogy telefonon SMS-t írni és olvasni is tudok. Korábban több, mint 20 évig csak olvasó szemüveggel tudtam.

A magas vérnyomás a korábbi 180-200-hoz képest, jelenleg 140-160 között mozog.

A cukor a korábbi mérésekhez képest (16-18-21-23) jelenleg 6,8-10 között ingázik, és mindez gyógyszer nélkül.

Olyan szinten javult a szív működés, hogy a hajnali szorongások megszűntek, sokkal jobban bírom a terhelést, kevésbé vagyok fáradt. Egész nap dolgozom, tele vagyok energiával.

Az ízületi és gerincsérv problémáim nagy mértékben javultak a korábbi állapothoz képest. Érzem a derekamat, hogy van ott valami és nem teljesen tökéletes, de tudok mozogni és abszolút nem fáj.

A több, mint 30 éve fennálló napi szintű fejfájásom kb. 3 hónap után úgy megszűnt, mintha soha nem is lett volna.

Ami még megemlíteném a Purtiernak köszönhetően, régi sérülések hegeinek színe javult, pirosból átváltozott bőrszínűre. Elkezdett visszamenni a hajam, és a bőröm is bársonyosabb, világosabb.



Kiindulási állapot:

45 éves korom óta 2 gerincsérvem van. A hátam időszakosan fáj, néha jobban, néha kevésbé. A csípőm 58 éves korom óta naponta többször fáj, ami szúró érzést jelentett. Ha többet gyalogoltam, 20 méter után meg kellett állnom és várni, amíg enyhül a fájdalom. Magas vérnyomásom volt 200/110 körül mozgott.

Purtier szedésének kezdete:

2022. szeptember

Adagolás:

Napi 1 kapszula. Próbáltam napi 2 kapszulát beszedni, de nagyon ugrált a vérnyomásom és borzasztó erős fájdalmaim voltak, így vissza csökkentettem napi 1-re.

Vízfogyasztás:

Napi 2 liter

#97

A csípőmben a fájdalom 10-es skálán, 10-ről 1-re javult. Naponta kb. 10x belenyilalt a csípőmbe, viszont mára ez csökkent napi 1-re, és az sem olyan erős fájdalom, mint anno. A magas vérnyomásom 200/110 volt, mára 140/90, illetve 130/80 körül mozog. Ennek köszönhetően a gyógyszereim közül többet el tudtam hagyni.

Körmeim állandóan töredezték, ma szépek és egészségesek. Hajam dús és jobb minőségű. Az éhgyomri vércukorszintem 8-9 mmol/l volt, diéta nélkül ez beállt 5-7 mmol/l-re.

Az allergiám javult, nem folyik az orrom, mint azelőtt és allergia gyógyszerből is (amit évek óta szedtem), elég napi 3 helyett 1-et szednem. A Purtier használata közben a szívemnél szúró fájdalom jelentkezett többször, majd ez az érzés elmúlt. Az EKG leleteim javulást mutattak az orvosom szerint. Újra átalszom az éjszakát és fitten, kipihenten ébredek.

A Conscientious permetet is használom. Azóta a bőröm megfiatalodott, csillogóvá vált, kisimultak a mélyebb ráncok, az enyhék pedig eltűntek. Külsőm határozottan megfiatalodott és mivel megszűnt a mindennapi fájdalom az életemben, életminőségem nagyban javult.

Köszönöm Purtier!

GERINCSERV

László, férfi (67)

Kiindulási állapot:

2008-ban alakult ki nálam a gerincserv, ami miatt egy hétig kórházban feküdtem. Nagyon nagy fájdalmaim voltak, sőt a mosdóba is probléma volt kimenni. Nem engedtem megműteni magamat, ezért a kórházból hazaküldtek. Fájdalmaim olyan mértékűek voltak, hogy három lépés után már meg kellett állnom.

A Purtiert 2022. szeptemberében kezdtem el szedni.

Vízfogyasztás:

2-2,5 L

A szedés után egy hónappal nagyon elkezdett fájni a gerincem. Megijedtem, de ez csak egy hónapig tartott, majd érdekes módon ez magától elmúlt. Azóta úgy érzem, hogy a tartásom sokkal-sokkal erősebb.

Kettő doboz elfogyasztása után (2 hónap) elkezdett fájni a derekam. Ez 1 hónapig tartott. Már komolyabb bajtól tartottam, aztán hirtelen elmúlt. Érdekes módon azóta jól vagyok.

5 hónap után lassú fogyást érzek magamon. Kedélyállapotom jobb lett, tele vagyok energiával és a külsőm is fiatalos lett.



Adagolás:

2x1 db

DERÉKFÁJÁS

Tibor, férfi (65)

Kiindulási állapot:

A Purtiert elsősorban megelőzésre kezdtem el szedni, ugyanakkor reménykedtem abban, hogy a hosszan tartó derékfájásomnak is jót tesz. Egy héttel azután, hogy elkezdtem szedni a Purtiert, elkaptam a Covid-19-et. A betegség fáradtsággal, étvágytalansággal jelentkezett, belázásodtam, köhögtem és erősen izzadtam.

Purtier használatának kezdete:

2020.11.15.

Adagolás:

Az első 3 napban 1 kapszula. A 3. nap után pedig napi 2 kapszula.

Vízfogyasztás:

3 L

Amikor megtudtam, hogy Covid-19-em van, először napi 4 kapszulára, majd napi 6 kapszulára emeltem az adagot. A betegség után fokozatosan visszatértem a napi 2 kapszulához, ez az adagolás addig tartott amíg a szett elfogyott. Az adag felét mindig éhgyomorra vettem be a másik felet pedig délután.

A Purtier szedése közben algát is használtam, amit már régóta, 13 éve szedek. A Covid-19 alatt extra D-vitamint, antibiotikumot és vérhígítót szedtem.

Az első héten nem éreztem semmi különöset, de a második héten nagyon rossz állapotba kerültem a Covid-19 miatt. Egyáltalán nem volt étvágyam, két hét alatt 6 kg-ot fogytam, lógtak az izmaim és nagyon gyenge voltam. A betegség 2 hétig tartott. Egy nap úgy ébredtem, hogy jól vagyok, mintha egyik napról a másikra megszűnt volna a betegség.

A Purtier szedésének harmadik hetében erős, fájdalmas érzés volt a testem jobb oldalán, vesétől a köldökig. A fájdalom miatt még a cipőmet sem tudtam felvenni. A harmadik hét végén napról-napra megszűnt minden fájdalom, beleértve a derékfájdalmat is. Azóta fizikai munka után sem jelentkezik (2023) a fájdalom.

Három héttel a Covid-19 után visszatértem a korábbi súlyomhoz, amit izomra gyarapítottam. Az izmok visszanyerték az erejüket, a korábbi állapotukba kerültek.

Miután beszedtem a Purtier teljes szettjét, nagy életerőben voltam. Az volt az érzésem, hogy a munkabeli teljesítményben és a futásban is fel tudom venni a versenyt, simán versenyezhetnék a fiatalokkal is. Rengeteg energiám van, nem kell sokat aludnom és a munkában is jobban teljesítek. Reggel frissen és kipihenten ébredek. A hátfájásom nem tért vissza (2023 szeptember).

Azt is észrevettem, hogy fiatalabbnak nézek ki, és ezt a körülöttem lévő is mondják, hála a Purtiernek!



PORCPROBLÉMÁK

László, férfi (57)

Kiindulási állapot: Gerincsigolya roncsolódás, porckorong sérülés.

2022-ben észleltem, hogy 40 perces tevékenységekre korlátozódott a mindennapi életem. Minden tevékenység derék fájdalommal végződött, még a pihenés is.

Katonai bűvároktató vagyok és az extrém fizikai, statikus megterhelés következménye lett, hogy roncsolódtak a lumbális szakaszon lévő csigolyáim. A munkámat nem tudtam ellátni és az oktatói szerződéseimet mind fel kellett mondanom. A tesztoszteron szintem rohamosan csökkent és mentális zavaraim alakultak ki. Életkedvem alábbhagyott, rossz álmok gyötörtek, felerősödtek a poszttraumás szindróma jelei, amit Irakban, 2003-ban szedtem össze az offenzíva befejeződésével. Nem láttam kiutat a megromlott egészségi állapotom miatt bekövetkezett helyzetből.





Adagolás: 2023-ban 7. hónap 30-án kezdtem el szedni a Purtier kapszulát. Minden reggel 1 kapszula elfogyasztására úgy került sor, egy héten keresztül, éhgyomorra a nyelvem alatt hagytam felszívódni, ami nagyon nehéz feladatnak bizonyult az állandó nyelési inger miatt. Egy hét elteltével már reggel és este 1-1 kapszula éhgyomorra való elfogyasztására került sor. A dózist megemeltem 2x2 kapszulára.

Tapasztalat a termékkel: Komoly csípőfájdalommal jelezte a gyógyulási krízis bekövetkezését. Ezután visszavettem 2x1 re a dózist. Az ezt követő 5.nap elteltével a fájdalom nyomtalanul eltűnt. A kúra 3.hónapjára tünetmentessé váltam és az MRI vizsgálatok is azt mutatták, hogy a hiányzó porcok vastagodni kezdtek, ami megszüntette a fájdalmas 40 percre korlátozódó napi tevékenységi rutint.

A teljes kúrát 8 hónap alatt teljesítettem. Az utolsó két doboz elfogyasztása véletlenszerű, össze vissza adagokban lett elfogyasztva. Voltak olyan napok is, amikor egy szemet sem fogyasztottam, szemben azokkal a napokkal, amikor számolatlanul, marékszámra pótoltam az elmaradást. Volt, hogy napi fél liter vizet ittam, de olyan is amikor két liter is elfogyott.

Végeredményben a kúrát a mai napig folytatom, mert nem merem kockáztatni a visszaesés lehetőségét, hiszen az egész normális életem a tét.



Kiindulási állapot: 2020. 02. 19-kétirányú röntgenfelvételen a..... Reumatológia lelete szerint: Évek óta időszakos deréktáji terheléses fájdalmak, emiatt kivizsgálás kezelés nem történt. Másfél hónapja tartó deréktáji fájdalom mellett átmeneti jobb AV hátsó oldalán végigsugárzó fájdalom.

Kezelés: BEMER terápia, masszázs, Mydeton izomlazító, Apranax gyógyszer

2020.03.04 Fokozott lordózis, L-S rés beszűkült, az L-5 csigolya baloldali harántnyúlványa laposan kiszélesedett, piriformis érzékenységet jelez. Bal lábba kisugárzó fájdalom, medence asszimetria, ülésnél és járásnál antalgias testtartás.

Terápia: ágyéki gerinc merevítő használata, kímélő gyógytorna, pihe-nés

2020 03.10-én Mozgásszervi Klinika MRI felvétele: Antalgias testtartás, medence asszimetria, spasztikus, paravert (görcsös, akaratlan izomösszehúzódnak) lumbális izomzatb és j.piriformis érzékenység állandósult bal lábba kisugárzó zsibbadással, Lasseegeu tünet jelzett. (nehéz mozgíthatóság, elakadt nyújthatóság)

Zárólemezek kissé egyenetlenek, peremeken osteophyták vannak, porcrések nem szűkebbek. L4-L5 porckorong középvonalban szélesen elődomborodik, a duraság ventrális kontúrján kis benyomat látható. L5/S1 discus enyhén meghaladja a peremszéleket, gyöki kompresszió nem látható.

Terápia: Aktuálisan massage, BPRS kezelés, orvosi kollagén injekció, gerinckímélet és gyógytorna javasolt, hátizom erősítéssel. (L V-SI szegmens stabilizálása)

Beteg elmondása: állandósult ülőideg fájdalom mely üléskor és állásakor fokozódik, bal lábába zsibbadás érzet mely a lábfej talpáéig lehúzódik. Derékfájdalom hajlaskor és kiegyenesedéskor.

2022.05.23. MRI vizsgálat EGÉSZSÉGÜGYI DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT: L3 csigolyatestben kb 1 cm-es hemangioma megfelelő képlet mutatkozik. TH11-S1 közti magasságban enyhe spondylosis, kp mérsékelt fokú hypertrophiával és deformitással járó arthrosis mutatkozik.

L2-L5 között a kiszélesedett ligamenta flava (csigolyaíveket összetartó szalag) a durán enyhe benyomatot képez.

L4-L5 magasságban körkörös bulging (kidudorodás) is megfigyelhető, mely a durán enyhe benyomatot képez. Bal paramedialis szélesalapú protrusio is megfigyelhető, mely többszörös degeneratív eltéréssel együtt szűkíti a lateralis recessust, az itt kilépő bal L5-ös gyököt comprimálja.

L3-L5 közti magasságban a processus spinosusok közötti álizületképződés és acutb gyulladásra utaló effusio is megfigyelhető.

L3-S1 közötti magasságban lumbricalis izmok mérsékelt atrophiaja ábrázolódik. Sacroiliacalis (két csípőlapát és medence közt elhelyezkedő ízületben) ízületekben mérsékelt arthrosis igazolható.

2022.11.21-én kórház idegsebészeti osztály szakrendelése: M5440-Lumbago-Ischiassal

Gerincmozgásai beszűkültek, fájdalmasak. Lasegue próbánál bal oldalon 30 foknál erősen jelez. Reflexeltérés, érzészavar, paresis nincs.

Beteg elmondása alapján: vizelet ürítéssel összefüggő és hólyag irritáltsága van a tünetek óta. Járása a medencébe kisugárzó fájdalom okán és bal lábba sugárzó gyengeség és zsibbadás végett instabil. Tartósan állni, ülni és gyalogolni fájdalom nélkül nem képes. A klinikum alapján most is a IV. korong lehet a felelős a panaszokért, érdemes lenne gyógytornát folytatni, tartósan nem javítható panaszok esetén jöhet szóba műtét.

2022.12.12 MR vizsgálat

Klinikum: Bal csípő roppanó hangjával kísért ülőideg felé sugárzó erős fájdalom miatt kéri kivizsgálást, mely a bal lábujjakig kisugárzik.

Régiókról T1 SEcoronalis, T2 FSE axialis és saggitalis, T2 DIXON 4 fázisú coronalis síkú méréseket végeztünk.

A vápa kontúrja megtartott, terhelési zónában mérsékelt scleroticus, itt porcborítás mérsékeltén vékonyabb.

A vápaperemen cranialisan diszkrét mészfelrakódás látható, valamint a perem csontállományában kisebb degeneratív jellegű felritkulások figyelhetők meg.

Labrum degenerált, craniálisan nem friss szakadás látszik. A hiatus infrapiriformis régióban a lágyrészek kissé ödémásnak tűnnek.

2022. júliustól:

Költöztem (megyét váltottam) és az életem egyik legnagyobb kihívásában voltam ebben az időszakban. Egészségem teljesen megroppant,

az évek óta tartó fájdalom és tehetetlenségből fakadó elkeseredés depresszióssá tett. Nem lazíthattam, így a 2021. dec-ben történt labrum elülső részén történő szakadást sem pihentettem, sőt ekkor emelgettem a legtöbbet a költözésem okán. (csak mankóval szabadott volna járni, mint utólag megtudtam)

A lábizmaim nagyon gyengék voltak, járni is csak szakaszosan voltam képes, a gerincsérvem miatt éjjel és nappal állandósult fájdalmak kínoztak, aludni nem tudtam csak egy bizonyos testhelyzetben bólogtam.

A nyár megpróbáltatásokkal és egészségügyi kihívásokkal szembesített, melyre nem volt semmilyen megnyugtató végleges javaslat, csak hullámozó javulást éreztem.

2022. augusztusában a május hónap óta diagnosztizált gerincsérv + isiász, ezekből eredő gyöki compressió okozta nagyon erős fájdalom ágyhoz kötött. Ekkor már hónapok óta csak VOLTAREN injekcióval és erős gyulladáscsökkentő gyógyszerekkel (Apranax, Flektor, Mydeton, Cataflan) voltam képes járni, és feladataim ellátni. Olyan erős fájdalomim voltak, hogy saját magamnak adtam be a Voltaren injekciót, mely a reggeli napi rutinommá vált.

Alternatív terapeutaként az alábbi terápiákat vettem igénybe, illetve használtam:

Orvosi javaslatra: gyógytorna, BEMER terápia+gyógymasszázs. Később a Bemert felváltotta a PROMAG pulzáló mágnes terápia+ Orvosi Biopton Fénykezelés együttese, agyagpakolás, gyulladást csökkentő krémek használatával kombinált lágylézer és lökéshullám terápia.

Heti 1x alkalommal csontkovács, és kineziológiai oldás, Hellinger féle családállításon is részt vettem. (apám súlyos gerinc és autoimmun izomsorvadásos beteg) Ezzel egy időben elkezdtem az elmekontrollt dr. Joe Dispenza munkássága alapján a meditációkban végzett imaginációs gyógy technikák alkalmazását, és Pete Egoscue-fájdalom nélkül mozgásgyakorlatok végzését, melyek sokban segítettek a rehabilitációm.

A legdrágább illóolajos DoTERRA krémeket, illóolajokat, HDTx technológián alapuló detoxikációs készítményeket (LYME kór, Borrelia burgdorferi baktérium okozta fertőzésem kimutatták, mely 2021-ben szívburok gyulladást is okozott) melyek segítségével sikerült likvidálni az említett baktériumot.

Már közel egy millió forintos költségekkel számoltam a gerincsérveimből kifolyólag, de még mindig részleges javulással, és vissza-visszatérő

tünetekkel. Dolgozni nem tudtam, mert 1-1,5 órás konzultációs időt nem voltam képes végig ülni, a fekvés (gerinc tehermentesítése) hozott enyhülést a fájdalomban.

Adagolás: először heti 1x1 kapszulát szedtem hozzászoktatásként, majd felemeltem 2x2-re, a fájdalmak felerősödése miatt csökkentetem napi 2x1 kapszulára

PURTIER hatásának leírása:

Ekkor jött segítségemre M. Jenő barátom, és mára a RIWAY családom családfője, aki hozott magával egy elegáns dobozkát, benne a csodaszarvas legendáját. Akkor még nem tudtam mire való, miben fog segítségemre lenni, de voltam már olyan állapotban, hogy mindenben kapaszkodtam, ami megoldást jelenthetett.

Felhívott és kedvesen érdeklődött hogylétem felől. Elmondtam, hogy nem javulok, hogy időszakosak és rövid ideig tartóak a változások, el vagyok keseredve.

Ígérte, hogy eljön és hoz egy gyulladást csökkentő gyógykrémet és vele együtt egy összejt terápiás készítményt, melyet mindenféle kötelezettség nélkül nekem szán. A teendőm annyi lenne, hogy figyeljem meg magam milyen változások állnak be nálam.

Az ígéretet betartva elhozta a készítményt, először heti 1x1 kapszulát szedtem hozzászoktatásként, majd felemeltem 2x2-re a fájdalom miatt. Először erősebb lett, az ülőidegzsába lüktetett bennem, a lábaimba forróság érzet söpört végig, míg ha pihentem a piriformis ideg mentén és lábizmaimban apró rángások, míg éjszaka görcsök keltettek fel, melyeket erős dörzsöléssel tudtam csak lazítani.

Vérnyomásom és családi hajlamosításom (kezdetleges magas vérnyomás panaszokra szedtem gyógyszert 145/90-156/100 között ingadozott) okán a szememben kialakult glaukóma miatt magas szemnyomást csökkentő szemcseppet és vérnyomás csökkentő gyógyszert használtam.

A szemnyomásom megugrott, erős szemüreg fájdalmaim lettek, homályos látással, a vérnyomásom megugrott 185/110-re melyet dupla gyógyszerrel sem tudtam 150/98 alá húzni.

Ekkor csökkentettem le a napi adagot 2x1 kapszulára, mely dózisban szedtem be a próba dobozt. A reverz tüneteim (gyógyulással összefüggő) beállt a normál tartományba, a vérnyomásom és a lábfájdalmaim is elviselhetőek lettek.

Már a második héten többet bírtam fizikailag, voltak már enyhülést mutató fájdalom óráim, ezt mindenképp pozitívan értékeltem. A 10-es skálán 6-7 erősségűvé vált a fájdalom küszöb, ami addig 9-11-es erősséggel tombolt bennem.

Mire elfogyott a próba dobozom, lelkileg is jobban voltam. Érezhető volt a változás, mely nem csak a gerincem problémás szakaszaiban volt érezhető, hanem egyéb egészségügyi nehézségeimben is. Ekkor azonban nem lett folytatása a készítmény szedésnek.

2022. októberében megemeltem magam, holott az orvosom 2,5 kg-tól nem engedélyezett nehezebb tárgy emelését. Én azonban gerendákat, és térköveket, sziklákat emelgettem, lakást gletteltem és festettem, lambériát csiszoltam és ismét berobban a derekam, vele együtt az isiász. Nem tehettem mást, segítségem nem volt.

Kértem Jenőt, hogy hozna e nekem abból a csodaszerből, mert nincs másban bizalmam, és sürgősen kell csinálni valamit, mert, visszaesek abba az állapotba, mint nyáron. Érezhető volt a rohamos leépülés, és visszatérő fájdalom és gyulladás.

Október végén elkezdtem szedni a PURTIER második dobozát, 2x1 kapszulával.

Az eredmény ugyanaz lett, erősödtek a fájdalmaim, de rövid idő alatt lecsengett. Ami meglepő volt, hogy a vastagbelem két hétig göcsölt, a jobb bordaív alatt a máj és epe területe enyhe nyomásszerű érzettel görcsölt, kellemetlen érzés volt. Volt éjszaka, hogy 5-6 szor is ki kellett mennem a hólyagom üríteni, mert több víz távozott belőlem, mint amit napközben megittam. Figyeltem a napi 2 liter víz/tea elfogyasztására, de ami távozott belőlem az jóval több víz volt megesküszöm.

A gerincfájdalom és vele együtt az ülőideg irritáltsága csillapodott, melynek következménye lett, hogy végre tudtam aludni, így a kedélyállapotom is kezdett visszatérni. A Purtier szedése mellett továbbra is alkalmaztam az alternatív terápiákat, azonban azok HATÉKONYABBNAK bizonyultak.

A pihenésre rákényszerített a testem, így módjával tettem a dolgom. Nem hagytam el magam, és nem adtam meg magam a fájdalomnak és a letargiának. Végre lett reményem!

Szedtem Halolajat+Spirulina/Clorella algát felváltva, magas dózísú MSM (glukozamin, kondriotin sulfate) tablettát, 1500 mg C vitamint, hidrolizált kollagént, kalcium-magnézium tablettát, és citromfű rózsagyökér kapszulát nyugtató hatásként.

A gyógyszereket letettem, csak a legszükségesebb esetben voltam hajlandó szedni, hogy azok se befolyásolják a Purtier munkáját.

Mire a 2. doboz Purtier is elfogyott, a gyerekkorom óta szedett (anyai ágról örökölt súlyos székszorulás) hashajtókat abbahagytam, mert elmúlt a krónikus bélgyulladásom, mely ÉLELMI INTOLERANCIÁBAN, glutén, gliadin és tejalkotókra való érzékenységből és gyakori puffadásban, szorulásban nyilvánult meg.

Ez nagy öröm volt a számomra, míg a testsúlyom is változott, fogytam 80 kg-ról 75 kg-ra. A hízásom a mozgáshiányból és a gyulladások miatti vízviszataratásból fakadt, mert a sport és mozgás lételemem, a gerincserv azonban korlátok közé szorított.

Belelkesülve az érzett javulástól, elkezdtem a futógépen lassabb tempóban sétálni, míg a Fitt labdán 1,5kg-os súlyokkal az alsó hátizmokat erősíteni. Ez igaz némi nehézségekbe ütközött, azonban kitartottam és újra megtanítottam a testemnek hogyan kell NORMÁLIS üzemmódban működni.

Itt már azt éreztem, hogy erről a készítményről másoknak is tudnia kell, és saját esetenem felbátorodva elkezdtem másoknak is ajánlani.

2023. év elején megkezdtem a 3. doboz Purtiert.

Nincsenek nagy kiugrások a szervezetem gyógyulása közben, teszi szépen a dolgát, melynek köszönhetően egyre jobb a közérzetem, a gerincserv, mint tünet, lassan, de biztosan a gyógyulás útjára lépett, egyre több a tünetmentes időszak. A 3 év pokoli időszak után újra van reményem, hogy elkerülöm a sebészkést és a mellékhatásoktól bővelkedő allopatia beavatkozásokat.

A testem megújulása megmutatkozik a hajam minőségében, az arcbőröm fiatalosabb kinézetében, az egész lényemben és az izmaim nyújthatóságában (régebben merev és fájdalmas volt a mozgás) ma már jóga gyakorlatokkal egészítem ki az edzéseim.

2023. október - elkezdtem a 4. doboz Purtier készítményt

Kihagyásokkal, mégis tudom folytatni a megkezdett kúrát. Elmentem egy Budapesti terméktapasztalati kongresszusra, melyen a szám is látva maradt a hasonló gondolkodású és bizakodó emberek láttán. A terméktapasztalatok beszámolóin beleborzongtam, hogy mennyi embernek segít a RIWAY cég egyedülálló találmánya, melyben ötvöződik a tudomány és bölcsesség, szakértelem és kitartás.

Ha a RIWAY ennyire hisz a termékében, hogy 2008-óta egyre tökéletesíti és kiválósággá fejleszti, akkor Én nem tehetek mást, mint ebben a megszállott HITBEN osztozom, és élek a lehetőséggel, amit nyújthat számomra és az embertársaim számára.

A lábaim és gerincem egyre stabilabb, mely által a gyaloglás is visszatért az életembe. A bal oldali zsibbadás még kitart, mégis úgy érzem, egyre közelebb vagyok a gyógyuláshoz, és mindezt mellékhatások és műtéti beavatkozás nélkül. Tudva, hogy honnan indultam, és hol tartok most a 4. doboz Purtier segítségével, ez több mint CSODA számomra.

A testem meghálálja a törődést, látványosan változik kívül-belül, melyeket a fotók is igazolnak.

Bízom benne, hogy másokat is megnyerek annak érdekében, hogy érdemes időben lépni a javulás útjára, az életmódon változtatni, és nem beleroppanni a teherviselésbe vagy egy sor egészségtelen beidegződésbe.

Segítséget nyújtok mindazok számára, akik hajlandóak esélyt adni maguknak egy egészségtudatos személet jegyében, nyitni a tudomány és fejlődés irányába.

Büszkén vállalom, hogy október hónapban a RIWAY munkatársa lettem, és örökké hálás leszek M. J. barátomnak és szponzoromnak, hogy nem hagyott magamra a bajban, és emberségből jelesre vizsgázott. Köszönöm neki, és köszönöm a RIWAY cégnek!

GERINCFERDÜLÉS

Renáta, nő (60)

Kiindulási állapot:

Évek óta már ősztől egészen tavasz végéig egyre többet voltam beteg. Megfázások, hangszálgulladások (ilyenkor 1-2 hétre el is ment a hangom) gyötörtek szinte folyamatosan. Nagyon érzékeny voltam a hidegre, ezért jóval melegebb ruhákba kellett felöltözöm, mint a többi ember. Már a Balatonba is meg kellett gondolnom, hogy megfürödjek-e, mert többször lebetegedtem és megfáztam utána. Egy 3 hónapos, külföldi, stresszes munkának köszönhetően idegi és fizikai kimerüléshez kerültem. Kiürültek belőlem az ásványi anyagok, a mellékvesém lemerült, és nagyon gyenge voltam. Bármilyen kis stressz ért, már egyből padlón voltam, és fizikai ájulás kerülgetett. Ezután a munka után 1 hónapig csak feküdtem, és lehajolni sem tudtam, mert akkor elestem volna. Ezek mellett, fülzúgással és szédüléssel küzdöttem már 9 éve. Külső és belső aranyerem volt 20 éve, amely 6-8-szor előjött egy év alatt. Vesemedence gyulladások követték egymást évek óta, amelyekből sosem sikerült véglegesen kigyógyulnom. 3 éve fog érzékenységgel küzdöttem, ami nem csak nekem, hanem a fogorvosomnak is nehézséget jelentett a fogcsináltatásokkor.

#110



2023.11.01.



2024.12.31.

Még a csernobili katasztrófa után a hajam egyharmada kihullott, és nehezen is nőtt. Rendszeresen felfáztam, húgyhólyaggyulladásom volt. Gyerekkorom óta gerincferdüléssel éltem és a hátam jobb oldalán másfél cm magas, és 10 cm hosszú kinövés/kitüremkedés, púp helyezkedett el.

Adagolás:

2023 novemberében kezdtem el fogyasztani a Purtiert. 13 hónapja szedem, és most fejezem be a második kúrát. Az első héten napi 1 kapszulát vettem be, majd 2x1-re növeltem naponta.

Tapasztalatom a termékkel:

13 hónap távlatából visszatekintve, már nem vagyok ősztől tavaszig folyamatosan beteg. Egyszer volt egy megfázásom, ami 3 napig tartott, és egyszer volt hangszálggyulladásom, de akkor sem ment el a hangom, mint ahogy az régebben történt. Már nem kell melegebben öltöznöm, több réteg ruhát felvennem a többi emberhez képest, hanem teljesen normálisan tudok öltözködni. Az idegi és fizikai kimerülésből 3 hónap alatt helyreállt a szervezetem. Barátaim és az ismerőseim szerint sokat fiatalodtam, lelkileg és fizikailag is erősebbnek érzem magam.

A kúra elkezdése után 3 héttel teljesen megszűnt a fülzúgásom, szédülésem.

Az aranyér problémám a 13 hónap alatt már egyszer sem jelent meg. A vesemedence gyulladás is csak 1x jött vissza és enyhébb tünetekkel. A fogérzékenység sokat javult, már a kapszula szedése után 1 hónappal. A hajhullásom megállt, és mára rengeteg új hajszálam nőtt, amelyek 10 cm hosszúak. A húgyhólyaggyulladás és felfázás a kapszula szedése óta még egyszer sem jött elő.

A gerincferdülésemmel kapcsolatban: az orvosom diagnózisa szerint a kollagén termelésem beindult, a kötőszöveteim megerősödtek, a keringésem sokkal jobb lett, és a csonttritkulásom teljesen megszűnt. Szerinte a Purtier hatására. Ezáltal sokkal egyenesebb lett a gerincem. Továbbá, a hátam jobb oldalán található púpot, kinövést már nem kell a masszörnek hetente visszaigazítania, eltüntetnie, mert egyszer csak az egyik hétről a következőre már nem volt kitüremkedve, kiállva a hátamból. Meg tudott maradni a masször által előző héten visszaigazított helyzetében. Ez a 6. doboz fogyasztásakor történt.

Egészen a mai napig még folyamatosan jönnek elő pozitív változások, tapasztalatok nálam.

GYERMEKEK

#113

LASSÚ BÉL SZINDRÓMA

Luca, lány (10)

Kiindulási állapot:

2 évesen lassú bél szindrómát állapított meg nála a gyermekorvos, miszerint a bélfal fele annyit mozog, mint egy egészséges szervezetnél. 9 éves koráig gyógyszer nélkül kb. 3 naponta tudott wc-re menni, 10-dik évébe lépve viszont megváltozott az állapota kb. 8 naponta tudta elvégezni a dolgát. Itt már testi tüneteket is produkált, mint például szédülés, állandó hasfájás, hányinger, étvágytalanság, vékony szálú haj és a lehelete is nagyon rossz volt.

Adagolás: napi 1 kapszula

Tapasztalat a termékkel:

2023.november 06.-án kezdte a Purtiert szedni.

Hétfőn reggel bevette az első szemet és a nap eltelt, teljesen fájdalom mentesen. Kedden megismétlődött az eseménytelen nap.

Szerdán el tudott menni wc-re, de az már időszerű volt, így nem tudtuk be a Purtyinak :) Csütörtök eseménytelen nap, semmi fájdalom!

Pénteken 4x ment el toalettre normális állagú, viszont rengeteg széklet ürült belőle. Szombaton ismét legalább 3x ment wc-re.

Azóta 3x annyit eszik, besűrűsödött a haja, nem fáj a hasa, nincs hányingere, nem rossz szagú a szája, boldog egészséges gyermek és ami nagyon fontos, hogy azóta minden nap jár toalettre.



2023.11.04



2024.05.10.

BB SZINDRÓMA

Zalán, férfi (2)

Kiindulási állapot:

Pár hónapos korában nyilvánvalóvá vált, hogy a mozgásfejlődése nem az életkorának megfelelően alakul.

Anyukája ragaszkodott az alapos kivizsgáláshoz, így végül genetikai vizsgálat igazolta a nagyon ritka, változatos tünetek képében jelentkező Burnside-Butler szindrómát, ami a kisfiú esetében súlyos fokú izomgyengeséggel járt. (Önállóan helyzetváltoztatásra nem képes)


A szakirodalom szerint ezt az eltérést a gyermek – idegfejlődési rendellenességeket okozó génhiba – egyébként a sokszor tünetmentes, de mégis a génhibát hordozó szülőktől örökli.

Zalán nem kapott gyógyszereket, mindössze heti 2 alkalommal fejlesztő gyógytornát javasoltak az orvosai. Állapotában semmi jelentős változás nem következett be a Purtier kapszula szedésének kezdetéig.

Purtier szedésének kezdete: 2023. április

Adagolás: napi 1 kapszula belső tartalmát fogyasztja

#115



Első észrevétel: kb. 10 nappal a szedés megkezdése után – anyukája gyenge izomfeszülést érzett a kicsi lábában. Ezt követően szinte napról-napra, folyamatosan indult a mozgásfejlődés. A kúra kezdete után 1 hónappal Zalán tervezett felülvizsgálaton volt, ahol megállapították, hogy „spontán mozgása, felső végtagi túlsúllyal sokat javult”

A karok mozgásának javulása, illetve ügyesedése után nemsokára már képes volt felhúzni és megfogni a lábát, majd kis segítséggel hasra és visszafordult. Kezével és lábával egyre több, összehangolt mozgást végez, a felé nyújtott kezét már erőből tolja és lábával rugdossa a játékait. Szülei nagy örömeire elkezdte szépen tartani a fejét, és nyáron pár pillanatra már a kerti medence peremébe kapaszkodva álló helyzetben is körbenézett a világban.

A kúra alatt kedvezőtlen mellékhatás nem jelentkezett, a fejlődés eddig (2023.szeptember) egyenletes és folyamatos...

Kiindulási állapot:

A terhesség alatt a vizsgálatokon mindent rendben talált a nőgyógyász. Terhesség elején időnként vérzés jelent meg, sajnos a placenta leválása elkezdődött a méhfalról.

Mátyáskát 2022 februárjára vártuk.

2021. október 29.-én 26 hétre 550 grammal koraszülöttként született. Az Apgar skála (életrevalósági skála 10 -1) szerint, sajnos csak 1 pontot kapott. Nem fejlődött ki nála a szopó reflex, hangja sem volt (azt az élményt nem kaptam meg, mikor az újszülött felsír), és számos belső szerv kifejlődése visszamaradt.

Nem sokkal a megszületése után 2 héttel agyvérzést kapott, majd később kialakult nála a lágyéksérv és 1 év 3 hónaposan epilepsziát is diagnosztizáltak nála.

Sajnos a fejlődésben látványosan elmaradt. A szemész szakorvos szerint Mátyáska látása valószínűleg károsodott marad, mivel a látóideget tápláló kiserek hiányosan fejlődtek ki.

Mátyáska kezelést kap epilepsiára.

Négyhavonta be kell feküdnie a kórházba kivizsgálásra, ez utóbbi szeptember 22-28. között volt.

2023.07.29.-től megkezdtek a Purtier szedését, ami számos eredményt hozott magával.

Adagolás:

A napi 1 kapszula tartalmát kiskanállal adom Mátyáskának, amit nagyon szívesen fogyaszt el.

Gyógyszerek:

Depakin szirup 3x1 ml(anti epileptikum) Nitrazepam tableta porítva, Acetazolamid, Acyclovir

Számos vitamint kap még pl.: B vitamin komplexet.

Minden héten valami újat mutat a fejlődésben!!

Első hét:

- Egyensúly érzéke napról-napra sokat fejlődik (Purtier megkezdése előtt, nem fordult egyik oldalról a másikra) ez változott, forogni kezdett.
- Figyelmes, már követi a tárgyakat (eddig ezt sem tette), nézegeti kezecskéjét, életvidám kisgyerekké vált.
- A lágyéksérv műtéténél átmeneti fájdalmat produkált.

Második hét:

- Elkezdett enni, eddig nagyon minimális volt az étrendje, épphogy az üveg tejet megitta, de azt is három részletben. Újabb felfedezése az, hogy szájához emeli a kiskanalat, ami nálunk nagy szó.
- Amióta szedi a kapszulát 1 kg-ot gyarapodott a súlya.
- A hajcskája is sokat nőtt és dúsult. Elmondható, hogy sokkal nyugodtabb lett.

Harmadik hét :

- Próbálkozik felülni, láthatóan egyre jobban mozog.
- Megfigyelhető, hogy a szemén hihetetlen a változás, egyre komplexebben próbál fókuszálni.

További fejlődés:

- Mátyás a végtagjait és testét is egyben mozgatta, nem tudta külön használni.
- Már láthatóan próbálkozik ezt a mintát úgymond elfelejteni, ügyesen választja szét a törzsét a végtagjaitól, ez a fordulásában nyilvánul meg. Lábai is elkezdte külön használni, nem egyszerre emeli, hanem egyszer az egyiket, aztán a másikat, kezeit is külön-külön tudja már mozgatni. Mára már a fejét is fordítja a hang után.
- Gyógytornára járunk, és ott is nagyon meg vannak elégedve a teljesítményével.

Az utolsó négy havi kontroll vizsgálaton az orvosok megjegyezték, hogy a kislány állapota sokat javult, amit igazolnak a vizsgálatok eredményei is.

Csak utólagosan volt lehetőségem elmondani, hogy a kisfiam Purtier kapszulát kap. Az orvosok meglepően pozitívan álltak hozzá, arra kérték, hogy jegyezzek le mindent amit tapasztalok Mátyáskánál, és majd a januári kontroll vizsgálaton számoljak be mindenről. Nagy bizalommal folytatjuk a Purtier szedését (2023 szeptember) és a további tapasztalatokat is elmondjuk a jövőben. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk az egész RIWAY37 CSAPATNAK!

#119



Kiindulási állapot:

Rossz mozgáskoordináció, beszédfejlődés elakadása, szobatisztaság hiánya, minden darabos étel elutasítása. Düh rohamok, empátia hiánya, félelem a tömegtől, más gyerekektől. Saját maga hánytatása, tárgyak nyalogatása, kilógó nyelv, kapkodó kézmozdulatok. Artikulálatlan hangok kiadása, fejhangon való visítás.

Adagolás:

2024.06.01-én kezdte el szedni a Purtiert, reggel és délután 1 kapszulát kinyomva gyümölcspépbe.

Tapasztalat a termékkel:

Azonnal javulni kezdett az állapota.

1.hét: szobatisztaság igénye, megszűntek a dührohamok.

2.hét: megjelent az empátia, javult a mozgáskoordináció.

3.hét: robbanásszerű lett a beszédfejlődés, szavak, mondatok alkotása, mindennek a megnevezése, mindenkinek a megszólítása, köszönés-elköszönés. Jobban látja az összefüggéseket.

4.hét: stabil szobatisztaság nappalra, nem fél a tömegben, az erős zajoktól, hangoktól, bátran játszik gyerekekkel. Fogaszt darabos ételeket, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb. Több területen is az agyi fejlődés beindult.

A terméket továbbra is fogyasztja. Az oviban nem tudták, hogy mit szed



előtte



utána

a gyermek, a visszacsatolás az volt, hogy minden óvónéniről beszélt mekkora a változás, és milyen ütemű. Mindenki nagy öröme villámgyorsan behozza a lemaradásait.

Kiindulási állapot:

Bence autista kisfiú, a betegség összes tünetével: nem érthető beszéd, szobatisztaság hiánya, kényszercselekvések, elzárkózott a társaival való érintkezésről, játéktól.

Adagolás:

Az első 3 hétben napi 1 kapszula, azóta napi 2 kapszula.

Tapasztalat a termékkel:

2024. december 12-én kezdtem el adni a Purrier étrendkiegészítőt Bencének napi 1 kapszulával. December 30-tól megdupláztam napi 2 kapszulára. Azóta is napi 2 kapszulát kap kisfiunk.

2025. január közepe felé elkezdett beszélni, amit már meg lehetett érteni. Egyre több szót és rövid mondatot mond most már itthon és az óvodában is.

2025. március 5-én eljutottunk a nappali szobatisztasághoz. Éjszakára még kap pelenkát, mely egyre többször marad száraz reggelre.

A hisztirohamok és kényszercselekvések (pl.: csapok elzárása, háztartási gépek elindítása, wc lehúzása) teljesen megszűntek.

Az óvodában nem utasítja vissza a többiek közeledését, egyre sűrűbben játszik társaival.

Nagyon boldogok vagyunk, hogy ránk talált ez a táplálékkiegészítő. Amióta Bence szedi, sokkal kiegyensúlyozottabbak a mindennapjaink.



PAJZSMIRIGY PROBLÉMÁK

#123

Kiindulási állapot:

Több egészségügyi problémám is van. Pajzsmirigy alulműködés, emésztési problémák, laktóz és gluténérzékenység, néhány gyümölcsre allergia, kiütéses-, viszkető bőr, enyhén visszeres lábszár, folyamatosan romló látás.

Igen nagy reményekkel és szeretettel kezdtem el szedni 2023. április 24-től a kapszulákat.

Adagolás: napi 2x2 db
Vízfogyasztás: 3-4 L

Gyógyszer: Letrox- pajzsmirigy gyógyszert szedek 20 éve

Az első doboz elfogyasztása alatt nem éreztem különösebb változást. A második doboz szedésekor erős bal vesetáji fájdalmat tapasztaltam. Ennek megörültem (bár a fájdalom nem volt kellemes) arra gondolva, hogy valami változás elindult a szervezetemben. El is neveztem ezt az érzést „boldog fájdalomnak”. Ezt 3-4 napig éreztem.

Gyerekkoromban súlyos vesemedence gyulladásom volt. Néhány nap múlva egy rövid ideig tartó (kb. fél óra), de intenzív hólyag és húgycső fájdalmat éreztem.

A 3. doboz szedése alatt a hasüreg bal oldalán éreztem néhány napig tartó fájdalmat. Nem sokkal később erős szemviszketést tapasztaltam.

A 4. doboz szedésekor felerősödtek az emésztési problémáimmal kapcsolatos tüneteim hasmenés, puffadás, éles gyomorgörcs és fejfájás gyötört. Ennek természetesen nagyon örültem. Csak a legjobbakra gondoltam.

Az 5-7. doboznál végbéltáji fájdalom jelentkezett. Ami azóta is tart, de enyhül. Ugyanez idő alatt a jobb lábszár vénás területénél csipkedő fájdalmat éreztem, ami 1-2 hét után megszűnt.

Az emésztési problémák mellett olyan étrendet folytatok, amellyel segítem a szervezetem működését.

Energiaszintem ingadozó volt a PurTier szedése előtt, ami mára már stabilnak és jónak mondható. Nagyon aktív életet élek. Sokat kertészkedek, szeretek kerékpározni, pingpongozni, túrázni.

Hangulatváltozásaim is voltak. A 3. doboz szedésénél többször is elfogott az ok nélküli sírás.

Minden fájdalom, pozitív változás nagy örömmel és hálával tölt el. Köszönöm, hogy van ilyen LEHETŐSÉG és MEGOLDÁS az életemben!

HASHIMOTO BETEGSÉG

Ágnes, nő (55)

Kiindulási állapot:

2021-ben kezdődtek a problémáim, melyek az alábbiak voltak: tejérzékenység, emésztési zavarok, ingadozó vérnyomás, szédülés, fáradékonyság, alvászavarok, ízületi fájdalmak és csípőprobléma (több ebből a Hashimoto betegség tünete).

Vérnyomás:

Alaphelyzetben 100-110/70 a vérnyomásom. De időnként 140-145/90-re megugrott, ami fejfájással és szédüléssel járt.

A tejérzékenység az abban nyilvánult meg, hogy nagyon gyorsan el kellett jutnom a mosdóba, mert rohamos hasmenés jelentkezett.

Az alvászavar, az a felületes alvást jelenti, minden neszre felébredtem és nem tudtam visszaaludni, ezáltal már reggel fáradtan keltem.

2022. július 20.-án kezdtem el szedni a Purtiert.

Adagolás:

kezdetben 2x1, 4.hónaptól- 2x2, 2x3.

#125



Purtierrel való tapasztalataim:

Az energiaszintem az első doboz után teljesen helyreállt. A második doboz után a felsőtest ízületi fájdalmai is megszűntek. Ezt követően a vérnyomás ingadozásom rendeződött, az emésztési zavaraim és a haspuffadásom szintén megszűnt. A fejbőrömön a szemölcsök eltűntek, emészthetővé váltak számomra a glutén és a tejtermékek.

A +++ pollen allergiám is elmúlt. A szénhidrát anyagcsere zavarom már a múltté, ami anno „cukoréhségben” nyilvánult meg.

Energikusabb vagyok, az éjszakai ébrenlétem megszűnt, ezáltal az alvásom minősége nagyban javult. Bőröm sima lett, az arcom teljesen kismult, mondhatni sokat fiatalodtam. Ami örömmel tölt el még, hogy a hajhullásom is megszűnt. Már az első héttől nyugodtabb vagyok, nem stresszelek felesleges dolgokon. Nagy öröm számomra, hogy ennyi pozitív változást hozott a Purtier az életembe! Ezt természetesen a családtagjaim és az ismerőseim is látják.

HEPATITIS C

#127

HEPATITIS C

Som, nő (47)

Kiindulási állapot:

A 3. oltás után 3 héttel elkapta a Covidot és ízületi problémái lettek. Gyermekkorában hepatitis C vírusos fertőzést kapott (vérátömlesztést követően). Passzív hordozó volt a Covid-ig. Soha semmi baja nem volt, folyamatosan kontrollálták a vérért.

A 3. oltás után elkezdett benne dolgozni a vírus, ami azt jelenti, hogy egyre gyengébb és fáradékonyabb lett, felment a cukra is (csak terhesség alatt volt magasabb a vércukor, de szüléssel megszűnt).

2022 szeptember elejétől a Purtier kúra elkezdéséig folyamatosan rosszabbodott az állapota, az orvosok nem tudtak mit tenni.

Adagolás: Napi 1 – kapszula, három nap után 2, aztán megemelte egészen 4 -ig. Majd egy és fél hónap után csökkentette 2-re.

Gyógyszer: Sofosbuvir 400 mg/ Velpatasvir 100 mg (Hepatitis C vírusfertőzés kezelésére)

Folyadékbevitel: napi 1 -1,5 L között.

2022. december 26.-án elkezdte szedni a Purtier-t.

1 hét Purtier szedése után napról napra visszajött az ereje. Januárban Kambodzsába utazott szüleit meglátogatni. Elment kontrollra az ottani orvosához (ahogy mindig szokott), vért vettek tőle és az orvos megállapította, hogy a májfunkciók extrém magas kóros értékeket mutatnak. Az orvos gyógyszert írt ki Hepatitis C-re (3-4 hónapos kúra). Elkezdte szedni január 12.- én a kiírt gyógyszereket, viszont Magyarországra indulás előtt megkérte az orvost, hogy újra nézze meg az értékeket. Dubaiban az átszállásnál olvasta az orvosa üzenetét, hogy nagyon jók az eredményei, mert normalizálódtak a májfunkciós értékei.



Augusztusban elkezdte a következő kúrát, fokozatosan emelte 4 kapszulára.

1. doboz: napi 4 kapszula
2. doboz: napi 3 kapszula
3. doboz után: végig 2 kapszula

Sokat változott a közérzete, sokkal fittebb, haján és a bőrön is észrevesz pozitív változásokat.

Nagyon jól érzi magát, újra visszajött az életkedve és az ereje.

lelet: 2023.01.02

Patient's Name :
 Age : 48 Years Sex: Female
 Physician :
 Telephone :
 Received Date/Time : 2.1.2023
 Patient's ID :
 Telephone : N/A
 Sample : Apporé
 Address : PP
 Print Date : 2.1.2023

POLYMERASE CHAIN REACTION

HCV RNA Quantitative PCR

Result	Value	Unit
	828.625	IU/ml
Target Detection	4,144,125	Copies/ml
	6.62 Log10	(≤ 2.00 Log10)

Interpretation:

Result in IU/ml	Remarks
< 21	Target not detected.
≥ 21 to < 1.77 x 10 ⁹	HCV RNA detected within the linear range of the assay
≥ 1.77 x 10 ⁹	HCV RNA detected upper limit of detection

Notes:

- This test was carried out on QIAGEN Rotor-Gene Q Real-time PCR
- Reportable reference range : 21 IU/ml – 1.77 x 10⁹ IU/ml
- Conversion factor : 1 IU/ml = 5 Copies/ml
- Test conducted on Serum
- This test is intended for use as a screening test for the presence of HCV in blood or blood products or as a diagnostic test to confirm the presence of HCV infection
- HCV Genotyping is recommended in positive case if value is high and consult with physician to receive appropriate counsel and treatment of infection

af

lelet: 2023.01.24

Patient's Name :
Age : 48 Years Sex: F
Physician :
Telephone :
Received Date/Time : 23.01.2023
Patient's ID :
Telephone : N/A
Sample : Apporid
Address : PP
Int Date : 24.01.2023

POLYMERASE CHAIN REACTION

HCV RNA Quantitative PCR

Result	Value	Unit
	135	IU/ml
	676	Copies/ml
	2.83 Log10	(≤ 2.00 Log10)

Interpretation:

Result in IU/ml	Remarks
< 21	Target not detected
≥ 21 to < 1.77 x 10 ⁹	HCV RNA detected within the linear range of the assay
≥ 1.77 x 10 ⁹	HCV RNA detected upper limit of detection

Note:

- This test was carried out on QIAGEN Rotor-Gene Q Real-time PCR
- Reportable reference range : 21 IU/ml – 1.77 x 10⁹ IU/ml
- Conversion factor : 1 IU/ml = 5 Copies/ml
- Test conducted on Serum
- This test is intended for use as a screening test for the presence of HCV in blood or blood products or as a diagnostic test to confirm the presence of HCV infection
- HCV Genotyping is recommended in positive case if value is high and consult with physician to receive appropriate comment and treatment of infection

130



HISZTAMIN INTOLERANCIA

#131

HISZTAMININTOLERANCIA

Frederika, nő (22)

Kiindulási állapot:

2017-ben kezdődtek a problémáim. Rosszullétek, erős felfúvódások, görcsök és hányás gyötört. Elmentem orvoshoz és hisztamin intoleranciát diagnosztizáltak. Erről annyit kell tudni, hogy sem vákumozott, sem fagyasztott, sem konzervált, sem tartósítószeres ételeket nem fogyaszthattam. Az elkészített ételt is 1,5-2 órán belül kellett elfogyasztanom. Vastagbelem folyamatos gyulladásban volt.

Az elmúlt 6 évben többféle módszert és diétát kipróbáltam, de semmi sem segített. Ha napi 3x hánytam, annak már örültem. Már úgy gondoltam, hogy ezzel meg kell tanulnom együtt élni, mivel nincs rá megoldás, vagyis csak én nem tudtam róla.

2022 szeptemberében megismerkedtem a Purtierrel.


Mivel türelmetlen vagyok, ezért megemeltem az adagolást a 2. naptól 2x2-re. Ekkor felerősödtek a tüneteim és 5 napig minden hajnalban sírva keltem, görcseim voltak, és nagyon fájt a hasam, napközben pedig fel voltam fúvódva. Az első hét után a görcseim elmúltak, megszűnt a fájdalom. Később már csak elvétve éreztem enyhe fájdalmat, ezért az első doboz után emeltem az adagot napi 2x3 kapszulára, és így folytattam az egész kúrát. Az első 2 hét után már bármit megehettem, nem voltam rosszul, nem hánytam, semmi bajom nem volt. Azóta is tünetmentes vagyok és azt eszek, amit akarok.

Hálás vagyok, hogy találkoztam a Purtierrel, mert rövid időn belül megoldotta a hat évvel ezelőtt kezdődött napi szintű problémáimat.



Adagolás:

Kezdetben napi 2x1
Később 2x1, 2x2, 2x3



INKONTINENCIA

#133

INKONTINENCIA

Ilona, nő (79)

Kiindulási állapot:

A Purtiert pusztán prevencióss céllal kezdtem el szedni 2022 augusztusában. Éjszakánként görcsölt a lábam és időskorral járó inkontinenciám volt.

Gyógyszert nem szedek, csak vitaminokat.

Vízfogyasztás:

2,5 L

Kúra kezdetén éreztem az összes múltbeli problémát, ahol valamiféle törésem, vágásom volt az életem során.

Sok-sok éve minden éjszaka arra ébredtem, hogy görcsölnek a lábaim, ez az erős fájdalom megszűnt. Már csak akkor történik meg, ha megerőltetem a lábam napközben.

Aktív nyugdíjas kort élek, sütök-főzök, ha kell a kertben segítek és mindennap kb. 4 km-t biciklizek.

Befejeztem az első kúrát, folytatom a vitaminok szedését. Érzelmileg stabilabb lettem, aminek nagyon örülnek a környezetemben lévők is.

Az inkontinencia problémám elmúlt szinte teljes mértékben, hihetetlen, hogy ez 79 éves korban lehetséges.

Még energikusabb vagyok a Purtiernek köszönhetően, mint eddig voltam, és pozitívan állok a következő min. "21 évhez".



Adagolás:

- 1. hónap: 1x2 db reggel,
- 2. hónaptól: 2x2 db

ÍZÜLETI PROBLÉMÁK

#135

ÍZÜLETI FÁJDALOM

István, férfi (48)

Kiindulási állapot:

Problémáim 2016-ban kezdődtek. Térd, derék, nyaki gerinc ízületi fájdalmaim voltak. Évek óta magas vérnyomásom volt.

2023. januárjában kezdtem el használni a Purtiert.

Szedés után a második héten a térdfájdalmam megszűnt, 3-4. héten a derékfájdalmam is megszűnt, viszont a karomban a fájdalom még jelen van, de enyhébben mint azelőtt. A 3. doboznál enyhülés következett a nyaki gerinc fájdalomnál is, életminőségem nagyban javult.

A kúra közepénél elhagyhattam a vérnyomáscsökkentőt. A szemhéjamról a papilloma leesett. Sokkal energikusabb vagyok, mint valaha, ismerőseim szerint sokat fiatalodtam.



Adagolás:
2x1, majd 2x2,
2x3 kapszula

#136

ÍZÜLETI FÁJDALOM

Erzsébet, nő (78)

Kiindulási állapot:

2022-ben kezdődtek ízületi fájdalmaim és keringési problémáim.

Purtiert 2023. januárjában kezdtem el szedni.

A szedés megkezdése után a 2. héttől felerősödtek az ízületi fájdalmaim, majd enyhülni kezdtek és elmúltak. Sokkal kipihentebbnek érzem magam, nyugodtabban, pihentetően tudok aludni. Energikusabb vagyok, a hangulatom pozitív irányba változott, sokkal jobban érzem magam a bőrömben. Ezt a külvilág is észrevette rajtam. Ezeken kívül a hajam minősége és a látásom is sokat javult, mióta a Purtiert használom.

Adagolás:
Napi 2x1, 2-1-1

Kiindulási állapot:

A Purtier kapszulát az alábbiak miatt kezdtem el fogyasztani. Kb. 7 éve kezdett el fájni a csípőm, akkor még enyhe ízületi kopást diagnosztizáltak, majd 2019-ben szétszakadt a jobb vállamban a rotátorköpeny. Ennek kapcsán kerültem traumatológushoz, aki azt javasolta, hogy megműti a vállam, hogy utána tudjak mankózni. Természetesen folyamatosan fogyasztottam különböző ízületiápláló és sejtszinten hatékony étrend kiegészítőket, de sajnálatosan elsőpró sikert egyik sem aratott.

Ezen kívül, még 2 nőgyógyászati műtét várt rám. A Covid miatt a műtétek elmaradtak. Egészségügyi kihívásként szerepelt még felszívódási zavar, 3 gerincsérv, illetve nagyon gyakran félrenyeltem, kb. 40 éves korom után észleltem ezt a tünetet.

2022. április 3-án kezdtem el a Purtier fogyasztását.

Adagolás:

Napi 1 kapszulával kezdtem, majd fokozatosan emeltem 3x2-ig, egészen decemberig ilyen dozírozásban fogyasztottam. 2023. januártól napi 1 kapszulát elszopogatva, áprilisig (nyálkahártyán felszívódva) szedtem napi 3 liter víz fogyasztása mellett.

A terápia elején kissé fokozódtak a fájdalmak, aluszékonnyá váltam. 8-10 órát is aludtam, ami előtte nem igazán volt rám jellemző. Ez kb. 2 hónap után átbillent. Napközben abszolút elsőpró energiával rendelkeztem, éjszaka pihentető alvás volt jellemző. Az első doboz elfogyasztása után a rotátorköpeny szakadás utáni és a gerincsérveknél észlelt állandó fájdalom megszűnt, illetve a csípőmben is csökkent.

A nyomák miatti erős vérzés is alábbhagyott, majd a későbbiekben teljesen elmúlt. A fájdalmak és a panaszok enyhülésével, még inkább nem csak a testi, hanem a lelki egyensúly is előtérbe került. Ez a készítmény, messze átlagon felüli életminőség változást hozott számomra.

Gyakorlatilag a felsorolt panaszaim megkérdőjelezhetetlenül véget értek, így 3 műtét elmaradt (váll-, rotátorköpeny szakadás, mióma és nőgyógyászati plasztikai műtét).

Ami még jelenleg egészségügyi kihívást jelent az igen előrehaladott csípőízületi kopás, illetve az MR vizsgálat alapján a combcsont felső részében levő cysták.

Ezért a műtét mellett döntöttem, ami két hét múlva várható (2023 október). A műtét utáni gyors regeneráció érdekében 2023. szeptember elején újra elkezdtem a Purtier fogyasztását.

Kíváncsian várom a jövőt, hálás vagyok, hogy anno a termékre találtam és a felsorolt problémáimat segített leküzdeni.



2022.03.



2022.11.

#138



2021.06.



2022.06.



2021.04.



2022.08.

Laboratóriumi lelet: 2018. július 9.

MR magánrendelés - 001047212

Páciens neve:	Borbély, Zoltán	Térítési kategória:	III
Születési ideje:	1968.01.15	Beküldő Orvos:	Dr. B. Zoltán
TAJ száma:	979 676 433	Beküldő Intézet:	
Lakcíme:	1025 Budapest, Hosszú u. 18.	Ellátás időpontja:	2018.07.09. 14:37:25
		Naplószám:	

Nyaki gerinc MR vizsgálat:

T1, T2 súlyozott STIR sagittalis síkú, T2 súlyozott coronalis síkú felvételeket készítettünk a cranio-cervicallia átmenettől a Th.IV. csigolyáig. Axialis síkú T2 súlyozott felvételeket készítettünk C.III-VII. Intervertebralis rések magasságában.

A gerinc íve diszharmonikus, a nyaki lordosis kiegyenesedett, enyhe balra convex scoliosis látható.

A C.V-VI. és C.VI-VII. résekben a zárólemezek mellett magas jelintenzitású sáv látható a STIR felvételeken.

A C.IV-V-ben medialis discus hernia látható, amely eléri a myelont.

A C.V-VI. és C.VI-VII. résekben széles alapú medialis discus hernia ábrázolódott, amely a myelonon enyhe compressiot okoz valamint szűkíti a forameneket.

A csigolyatestek magassága megtartott, a peremszélek megnyúltak, helyenként osteophytosissal.

A discusok jelintenzitása a T2 súlyozott szekvencián csökkent.

A myelon jelstruktúrája szabályos.

Vélemény:

Spondylosis, polydiscopathia.

Hernia disci C.IV-V.

Hernia disci C.V-VI. et C.VI-VII. myelon compressioval.

Spondylodiscitis C.V-VI. et C.VI-VII.

Laboratóriumi lelet: 2020. március 4.

Anyja neve:	Borbély, Zoltán	Vizsgálat ideje:	2020.03.04. 07:11
Lakcím:	1025 Budapest, Hosszú u. 18.		
Beküldő intézet:	Ortopédia szakambulancia (01A621021)		
Beküldő orvos:			
Betaló Dg.:	Radiculopathia M5410		
Vizsgálatok:			
34924	Gerinc MR vizsgálata natív gerinc		
34942	Ízület, végtag MR vizsgálata natív		

Nyaki gerinc MR vizsgálat:

Technika:Sagittalis síkú T1, T2, STIR, coronalis és porcrésekre döntött axiális 3D COSMIC mérés készült

Anamnézis: Nyaki gerinc és jobb váll és jobb csípő panaszok miatt vizsgált beteg. A nyaki gerinc szakaszon (C 4-7) ismert discushernia, spondylosis.

Összehasonlításhoz képi előzmény nem áll rendelkezésre.

A craniospinalis átmenet normális. A myelon ábrázoló szakaszon jelzavar nem mutatható ki.

A nyaki lordosis íve megtartott. Scoliosis nem látható.

A csigolyatestek magassága megtartott. A C.V.-C.VII. csigolyák T2 és STIR mérés során magas jeladású, T1 mérés során itt helyenként alacsony jeladás látható, mely Modic I-es típusú csont oedemának megfelelő.

A C.III. csigolya jobb oldali dorsalis alsó pereme megnyúlt, itt a foramen vs. nem szűkebb

C 4 - C 7 discusok ellapultak, jeladások csökkent, mely dehydrationa utal.

A C.IV.-C.VI. csigolyák dorsalis peremszélei megnyúltak, mely legkifejezettebb a C.VI. csigolya magasságában. A foramenek mindkét oldalon, jobb túlsúllyal emiatt szűkebbek, a kilépő gyökök érintettsége valószínű. A canalis spinalis a C.V. és C.VI. porcrések magasságában szűkebb, melynek AP átmérője kb. 8 mm, a C.V./VI. discus magasságában a durazsák is komprimált, a liquor tér a myelon körül beszűkül.

A C.III./III. és C.III./IV-es discus valamint a Th. I-es és Th V csigolyák közötti discusok szabályos morfológiájúak.

A kisízületekben enyhe arthrosis jelei.

Jobb váll MR vizsgálat:

Mindhárom síkú Fatsat PD és coronalis T1 mérés készült.
A vizsgálatot jobb váll fájdalom miatt végeztük.

Az AC ízületben a peremcsélek megnyúltak, enyhe synovium megvastagodás is megfigyelhető. Az acromion I típusú. Az acromion peremcsélen meszesedésnek megfelelő jelmentes megnyúlások követhetők. A subacromialis tér beszűkült.

A supraspinatus ín elvékonyodott, az anterior régióban magas jeladasi sávok követhetők, a posterior régióban szabályos jeladás látható, melyek részleges szakadásnak megfelelnek. A supraspinatus ín tapadásának megfelelően a humerusfej állományán belül 14 mm legnagyobb átmérőjű, magas jeladasi cystosus képlet figyelhető meg, szomszédságában egy kisebb 5 mm-es hasonló jeladasi képlet is megfigyelhető.

Az infraspinatus ín vastagsága megtartott, tapadásához közel szintén az anterior régióban keskeny magas jeladasi sávok követhetők, melyek szintén részleges szakadásra utalhatnak.
Az axillaris recessusban kevés folyadék figyelhető meg.

Ambuláns lap: 2022. június 13.

Születet - nőgyógyászati szakamb. (2. th.)
Osztályvezető főorvos: Dr. Horváth Zoltán

Finanszírozási azonosító: 01K120421
Tel.: (1) 475-2600 / 1845 mellék

Ambuláns lap (B0312005)	
Név:	Naplószám:
Születési név:	TAJ:
Születési hely, idő:	Vizsgálat ideje: 2022.06.13. 09:04
Anyja neve:	
Lakcím:	
Beküldő intézet:	Születet - nőgyógyászati szakamb. (2. th.) (01A620421)
Beküldő orvos:	
Beutaló Dg.:	A méh leiomyomája, k.m.n. D2590
Anamnézis/Status:	2020.10.13.

Anamnesis: UM: 09.28

P: 2 pvn - cave nem ismert M: hüvelyplasztika, hasplasztika
2011. ismert myoma uteri

2020.10.13. 14:39 TVS leletet hozott
62x42mm-es ut-ban 5mm-es endometrium.mellső falban hályagot bedomborító 24x24mm-es myom göb látható.
áramlás kimutatható.mellső falban egy 32x26mm-es fundusban egy 21x20mm-es myom göb látható.
cervixben Naboth tüszők.
Jo.ov. 36x29mm benne egy 23 ill. egy 34mm-es folliculus.
Ho.ov. 23x16mm benne cdb 5mm-es folliculus.
Douglasban folyadék nincs.

Főorvosi bemutatásra irányítjuk II. telephely, Podmaniczky u.111. Nőgyógyászati szakambulancia. Minden szerdán 09:00 órakor.

2020.10.14.

St.idem.

L.S.K - Chrobak végzendő

Műtétre előjegyeztük 2020.11.27-re

Műtét ki vizsgálás céljából kezelőorvosához Dr. Horváth Zoltán főorvoshoz irányítva.

Diagnosztikai eredmények:

Vizsgálatok:

11301 Kontrollvizsgálat, konzílium

Megállapított Diagnózis:

D2590 A méh leiomyomája, k.m.n.

Laboratóriumi eredmények:

Terápiás terv (terápia) /Vélemény:

Kontroll/Visszarendelés:

Állapotromlás, illetve panasz esetén jelentkezzen szakrendelőnkön.

Felírt gyógyszerek:

Gyógyszer neve

ESCAPELLE 1.5 MG TABLETTA / 1x
buboréksomagolásban

Adagolás

napi 1 tabl.

Vény darab

tableta

Ambuláns lap: 2023. április 26.

Ambuláns lap (B0312005)	
Név:	Naplósorsszám:
Születési név:	TAJ:
Születési hely, idő:	Vizsgálat ideje: 2023.04.26. 16:15
Anyja neve:	
Lakcím:	

Beküldő intézet: Szülészeti- nőgyógyászati szakrendelés (01K120401)
 Beküldő orvos: A méh leiomyomája, k.m.n. D2590

Anamnesis: UM: 2023.04.18.

P: 2 pyn. cava nem ismert M: hüvelyplasztika, hasplasztika

2011. ismert myoma uteri

3 éve neg. cyt

Jelen panaszok: pm., szűrés

Status:Cyt: 1075

Hason pp. gyógyult hasplasztika hege, a has puha betápintható

Normális külső genitálék, kp. nóg hüvely, portio folytatásában rendes nagy anteflexált méh szabad környezetben.

TK: Ép hám

Tájékozódó UH:

A vizsgálat GE VOLUSON 730E készülékkel (Orténik).

60x38 mm-es ut-ban 5mm-es endometrium, mellő falban hólyagot bomborító 26x24mm-es myom göb látható, áramlás kimutatható, mellő falban egy 26x17 mm-es fundusban egy 20x23mm-es myom göb látható, cervixben Naboth tüzók.

Jo.ov. 25x30mm, simplex cysta.

Bo.ov. norm. szerk.

Douglasban folyadék nincs.

Laboratóriumi eredmények:

Vélemény: Terápiás terv (terápia): acut gynec teendő nincs.

MGR javasolt.

Cyt. eredmény 2-3 hét múlva az EESZT-n megtekinthető vagy rendelésünkön átvethető.

Vizsgálatok:

11041 Vizsgálat

22854 Cervix nyák minőségi vizsgálata

Megállapított Diagnózis:

D2590 A méh leiomyomája, k.m.n.

#141

Ambuláns lap: 2023. június 8.

Lelet	
Név:	Naplósorsszám:
Születési név:	TAJ:
Születési hely, idő:	Vizsgálat ideje: 2023.06.08. 08:32
Anyja neve:	
Lakcím:	

Beküldő intézet: Baleseti sebészeti szakrendelés (01K120301)

Beküldő orvos:

Bemutató Dg.: Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával M5110

Vizsgálatok:

34924 Gerinc MR vizsgálata natív gerinc

34942 Izület, végtag MR vizsgálata natív

L-S gerinc MR vizsgálatát natívan sagittalis T1, T2, STIR, coronalis T2, L.II.-S.I. résekre döntött axiális T2, sacrumról coronalis STIR, a medencéről coronalis és axiális, PDFS mérésekkel végeztük. A vizsgálatot Discushernia gyanúja miatt kéri.

Megtartott lordosis, enyhe balra convex scoliosis. A csigolyatövek magassága szabályos, rándulások

llettek. A peremeken diszkrét spondylophyta képződés, a kisízületekben arthrosis jelei láthatók.

L.II./III. discus enyhén dehidrált, kiboitosulás nem mutat.

L.III./IV. discus dehidrált, széles alappal enyhén kiboitosul.

L.IV./V. discus dehidrált, dorsalis laposabb, széles alappal, bal tüdőlyval kiboitosul, bal oldalon a

peremszéli felrakódásokkal együtt a recessus lateralis szűkült, a lezártó gyök enyhén komprimált.

L.V./SI discus dehidrált, bal oldalon széles alappal, jelentősebben kiboitosul, a recessus lateralis szűkült, a

lezártó gyök komprimált.

A csontos canalis spinalis megtartott.

A myelon vizsgálatba került az akascsanak vastagsága, jeladása szabályos.

A sacroiliacalis ízületek épek, környezetükben kóros jeladás nem különül el. A canalis sacralisban néhány

gyöki cysta látható.

A jobb csípőízületben legnagyobb vastagságában 12 mm-es kóros folyadék szaporulat látható. A femurfej

és nyak, acetabulum oedémás, a femurfejben több subchondralis cysta ábrázolódik. A femurfej laposabb,

a perem osteophyta képződés figyelhető meg. Bal oldalon a csípőízületi résben kóros

folyadékszaporulat nem látható. A femurfejben több subchondralis cysta ábrázolódik.

Vélemény: Spondylarthritis, spondylarthrosis, scoliosis. Polysegmentális discopathia, protrusio disci. Bal L. 5,

S 1. gyöki érintettség. A jobb csípőízületben osteoarthritis. A bal csípőízületben mérsékelt degeneratív

eltérések. Tarlov-cysták.

TÉRDKOPÁS

Marianna, nő (58)

Kiindulási állapot:

2017-ben úgy elkezdett fájni a jobb térdem, hogy alig tudtam járni. Folyamatosan jártam az orvosokat (magam is orvos vagyok), a fájdalomtól nem tudtam aludni, sem vezetni.

2018 januárjában műtötték a jobb térdemet, aztán augusztusban a bal került sorra. Mindkét műtét jól sikerült, de megrövidültek az izmaim, ezért a jobb lábam folyamatosan be volt hajlítva és nehezemre esett a járás. A műtét hatására fájdalom enyhült a térdemben, de mivel a műtét előtt nem nagyon tudtam mozgatni a lábamat, a combomban lévő merev izmok ismét fájdalmat okoztak.



Adagolás:

Napi 2x1
Később 2x2

A Purtiert napi 2 kapszula adagolásban kezdtem el szedni. Minden javult, jól éreztem magam, így 2 hét múlva napi 4 kapszulára emeltem az adagot. A nagyobb adagolásnál a térdfájdalom olyan erős lett, hogy alig tudtam járni, így visszatértem az eredeti napi 2 kapszulas adaghoz. A térdeim felváltva fájtak, néha a jobb, néha a bal. Újabb 2 hét után megpróbáltam napi 4 kapszulára emelni az adagolást és a fájdalom már nem tért vissza. A térdem állapota nagyon sokat javult. A harmadik doboznál már nem fájt a térdem, csak enyhén éreztem. A Purtiernek köszönhetően sok év után 2020. október 17.-én ismét elmentem úszni. Elképesztő érzés volt.

Most jóga járok és háttornára, pedig korábban egyáltalán nem sportolhattam. A hangulatom javult. A körülöttem lévők azt mondják, hogy a járásom javult és jobban is nézek ki. Energikusabbnak érzem magam, nincsenek olyan mély ráncaim, mint korábban és eltűntek a szemem alatti táskák is.

MR vizsgálat: 2017. május 11.

Vizsgálat napja: 2017.05.11.

Jobb térd MR vizsgálat:

Hitachi Aperto Lucent (0,4 Tesla) MRI berendezésén sagittalis PD+T2 és fatsat PD, coronalis fatsat PD és T1, axiális STIR szekvenciák készültek.

Klinikum: Térd fájdalom.

A medialis meniscus hátsó szarvában degeneratív jelek, a hátsó szarv-test határon horizontalis degeneratív szakadás és test középső harmadában a belső felszín mentén részleges radialis szakadás van, a meniscustest kb. 3 mm-t extrudálódott az ízületi részből. A medialis tibio-femoralis kompartmentben a porc felszínének részleges hiánya látszik, a subchondralis csontállomány ép. A medialis peremeken kis felrakódások vannak. A lateralis meniscus elülső szarv-test határán, az elülső szarvat érintő degeneratív szakadás van kis paramenisialis cystával. A kompartment centralis és elülső felében szintén részleges porchiány látszik a lateralis peremeken felrakódásokkal. A keresztszalagok és az oldalszalagok épek.

A patello-femoralis kompartment centralis és lateralis oldalán csaknem teljes porchiány van, a subchondralis csontállományban kismértékű reaktív elváltozásokkal.

A suprapatellaris recessusban kevés folyadék többlet van.

A ligamentum patellae és a quadriceps ín ép.

Vélemény:

Mindkét meniscusban degeneratív szakadások.

Mindkét tibio-femoralis kompartmentben grade 2-3 chondromalacia, patello-femoralisan grade 2-4 chondromalacia jelei.

Zárójelentés: 2018. január 18.

Felvételi dátum.: 2018.01.17 07:09
Elbocsátás dátum: 2018.01.18 07:00

Felv. típus: 3
Elbocs. típ: 4

Diagnózisok

Lat. pat. l.d.	(BNO: M2220)
CM gr. II-III. patellofem. gen. l.d.	(BNO: M2240)
CM gr. II-III. MPC et LFC gen. l.d.	(BNO: M2410)
Laesio men. med. et lat. gen. l.d.	(BNO: M2320)

Műtétek

2018.01.17. Lat. release. Meniscectomia. Shaver. (WHO: 58300)

Epikrízis

2017. januárjában ágyról leszállva jelentkeztek jobb térd nyílaló jellegű fájdalmai. Előtte egy héttel túrán vett részt. Retropatellaris fájdalmak miatt vettük fel, műtét céljából. ASC során a medialis és lateralis meniscus degeneratív hátsó szarv szakadását eltávolítottuk, a kiterjedt chondropathiát shavereztük, majd lateralis release-t végeztünk. Zavartalan postop. szak után, békés sebbel, láztalanul, jó térdmozgással emittáljuk. Otthonában operált végtagját egy hétig ne terhelje, mankóval közelekedjen! Az osztályunkon megkezdett thrombosis profilaxis folytatása, antibiotikum szedése javasolt.
(20 amp. 5000 NE Fragmin, Augmentin, Xilox granulátum receptre felírva.)

Zárójelentés: 2018. augusztus 10.

Felvételi dátum.: 2018.08.09 07:33
Elbocsátás dátum: 2018.08.10 07:00

Felv. típus: 3
Elbocs. típ: 3

Diagnózisok

CM gr. III-IV. MPC gen. l.s.	(BNO: M2380)
CM gr. II. patellofem. gen. l.s.	(BNO: M2240)
Synovitis gen. l.s.	(BNO: M6730)

Műtétek

2018.08.09. Shaver műtét (WHO: 58047)

Epikrízis

4 éve fennálló, jobb térd műtétét követően, terhelésre fokozódó bal térd végextensios fájdalmak miatt vettük fel, műtét céljából. ASC során a kiterjedt suprapatellaris synovitist, a patellofemorális régió II. fokú chondromalatiáját, valamint a medialis compartement III-IV. fokú chondromalatiáját shavereztük. Zavartalan postop. szak után, békés sebbel, láztalanul, jó térdmozgással emittáljuk. Otthonában kíméletes térdtorna, valamint az osztályunkon megkezdett thrombosis profilaxis folytatása javasolt.
(10 amp. 5000 NE Fragmin, Zadex caps. receptre felírva.)



#145

ÍZÜLETI FÁJDALOM

Gizella, nő (87)

Kiindulási állapot:

25-30 éve fennálló napi szintű ízületi fájdalmak, főleg a csípőízületekben, térdben, vállban és kisízületekben a kézen, ujjakban, nyaki gerincben. A nyaki gerincben 13 évvel ezelőtt sérülés miatt elcsúszott egy csigolya. 6-7 éve kezdődő veseelégtelenség miatt folyamatos vízhajtó szedése, a tüdőre feltelt víz miatt.

Gyógyszerek:

- Lixiana
- Nebibeta
- Furosemid 40 mg. - Ebből szedett egyik nap felet, másik nap egészet. Ezt tudtuk csökkenteni, most minden 2. napon 1 db-ot szed.



Adagolás:

1. doboz: napi 1 (reggel).
2. doboztól: 2x1 (reggel-délután)

A Purtiert 2022. júliusában kezdte el használni.

4 hete jelentkezett övsömör miatt jelenleg napi 3 kapszulát (2-1) fogyaszt. 2022. július óta folyamatosan szedi 2x1 dózisban, mivel közérzete sokkal jobb és energikusabb tőle. Most a 9. doboznál tart, tehát elkezdte a második kúrát is.

Már az első doboz szedésénél, a 10-11. szedési napon észlelte, hogy kezén a kisízületek környékén sok apró-pici pattanás, bőrkiütés jelentkezett, majd ezek 5-6 nap után kezelés nélkül elmúltak és elkezdett enyhülni a kéz ízületeinek fájdalma, gyulladása.

A Purtier szedésének 2-3. hónapjában teljesen elmúlt a 25 éve tartó fájdalom a csípőízületekből és a nyaki gerincből is. Térdízületi fájdalmai is jelentősen csökkentek.

Veseműködése sokat javult, vízhajtók szedését fokozatosan, mérsékelten csökkenteni lehetett, ma már csak 2 naponta szed vízhajtót, nem telik fel a víz a tüdejére. Alvása jobb minőségű, látása kb. 1 dioptriát javult, olvasószemüvegét egy régebbire visszacserélte.

Korát meghazudtolva végzi napi teendőit, segít a családnak, dédunokáival játszik. Sokkal energikusabb, közérzete is javult.

Kiindulási állapot:

Évek óta tartó levertség, állandó fáradtság, térdízületi fájdalmak. Minden ízületem fájt, a kicsik is, nagyok is. Alig bírtam járni, inkább csak vánszorogtam, a térdízületeim hihetetlenül ki voltak kopva, nem tudtak rajta segíteni, még műtéttel sem. A kezemből minden kipotyogott, alig tudtam a karom megemelni, hát-, derék-, bokafájás stb.

Irritábilis bélszindrómám (IBS) volt - napi többszöri hasmenéssel, folytonos diszkomfort érzésekkel. A fejbőrömön legalább 15 éve pikkelysömör volt. Napi szintű lábdagadásom volt estére (vénás elégtelenségből kifolyólag). Insulinrezisztenciám van.

Kúra kezdete: 2022.12.26.,

Adagolás:

első doboz napi 2x2, utána 2x1 kapszula.

#147

Az első jelentős tapasztalatom, mindössze néhány nap után érezhető volt: elmúlt a sok éve tartó ólmos fáradtság, az a fajta, amikor az ember reggel fáradtabban ébred, mint amikor lefeküdt.

Szó szerint minden napomat csak túléltem, nem volt erőm, csak vegetáltam. A munkahelyen (számítógép előtt végzett napi 9 óra ülőmunka) valahogy minden erőmet megfeszítve helytálltam, utána próbáltam magam összeszedni a másnapra, hétvégén a következő hétre, és egyfolytában rettegtem, hogy hogyan fogom ezt bírni nyugdíjas koromig. Ezen a kávé mit sem segített. Amióta a Purtier-t szedem abba is hagytam, és azóta sincs rá szükségem.

Frissen, kipihenten ébredek, és az is maradok egész nap. Már nem aggódom, hogy mi lesz velem: jókedvűen dolgozom, és ezt a munkatársaim is észrevették.

A második, számomra nagyon fontos tapasztalat, ami már 1-2 hét után jelentkezett, az ízületi fájdalmaim csökkenése. Kb. két hét múlva észrevettem (és a férjem is, anélkül, hogy szóltam volna neki róla), hogy könnyebben mozgok, ugyanis évekig csak sántikálva tudtam járni. A lépcsőn le is fel is csak úgy tudtam járni, hogy előbb a bal lábammal léptem, majd mellé húztam a jobbát. Kb. egy hónap múlva gondoltam egy merészet, megpróbáltam váltott lábbal a lépcsőzést: ment, és azóta még könnyebben, úgy mint valaha régen.

A mozgási nehézségek miatt a férjem hordott be és haza a munkából, és bárhova is csak a segítségével tudtam kimozdulni. A napokban már vettem BKV-bérletet, és pl. egyedül mentem fogorvoshoz. Simán ment. Elkezdtem a munkahelyre is önállóan járni. A cél, hogy gyalog tudjak bemenni, hazajönni (1,5 km-re van tőlünk).

Hihetetlen nagy öröm ez nekem, hiszen a Purtier előtt semmi reményem nem volt arra, hogy ez valaha lehetséges lesz, pedig szeretek mozogni.

Vannak további tapasztalatok is: szebb lett a bőröm, különösen az arcomon, ezt is a környezetem jelezte vissza, én nem figyeltem, mert annyi egészségügyi problémám van, hogy nem ez volt számomra a fontos.

Halványul az arcomon lévő májfolt. A sarkamon sokkal lassabban alakul ki bőrkeményedés és sokkal kisebb, nem repedezik. Ez is nagy problémám volt, és semmi nem használt ellene.

A szemem nagyon-nagyon száraz volt (a szemorvos kifejezése), vörös volt, szúrt és könnyezett, állítólag a képernyős munka miatt. Az agyon reklámozott szemcseppek, műkönnyek semmit nem használtak. Mára ez is elmúlt, pedig továbbra is ugyanazt a képernyős munkát végzem.

Irritabilis bélszindrómám (IBS) volt - napi többszöri hasmenéssel, folyamatos diszkomfort érzésekkel. Kb. 2 hónap múlva ez megszűnt.

A fejbőrömön legalább 15 éve pikkelysömör volt, most alig-alig van.

Nagyon pozitív tapasztalatom még, hogy a melegtől (és ülő munkától) estére mindig duplájára dagadt a lábam, bokám, viszont ezen a nyáron az extrém melegben sem! Mutattam is a férjemnek, tehát van tanúm is. Annyira örülök neki! Mert nem csak dagadt volt persze, hanem fájt is rendszeren, alig tudtam járni. Emlékszem, ez már a 20-as éveimben is így volt (a vénás elégtelenséget már akkor megállapították). Az első mélyvénás trombózisomkor 28 éves voltam, de többször nem is voltam vele orvosnál, miután elmondták, hogy nem nagyon tudnak segíteni.

Ne üljek, ne álljak sokat, polcoljam fel a lábamat, fászlizzam stb., vagyis ne éljek. Hát én éltem és persze fájtam.

Az eddigi eredmények ismeretében tényleg minden pénzt megért a Purtier.

Tervezek még legalább egy kúrát, mert az eddigi tapasztalataim nagyon-nagyon meggyőzőek, és még van min javítani (pl. inzulinrezisztencia, ami miatt erősen meghíztam, és eddig semmilyen módszerrel nem tudtam fogyni).

TÉRDFÁJÁS

Tímea, nő (47)

Kiindulási állapot:

Térdfájás, kezdődő reuma/kézfej dagadás és erőtlenség, szépészeti műtét utáni regeneráció.

10-15 évvel ezelőtt kezdődtek a fájdalmak úgy a térdemben, mint derék tájon. Néha nem tudtam lábra állni (megerőltetés nélkül). Kezem bedagadt, a reuma első jeleit mutatta. Édesanyámnak van hasonló tünete a kezével, továbbá cukor problémája, érzékszervei, vérnyomás problémái és magas koleszterinszintje van, ezért megelőzés céljából is szedtem a kapszulát.

Purtier használatának kezdete:

2022 szeptember

Adagolás:

reggel 1, este 1

Szépészeti műtét (mell) után elkezdtem szedni 2x3-at de csak pár hétig.

1. doboz elfogyasztása után nagyon energikus voltam. Hiába vezettem le az energiám tornával, nagyon nehezen aludtam el, emiatt az "esti" adagomat napközben fogyasztottam el. A kúra szedése alatt mindkét kézfejem rettenetesen bedagadt, fájt két hétig aztán elmúlt. Azóta sem jött vissza a fájdalom (7 hónapja).

3. doboz tartalmát már a műtétet követően kezdtem el szedni. Nem éreztem extra fájdalmat, egy hét után a heg nagyon szépen gyógyult. Nem nyílt szét, tulajdonképpen hamarabb összeforrt, mint várható volt, csak kötést cseréltek. Semmiféle komplikáció nem lépett fel.

Fittnek éreztem magam, semmim nem fájt és 2 hét után autót vezettem, ami 6 hét után lett volna aktuális az orvos szerint.

Vízfogyasztás:

3-4 L

Gyógyszert csak a műtét utáni kötelezőket szedtem egy hónapig. Fizikai terhelés után/közben már egyáltalán nem fájnak az ízületeim.

Februárban befejeztem a kúra szedését, viszont áprilisban jött az igazi hatása a kapszulának. Elkezdett fájni nagyon a hátam, derekam, továbbá a térdem. Olyannyira, hogy nem tudtam szinte dolgozni sem, problémát jelentett a lábra állás is. Két hét után viszont egyik reggel arra ébredtem, hogy a fájdalom teljesen megszűnt és azóta sem jött vissza.

Teljesen biztos vagyok abban, hogy a kúra szedése után három hónappal fejezte be a regenerációt a szervezetemben, vagy talán a mai napig sem!

Bőröm kisimult, jobb minőségű. Energikusabbnak érzem magam, sokkal vidámabban, derűsebben élem mindennapjaimat.

A Purtier szedése után teljesen megváltozott az életem, amiért nagyon hálás vagyok!



ÍZÜLETI GYULLADÁS

Zsuzsanna, nő (67)

Kiindulási állapot:

Betegségem 2021 novemberében kezdődött, az ujjaim lemerevedésével. Ezt követően kaptam egy szteroid injekciót, amitől időlegesen javult az állapotom.

2022 január végén újra lemerevedtek az ujjaim, majd februárban mindkét térdem. Gyakorlatilag járásképtelen voltam és felállni is csak segítséggel tudtam. Az ujjaim merevsége miatt nem tudtam egyedül felöltözni, fürdeni és magamat ellátni sem. Betegségem alatt 19 kg-ot fogytam, a hajam csomókban hullott.

2022 augusztus utolsó hetébe találkoztam a Purtierrel.



Adagolás:
2x1 db

#151

Az első tapasztalatom az volt, hogy a harmadik nap után, végre végigaludtam az éjszakát. Ez azért volt nagy dolog, mert a fájdalomtól 20-25 alkalommal ébredtem meg minden éjszaka.

Három hét után a járásom észrevehetően javult, és segítség nélkül fel tudtam állni. Mára már elmondhatom, hogy a mozgásom, a járásom olyan, mint a betegségem előtt. A lépcsőzés, főleg lefelé még egy kicsit nehezebb, de ezt már boldogan viselem.

Egy hónapja szedtem, mikor új labor készült.

A 2022 szeptemberi lelet már mutatja az eredményeket, melyek áprilisra tovább javultak:

- We: 96 - 27 - 14 mm/h !
- CRP: 67,2 - 15 - 12 mg/l !
- Rheumafaktor: 43,4 - 9,1 U/l

Folytatom a Purtier szedését, a második kúrám 5. hónapjánál tartok (2023 szeptember).

A dózison semmit nem változtattam, napi 2x1 szemet szedek.

Jelenlegi súlyommal (9 kg plusz) nagyon elégedett vagyok, a hajam teljesen visszasúszott és újra olyan minőségű, mint régen.

Gyógyszerek:

Vérnyomáscsökkentő gyógyszereim a kúra előtt:

- Reggel: Nebivolol (5mg) 1 db., Valsartan (80mg) 1db.
- Este: Valsartan (80mg) 1db., Lercaton (10mg) 1db.

Magas vérnyomásom a gyógyszerek ellenére is ingadozó volt, időnként kiugróan magas értékekkel. Ez, amióta a Purtier-t szedem rendeződött, nincsenek kiugrások és a gyógyszer adagot is csökkenthettem (az esti Valsartan-t elhagytam).

Az elmúlt héten Barcelonában jártam. Számomra is meglepetés volt, hogy fáradtság és fájdalom nélkül tudtam a napokat végigcsinálni. Egyik este pont erről beszélgettünk a férjemmel, ezért megnéztem a telefonom lépésszámláló applikációját. Megdöbbsentem a számokon amit mutatott. A napi átlagom 12.297 lépés volt, és volt olyan nap is amikor 15.995 lépést tettem meg.

Egy évvel ezelőtt annak is örültem, hogy „újra járni tudok”.

Köszönöm a Purtier-nek!

Laborlelet: 2022.05.17

Beérkezés ideje: 2022.05.17. 11:41

Lelet kelte:

2022.05.17. 13:28

Diagnózis: M0690 Rheumatoid arthritis, k.m.n.

Megnevezés	Érték	M.e.	Megjegyzés	Ellérés	Referencia értékek
Kalcium	2,41	mmol/l			2,20 - 2,55
Foszfor	1,26	mmol/l			0,81 - 1,45
Magnézium	0,93	mmol/l			0,66 - 0,99
Karbamid	3,0	mmol/l			2,8 - 8,1
Kreatinin	64	μmol/l			44 - 80
EGFR EPI formula	87 ml·perc ⁻¹ ·1,73	m2			> 90
Húgysav	283	μmol/l			143 - 339
Glükóz	5,7	mmol/l			4,6 - 6,4
Aszpartát-amino-transferáz (GOT)	12	U/l			< 32
Alanin-amino-transferáz (GPT)	7	U/l			< 33
Gamma-glutamil-transferáz	19	U/l			5 - 36
Bilirubin total	5,2	μmol/l			< 15,0
C-reaktív fehérje (CRP)	67,2	mg/l			< 5,0
Vas	5,40	μmol/l			5,83 - 34,50
Teljes Vaskötő kapacitás	37,80	μmol/l			40,80 - 76,60
Látens vaskötő kapacitás	32,4	μmol/l			24,2 - 70,1
Transzferrin Saturáció	0,14				0,20 - 1,00
Rheuma faktor mennyiségi meghatározás	43,4	U/ml			< 14,0

Monocytá abszolút	0,74	G/L			< 0,80
Eosinophil abszolút	0,30	G/L			< 0,45
Basophil abszolút	0,09	G/L			< 0,20
Vörösvértest	4,09	T/L			3,90 5,30
Haemoglobin	104	g/L			119 160
Haematocrit	0,333	L/L			0,300 0,470
Átlagos vvt. térfogat	81,40	fL			81,00 99,00
Átlagos vvt. haemoglobin tartalom	25,40	pg			26,80 32,20
Átlagos vvt. haemoglobin koncentráció	312	g/L			318 359
Thrombocytá	523	G/L			150 400
Átlagos thrombocytá térfogat	10,10	fL			8,00 11,00
Süllyedés (Westergren)	90	mm/h			< 15

Laborlelet: 2022.09.02

Beérkezés ideje: 2022.09.14. 11:42

Lelet kelte:

2022.09.14. 14:07

Diagnózis: E0790 Pajzsmirigy betegség, k.m.n.

Megnevezés	Érték	M.e.	Megjegyzés	Eltérés	Referencia értékek
Nátrium	141,0	mmol/l			136,0 145,0
Kálium	4,3	mmol/l			3,5 5,1
Klorid	104,0	mmol/l			98,0 107,0
Magnézium	0,88	mmol/l			0,66 0,99
Karbamid	4,2	mmol/l			2,8 8,1
Kreatinin	61	µmol/l			44 80
EGFR EPI formula	>90	ml/perc/1,73 m ²			> 90
Húgysav	258	µmol/l			143 339
Glükóz	4,5	mmol/l			4,6 6,4
Aszpartát-amino-transferáz (GOT)	10	U/l			< 32
Alanin-amino-transferáz (GPT)	7	U/l			< 33
Gamma-glutamil-transferáz	15	U/l			5 36
Laktát-dehidrogenáz IFCC	156	U/l			135 214
Bilirubin total	4,8	µmol/l			< 15,0
Koleszterin	5,4	mmol/l			< 5,2
Triglicerid	1,6	mmol/l			---
Koleszterin-HDL	1,4	mmol/l			> 1,7
Koleszterin-LDL (számolt)	3,68	mmol/l			< 2,56
Non-HDL koleszterin	3,99	mmol/l			---
C reaktív fehérje (CRP)	12,2	mg/l			< 5,0
Vas	7,64	µmol/l			5,83 34,50
Teljes Vaskötő kapacitás	42,04	µmol/l			40,80 76,60
Látens vaskötő kapacitás	34,4	µmol/l			24,2 70,1
Transzferrin Saturáció	0,18	%			0,20 1,00
Monocytá	6,50	%			< 7,00
Eosinophil granulocytá	3,10	%			< 4,00
Basophil granulocytá	0,70	%			< 2,00
Neutrophil abszolút	4,73	G/L			1,80 7,70
Lymphocytá abszolút	3,29	G/L			1,00 4,80
Monocytá abszolút	0,58	G/L			< 0,80
Eosinophil abszolút	0,28	G/L			< 0,45
Basophil abszolút	0,06	G/L			< 0,20
Vörösvértest	4,82	T/L			3,90 5,30
Haemoglobin	123	g/L			119 160
Haematocrit	0,392	L/L			0,300 0,470
Átlagos vvt. térfogat	81,30	fL			81,00 99,00
Átlagos vvt. haemoglobin tartalom	25,50	pg			26,80 32,20
Átlagos vvt. haemoglobin koncentráció	314	g/L			318 359
Thrombocytá	349	G/L			150 400
Átlagos thrombocytá térfogat	11,30	fL			8,00 11,00
Süllyedés (Westergren)	27	mm/h			< 15

Laborlelet: 2023.04.04

Beérkezés ideje: 2023.04.04, 11:05
Diagnózis: D5090 Vashiány anaemia k.m.n.

Lelet kelte: 2023.04.04, 13:50

Negyezés	Érték	Ma	Mennyiség	Eltérés	Referencia értékek
Nátrium	137,0	mmol/l			136,0 145,0
Kálium	4,6	mmol/l			3,5 5,1
Klorid	103,0	mmol/l			98,0 107,0
Kalcium	2,40	mmol/l			2,20 2,55
Foszfor	1,16	mmol/l			0,81 1,45
Magnézium	0,94	mmol/l			0,66 0,99
Karbamid	5,0	mmol/l			2,8 8,1
Kreatinin	93	μmol/l		+	44 80
EGFR, EPI formula	55 ml/perc/1,73 m ²			-	> 90
Hígysav	279	μmol/l			143 339
Glükóz	4,5	mmol/l			4,6 6,4
Aszpartát-amino-transzferáz (GOT)	17	U/l			< 33
Alanin-amino-transzferáz (GPT)	10	U/l			< 33
Gamma-glutamil-transzferáz	17	U/l			5 36
Alkalikus foszfatáz	117	U/l		+	35 104
Laktát-dehidrogenáz (LDH)	168	U/l			135 214
Bilirubin totál	6,6	μmol/l			< 15,0
Koleszterin	5,4	mmol/l		+	< 5,2
Triglicerid	1,5	mmol/l			—
Koleszterin-HDL	1,4	mmol/l		+	> 1,7
Koleszterin-LDL (számolt)	3,69	mmol/l		+	< 2,59
Non-HDL koleszterin	3,99	mmol/l			—
C reakós fehérje (CRP)	15,0	mg/l		+	< 5,0
Vas	6,93	μmol/l			5,83 34,50
Teljes Vaskötő kapacitás	46,43	μmol/l			40,80 76,60
Látens vaskötő kapacitás	39,3	μmol/l			24,2 70,1
Transzferrin Saturáció	0,15			-	0,20 1,00
Rheuma faktor (RF)	8,1	U/ml			< 14,0
Zöngéztetés					
Teljes vérkép automatával					
Fehérvérszám	5,34	G/L			4,50 11,00
Neutrophil granulocyták	49,10	%			40,00 70,00
Lymphocyták	35,60	%			22,00 44,00
Monocyták	10,70	%			< 7,00
Eosinophil granulocyták	3,70	%			< 4,00
Basophil granulocyták	0,90	%			< 2,00
Neutrophil abszolút	2,62	G/L			1,80 7,70
Lymphocyták abszolút	1,90	G/L			1,00 4,80
Monocyták abszolút	0,57	G/L			< 0,80
Eosinophil abszolút	0,20	G/L			< 0,45
Basophil abszolút	0,05	G/L			< 0,20
Vörösvértest	5,01	T/L			3,90 5,30
Haemoglobin	137	g/L			119 160
Haematocrit	0,431	L/L			0,300 0,470
Atlagos vvt. térfogat	86,00	fL			81,00 99,00
Atlagos vvt. haemoglobin tartalom	27,30	pg			26,80 32,20
Atlagos vvt. haemoglobin koncentráció	314	g/L			318 359
Thrombocyták	249	G/L			150 400
Atlagos thrombocyták térfogat	11,80	fL		+	8,00 11,00
Sedimentáció (Westergren)	14	mm/h			< 15



Kiindulási állapot:

Évek óta tartó gerincfájdalom miatt (gerincferdülést már lánykoromban megállapítottak hirtelen növekedés miatt) 2021. májusában kerestem fel egy gerinc specialistát. Vizsgálat és MR után a Doktor Úr azt állapította meg, hogy a gerincemnek nincs olyan eltérése, amit sebészileg kezelni kellene. A gerincferdülés miatt kialakult korai öregedése a gerincnek és a gerincferdülés okozzák a folyamatos panaszokat. Megfelelő tornával, hátizomerősítéssel, mozgással lehet egyensúlyban tartani.

Alternatív kezelésekre jártam, masszázusra, denevérpadra, illetve edzőterembe erősíteni.

2022. márciusában már keresztcsonti és csípőfájdalmaim is voltak. Reumatológushoz mentem, aki fürdőkúrát javasolt: iszappakolást, gyógymasszázszt, tangentoros kezelést és vízi gyógytornát írt fel.

Ezek után a kezelések után sem javultak a panaszaim lényegesen. Ekkor nagyon nehéz életszakaszom volt, a sok stressz miatt teljesen padlón voltam mentálisan is. Egész testemben fájtak az izmaim és az ízületeim.

2023. februárjában kerestem fel egy neurológust. Fél éven keresztül nagyon alaposan kivizsgált a Doktornő, de semmi szervi problémát nem talált. (elektrofiziológiai vizsgálat, laborvizsgálatok, immunológiai és genetikai vizsgálatok, nyaki gerinc MR, toxikus vizsgálat, tumormarkerek)

2023. októberében újabb csípőrontgent kértem, összehasonlítást a másfél évvel előtti lelettel. (Mindkét leleten ugyanaz a szöveg volt: porckopás)

Ezzel a röntgenfelvétellel mentem privát ortopéd orvoshoz, akit azért kerestem fel, mert a bal csípőm többször beállt, általában éjjel. Ilyenkor nagy fájdalmaim vannak, a térdeimet nem tudom egymáshoz közelíteni, a combcsontom kifelé áll, se feküdni, se állni, se ülni nem tudok. (járókerettel közlekedek, wc magasító kell, ez napokig eltart) A Doktor Úr ezzel a csípőmmel nem is foglalkozott, a röntgen alapján csípőprotézist ajánlott, műtétet. Gondolkodási időt kértem.

Adagolás:

2023. novemberében kezdtem el szedni a Purtiert (6-os generációt) 3 napig 1-et, 3 napig 2-t, 3 napig 3-at, így tudtam felemelni 6 kapszulára. Január végétől a 7 generációs terméket szedem.

A Purtier hatásának leírása:

Napi 2-2,5 liter vízfogyasztás mellett. Pár hét után sokkal jobban lettem, tudtam éjjel aludni, napközben energikusabb voltam, de azt is el kell mondanom, hogy az elején pár hétig délután is aludtam fél órát. Mentálisan is jobban lettem. Gyógytornára ugyanúgy jártam, a gyógytornászmester is észrevette a változást rajtam, jobban mozogtam és a kedvem is jobb lett. Mivel velem egyidőben a férjem is elkezdte szedni a Purtiert, januárra elfogyott. Január végén folytattam a Purtier szedését, de már a 7. generációs termékkel. Napi 1 kapszulát szedtem, az elején sokat szédültem, émelyegtem a kapszulától, de ez 1 hét alatt elmúlt. Ekkor felemeltem napi 2-re. Pár nap után megint éjjel beállt a csípőm és erős fájdalmaim is voltak. Inkább visszavettem napi 1 kapszulára, ezzel most teljesen jól vagyok, még tart a kúra szedése. A csípőműtétre nem is gondolok.

Még egy érdekességet szeretnék elmesélni: varrónőként sok anyaggal találkozok naponta, ezért évek óta nem volt ujjlenyomatom, így a személyi igazolványt és az útlevelet is 1 évre kaptam meg. Riway cég őssejtes testpermetével (Conscientions) fújtam napi többször az ujjaim végét és lett ujjlenyomatom. 10 évre megkaptam a személyit és az útlevelet is.

Minden köszönet a Purtiernek.

PERIFÉRIÁS NEUROPÁTIA

Krisztina, nő (57)

Kiinduló állapot:

Egész életemben elkerültek a betegségek és a nátha is csak 10 évente egyszer talált rám, de...

2016. januárjában Zika-vírus szövődményeként Guillain-Barre-szindróma alakult ki nálam. Ennek következményeként részlegesen járásképtelenné váltam a perifériás neuropatia okozta információ veszteség miatt. Az agyamból kiinduló mozgás utasítások nem jutottak el a megfelelő helyre a leépült idegburkok miatt (...ezt úgy kell elképzelni, mint amikor az elektromos

vezetésekről eltűnik a szigetelés és az áram minden irányban, össze-vissza kóricál.) A teljes testem, az egész bőrfelületem és valamennyi végtagom túlérzékenyvé vált és minden érintés, mozdulat óriási fájdalmat okozott, miközben alig tudtam járni. Orvosi segítségként B12 vitamint és tanácsstalanul széttárt karokat kaptam. Ennyit tudtak orvosilag értem tenni, ezért maradt az öngyógyítás. Mindent megtettem magamért fizikailag és lelkileg is, hogy visszakapjam az egészségemet. 6 hónap alatt a tüneteim minimálisra csökkentek.

Tapasztalatom a termékkel:

2023. november elején találkoztam a Purtier-rel. Az eltelt évek alatt újra fitt voltam, sok mozgással, betegségek nélkül, de még a végtagjaim „végein” és a hátamon voltak neuropátiás tüneteim, amit nem sikerül önerőből feloldanom. Így amikor a termék hatásairól hallottam, azt gondoltam, ha csak ezektől a maradék tüneteimtől megszabadít, már megérte.

1x1 majd néhány nap után 2x1 kapszulával indítottam, ami azonnal fejfájást okozott. Egy hétig, szinte migrénszerűt, amiért időnként fájdalomcsillapítót is be kellettennem.

Viszont jóalvóként alig hittem el, hogy lehet még komfortosabb, békésebb az alvás. Az első kapszula után ez nálam bekövetkezett a legnagyobb öröömre és azóta is tart.



Egy hét után 2x2-re majd 2+3-ra emeltem a dózist és újabb tünetek jöttek elő:

- a kézilabdás korszakom sérülései, a vállam, sípcsontom, lábfejem görcsölt, fájt elviselhető módomban, csak jelzés értékűen. Nagyon rövid idő múlva az ízületeim olajozottá váltak.
- a „családi örökségem” az állkapocs csontom sorvadása. Arccsont fájdalmaim voltak a szedés minden hónapjában. A kalcium beépülés nagy fájdalmakkal járt, viszont a fogaim, amiket már alig tartott a csont, hétről-hétre stabilabbá és rágóképesebbé váltak.
- az emésztésem, ami nagyon lassú volt, a kúra közepétől teljesen rendbejött és rendszeressé vált.
- a fülbúgásom, ami egy mély búgó hang volt egy év óta a jobb fülben, az állkapocs fájdalmammal egyidőben, hol erősebb, hol gyengébb volt, majd a kúra végére teljesen megszűnt.
- a végtagjaim megdagadtak, amit nem csak a neuropátiás tüneteim, hanem a nyirokrendszerem rossz működése is okozott. (Évek óta nem tudtam viselni a gyűrűimet, mert mindig puffadtak voltak az ujjaim.)

A 2. hónaptól, esténként vékonyak, puffadás mentesek voltak az ujjaim, reggelre újra feldagadtak, heteken át ismétlődve. Esténként a gyűrűimmel ellenőriztem a javulást.

- a lábfejeimben időnként, 2 órás zártcipő viselése után, égető fájdalom és talpgörccs jelentkezett, és bárhol voltam, utcán, plázában, vendégségben, le kellett vennem a cipőmet, és masszírozással feloldani a fájdalmat. Egyre többször és egyre hosszabb ideig voltak az ujjaim, a kézfejeim és végül a lábfejeim is egészséges méretűek, enyhültek a tünetek is. A kúra közepétől rohamosan ritkultak a kellemetlenségek, majd teljesen elmaradtak.
- a 7. doboz szedése alatt hosszú repülőúton voltam. Sohasem volt az arcüregemmel gondom, de a kiegyenlítés nehezen ment mindig a repülések alatt. Ezen az úton a kiegyenlítődés az arcüregemben szinte automatikusan történt meg. Már utazómagasságban voltunk, mikor észrevettem, hogy nem kellett a kiegyenlítéssel foglalkoznom. (Innom, a befogott orromba fújnom, vagy nagyokat nyelnem.)

A 11. héttől már csak napi 2 db kapszulát szedtem, és az utolsó doboznál már csak 1 db-ot naponta.

2024. április első hetében fejeztem be a kúrát

Egy hónappal a szedés befejezése után a tüneteim közül még néhány ismétlődve, enyhe fájdalmakkal, bizsergéssel jelzi, hogy az összejtjeim még nem alszanak, találtak még kijavítani valót és tovább dolgoznak rajtam. A vízszintesen beszorult bölcsességfogam elkezdett, igazi fájdalomcsillapítóra sem reagáló fájdalmakat produkálni.

A kúra alatt azt éreztem, biztonságban vagyok és boldog voltam, hogy értem van a folyamat minden része. A kúra 4 hónapja alatt állandóan magamon volt a fókuszom. Még sohasem figyeltem ennyire a testem jelzéseire és sohasem tudtam ennyire irányítani a gyógyulásomat. Nagy hálás vagyok, hogy létezik ez a kapszula és fogyasztója lehettem.

Adagolás: Első hét: 1x1
2. hét: 2x2
3. hét: 2+3
7. hét: 2x2
8. hét: 2+1
11. hét: 2x1
7. doboz: 1x1

Vízfogyasztás: napi 1,5-3 l

Összefoglalás:

Perifériás neuropátiás tünetek, égő láb érzés, dagadás: végtagokban, háton: megszűnt

Nyirokproblémák végtagokban: megszűnt

Lassú emésztés: rendszeressé és normálissá vált

Fülbúgás: megszűnt

Izületi kopások, mozgáskorlátozó problémák végtagokban: megszűntek

Arccsont sorvadás: állkapocs erősödés, foggyökér stabilizálás folyamatban, rágóképesség megerősödött, fogak többsége stabilizálódott

Arcüregek kiegyenlítése nehezen ment: a teljes arcüreg kitisztult, könnyed kiegyenlítés repülőúton, bűvarkodás közben.

Kiindulási állapot:

Sok éve tartó ízületi betegségek, gyerekkor óta tartó migrénes fejfájás, myoma.

A Purtier használatának kezdete:

2023.október 20-án kezdtem el szedni.

Adagolás:

1. hét napi 1 kapszula, 2. hónap végéig 2x1 kapszula, majd a kúra végéig 2x2 kapszula

A Purtier hatásának leírása:

Régóta küzdöttem ízületi betegséggel, teniszkönyökkel, alagút szindrómával, a csukló fokozott ízületi fájdalmával. Gyerekkorom óta küzdök migrénes fejfájással.

A fodrász szakma szép, de kemény fizikai munka.

A kúra kezdetekor a bal bokámban kezdett el dolgozni, ami 3 éves korbán volt eltörve. 3 hét után észrevettem, hogy kevésbé fájnak az ízületeim és a fejem. Majd ahogy haladtam előre a kúrával, ezek a fájdalmak megszűntek, a migrénes fejfájásom a mai napig nem tért vissza.

Minden évben megyek cytológiai vizsgálatra, ahol nagy öröm ért. Felszívódott 5 myomám és a méhnyálkahártyám is behegesegett (1994 óta jártam évi kétszer ecseteltetni).

1988 óta volt gyomorfekélyem. Ma már nem fáj, aminek nagyon örülök.

Legnagyobb meglepetés az volt számomra, hogy hosszú évek óta tartó állómunkától kialakult visszerek a lábszáramból felszívódtak.

Nagyon régóta küzdöttem hajhullással, pedig fodrásként mindenféle terméket kipróbáltam. Mivel az ízületeim mindig gyulladásban voltak, így a hajam is hullott folyamatosan. Most már hullás helyett sűrűsödik!

Szóval nekem ez az egy kúra megoldott nagyon sok betegséget a szervezetemben.

Azóta fitt és sokkal energikusabb vagyok, Mára már csak azt sajnálom, hogy nem előbb találkoztam a Purrierrel!

LÁTÁSROMLÁS

#161

LÁTÁSROMLÁS

Richárd, férfi (34)

Kiindulási állapot:

Nagyjából az utóbbi 2-3 évben tapasztaltam jelentős romlást a jobb szememnél, hosszabb úton már folyamatosan könnyezett, este a táblákat már nem tudtam vele tisztán elolvasni, vagy akár otthon a projektor élességét beállítani.

Kb. 12 évvel ezelőtt az udvaron elcsúsztam és ráestem egy éles kőre, ezután valószínűleg a farokcsontom egyik darabja is leválhatott. Évekig egy nagyon érzékeny - fájó csomó volt a derekam és a hátsóm közt, ami az évek alatt csak annyit enyhült, hogy csak hosszabban rajta ülve kezdett sajogni, viszont ha pont ott valami hozzáért vagy beütöttem, rendkívül erős fájdalommal járt. A Purtier fogyasztását 2022 szeptemberében kezdtem el.



Adagolás:

2x1 db; 1 hét után 2x2;
2. doboztól 2x3; majd 2x2 db

Vízfogyasztás: 2-3 L

A kúra elején csak apróságokat észleltem, kisimult, puha lett a bőröm.

Kellemetlen mellékhatások nem jelentkeztek, csak sokszor nagyon fáradt voltam. Nagyjából az első hónap után kezdett észlelhetően javulni a látásom, ami azóta majdhogynem tökéletes. Amit még észrevettem, hogy 2.-3. hónap környékén nagyon erősen zsibbadt a jobb kezem, alig bírtam felemelni (fiatal korom óta motorozok és terepen többször ráestem), ez a zsibbadás 6-7 nap alatt elmúlt, a későbbiekben néha-néha jelentkezett pár óra erejéig, de mára elmondható, hogy teljesen regenerálódott.

Kb. 5 hónappal a kúra befejezése után csontkovácsnál voltam, aki „szét-nyomkodta” a derekam, akkor vettem észre, hogy abszolút nem fáj a farokcsontom meglehetősen erős nyomásra sem, valamint a csomó is eltűnt.

Rettentő sok energiám lett, gyakran hajnali 3-ig fent voltam, tanultam, olvastam, az ajándékba kapott extra időmben, majd 8-9 körül úgy ébredtem mintha 10 órát aludtam volna. Sokkal jobb a teherbírásom, valamint érezhetően jobb a hangulatom is köszönhetően a Purtiernek.

Kiindulási állapot:

A Purtiert prevenciósz céllal kezdtem el fogyasztani. Bíztam benne, hogy a látásom javulására is pozitív hatással lesz.

Kúra kezdete:

2022.december 16.

Adagolás:

2x1

A Purtier kezdetén az első amit észrevettem, hogy nagyon fáradt voltam, pihenést kívántam, szervezetem pedig az extra adag vizet. Úgy érzem szépen beindult a tisztulási folyamat, elkezdtem érezni a régi, problémás területeket, mint pl. bokaficam helye, derékfájás, vastagbél fájdalom, de egyik sem tartott sokáig.

Ami számomra nagy pozitívum:

- Egy ideje sokkal jobban, tisztábban és élesebben látok, nincs kiszáradva a szemem (kontaktlencsét hordok).
- A kozmetikusom szerint sokkal szebb és puhább a bőröm, csökkentek az apró hajszálerek mennyiségei az arcomon, szemem alatt feltöltődtek a pici mélyedések és a férjem szerint is nagyon fiatalos a külsőm.
- Az edzőm szerint fiatalokat megszégyenítő energiával rendelkezem a kardió edzés közben.
- Legutóbbi és legfrissebb tapasztalatom, hogy 24 óra alatt vonult rajtam végig egy olyan vírus, amiből mások 4-5 nap, vagy akár egy hét alatt épülnek fel.
- Sokkal hamarabb kipihenem magam, reggel kidob az ágy, energikusabban ébredek.
- Többen megjegyezték az ismerőseim közül, hogy mit csinálok magammal, mert sugározom.
- Ezek az eddigi tapasztalataim, nagyon meg vagyok elégedve a Purtierrel!

VÉRNYOMÁS PROBLÉMÁK

#165

MAGAS VÉRNYOMÁS

Attila, férfi (60)

Kiindulási állapot:

2017. márciusától magas vérnyomásom van.

A Purtiert 2022. szeptemberében kezdtem el használni.

Adagolás:

2x1

Az első héten jelentősen megnőtt az alvásigényem, majd ez megszűnt. Kezdetben elkezdett emelkedni a vérnyomásom, majd a hetek elteltével folyamatosan csökkenni kezdett. Mára 140/90-es értékeket mérnek. A 4. hónaptól a vérnyomásom csökkent, a 4 féle vérnyomáscsökkentő gyógyszerből 3-at elhagytam.

Időskori pigmentjeim elhalványodtak, illetve eltűntek a kézfejemről. Külsőm sokat változott, fiatalodtam.

#166

MAGAS VÉRNYOMÁS

Zsolt, férfi (50)

Kiindulási állapot:

Kb. 2 éve kezdődött emelkedés a vérnyomásomban, gyakran mért 150/80 körüli érték, melyet fejfájás és szédülés kísért. Ezenkívül 1,5-2 éve tartó kellemetlen, intenzív éjszakai izzadás, amely főleg tarkó tájékra lokalizálódott.

Adagolás: 2x1, 2x2
Vízfogyasztás: 2,5 L

A Purtiert 2022. augusztusában kezdtem el használni. Kúra kezdetén lassú javulást észleltem, nem voltak kellemetlen mellékhatások. A 3. hetétől kezdődően észleltem, hogy az éjszakai izzadások egyre ritkábbak, majd 5-6. héttől kezdődően teljesen megszűntek, és azóta sincsenek.

Vérnyomásom a 3. doboz szedésénél kezdett el javulni, és fokozatosan beállt a ma is mérhető 135/70 -es környéki tartományba.

Közérzetem jobb lett, energikusabb vagyok, nagyobb a teherbírásom.

MAGAS VÉRNYOMÁS

Emilia, nő (61)

Kiindulási állapot:

2021 decemberében 8-10 mmol/l éhgyomri vércukorszintet mértek, és évek óta magas vérnyomásom volt (néha 210-es).

2022 júliusában kezdtem el szedni a Purtiert.

Először a májam környékét éreztem érzékenynek, tüneteim felerősödtek, viszont a közérzetem jobb lett. Jelenleg az éhgyomri vércukor szintem stabilan 6-6,5 mmol/l., cukros diétát folytatok. 2022 szeptember végére a 210-es vérnyomásom 140-145-re stabilizálódott, ez által kiegyensúlyozottabbá váltam.

A sok éve tartó alkohol allergiám elmúlt. A külsőm megváltozott, kismult az arcom, a nyakamon lévő papillomák visszahúzódtak, darabszámuk csökkent.

A Purtier fogyasztása alatt folyamatos javulás mondható el, energikusabb vagyok, jókedvű és pozitív.



Adagolás:

1. hét: 2x3 db,
jelenleg napi 2x2 db

Kiindulási állapot:

Az én történetem úgy kezdődött, hogy 2019-ben magas vérnyomással és veseproblémával kerültem a sürgősségre. Innentől kezdve gyógyszeres kezelésre szorultam. Napi 2x1 vízhatós vérnyomáscsökkentőt kellett szednem. Aki szedett ilyet tudja, hogy milyen kellemetlenséget okoz. Vesémre is kaptam gyógyszeres kezelést. Közben a vesekövem elment s jobb lett, azonban néha még ezután is éreztem a szúrásokat.

A két Covid oltás után 2x voltam Cvidos. Ezt követően sorozatban jöttek a problémák: lábízületi problémák, láb dagadása, derékfájás, folyamatos gyengeség, egyre erősödő mellkasi szűrés, már kis mozgásnál folyamatos izzadás.

A láb dagadása, térd és boka fájdalmak miatt alig tudtam már menni (napi 2-3 ezres lépésszámaim voltak). Sokszor már délben haza kellett mennem pihenni.

2022. decemberben M. J. barátomnak köszönhetően találkoztam a PURTIER-rel. Ő hívta fel a figyelmemet, hogy van egy ilyen fantasztikus lehetőség. S el kezdtem szedni a terméket.

Adagolás: napi 2x1 kapszulát szedtem

Tapasztalatom a termékkel:

Egy kisebb megszakítással augusztusban végeztem a kúrával.

Eleinte nem sok vizet ittam, igazából a kúra közepétől tudtam elfogyasztani a napi 2 liter vizet.

Nekem így elég későn jöttek az eredmények.

Az első, amit márciusban észrevettem, elmúltak a gyomorsav problémáim. Így már azóta nem szedek savlekötőt. Igazából a kúra végére kezdtek jönni az eredmények:

- egyre kevésbé dagadt a lábam, elmúltak az ízületi fájdalmak
- 2023 októberében már egy kirándulás alkalmával 10-18 ezres lépésszámaim voltak. Azóta is naponta 8-9 ezres lépésszámaim vannak.
- 20 év után újra fel tudok ülni a biciklire és már 15-20 km-es távot is meg tudok tenni.
- A vérnyomásom már napi fél gyógyszertől is rendben van.

Igazából ami problémáim voltak mind eltűntek. Én nagyon sokat köszönhetek a Purtier-nek. Úgy érzem, mintha 15 évvel fiatalabb lennék. Köszönöm még egyszer a barátomnak és a Purtier-nek a segítséget.

Kiindulási állapot:

Gyerekkorom óta magas vérnyomással küzdöttem. Két szívrohamom volt 2003-ban és 2014-ben.

A férjem elvesztése után elkezdtem magammal foglalkozni, ekkor kerültem kapcsolatba a Purtierrel az unokatestvéremnek köszönhetően. A termék információs est után úgy döntöttem, hogy ez nekem kell.

A középiskolába kerülésem után rosszul lettem az iskolában, akkor mértek először 210/130-as vérnyomást. 3 hétig kórházban voltam, azóta gyógyszeres kezelés alatt állok. A kardiológus a Hypertonológiai osztályra küldött, mert csak ott írhatnak fel nekem gyógyszert. A legnagyobb változás ezen a téren jelentkezett először.

Adagolás:

Első héten csak 2x1 kapszulát, aztán 2. héten már 2 reggel és 1 este, 3. héttől 2x2,. Két dobozzal fogyasztottam úgy, hogy 2x3 szemet ettem a 6. generációs termékből. Utána el kezdtem szedni a 7. generációs terméket 2x1 kapszulával.

Tapasztalatom a Purtierrel:

A szedés megkezdése utáni két hétben mindig nagyon lement a vérnyomásom. (90/53) Le kellett feküdnöm. A vérnyomáscsökkentő gyógyszerek közül az egyiket megfelezttem, a másikat el kellett hagynom, amiből két szemet szedtem. Ha azt bevettem, jött a rosszullét.

2024.07.15-én kezdtem el szedni. A 3 fajta vérnyomáscsökkentő gyógyszerből már csak egyet szedek, abból is csak fél szemet. Nagyon szépen beállt a vérnyomásom. Ha véletlen megemelkedik, akkor is csak 130-140 magasságáig. Az első hónap eltelte utántól ilyen magas vérnyomást egyszer sem mértem.

A másik kellemetlen problémám a vizelettartási probléma. 15 évvel ezelőtt műtött meg emiatt nőgyógyász, semmi sem változott. Aztán jött a modernebb lézeres műtét. A nőgyógyász javasolta, biztos jó lesz. Az urológus nem javasolta, mert az inkontinencia idegi alapon van. Végül is 3-at csináltattam, ami fél szett Purtier ára volt, de semmi nem változott a műtétek után.

Nagyon figyeltem magam a szedés elkezdése után, és két hét alatt teljesen megszűnt ez a problémám, nagyon szépen helyrejött.

Az ujjaim is nagyon csúnyák voltak, meggörbültek. Most már gyönyörű szépen kiegyenesedtek, a kisujjam is odasimul a többihez. Ez szakmai ártalom, mert hentesként dolgoztam több, mint 40 évet. Ez az ízületeimen meg is látszik.

A térdeim is eldeformálódtak. 1-2 éve nem is tudtam kerékpározni, mert nem tudtam annyira behajlítani a térdem. Ez is szépen rendbe jött, most már akármennyit tudok biciklizni, utána sincs fájdalmam.

A 7. generációs terméket fogyasztom jelenleg. Az elején óvatosan kellett vele bánnom, mert nagyon felerősödtek az ízületi fájdalmaim, de ezek azóta elmúltak.

Köszönöm, hogy újra jól érzem magam a bőrömben.

MIGRÉN

#171

Kiindulási állapot:

2005-ben kezdődtek a súlyproblémáim. A többi folyamatosan követte. Mindhárom gyermekem születése után (2004, 2010, 2016) megmaradt 10 kg rajtam, amiből szinte semmit nem sikerült leadni. Átmenetileg néhány kiló lement, de vissza is jött egy idő után. A lábaim és kezeim folyamatosan vizesedtek, puffadtak voltak, anélkül hogy szívbeteg lettem volna. Családon belül volt súlyos cukorbetegség, van pajzsmirigy betegség, ezért szinte minden évben ellenőriztettem magam.

Egy ilyen ellenőrzés során derült ki, hogy az inzulinrezisztenciával van dolgom, mely diétázással rendben tartható. Minden olyan ételmiszert, ami nem volt engedélyezett számomra, eddig sem ettem, tehát elég nehéz volt változtatni az étkezési szokásaimon.

A Purtiert 2023. május 29 -én kezdtem el szedni.

Adagolás:

Az első 4 dobozt napi 2x2 kapszulával szedtem, majd emeltem az adagot 2x3 kapszulára.

Vízfogyasztás:

3-4 L, előtte viszont csak 1,5 L

Az első doboz beszedése után feltűnt, hogy már nemcsak akkor látom homályosan a betűket, amikor sokat dolgozom a gépen, hanem reggel is, amikor pihenten ébredek. Elő kellett vennem az olvasószemüveget. Ez a probléma az 5. doboz szedése közben kezdett megszűnni, most már minden betű tökéletesen látszik. Szemüveget csak kivételes esetben használok.

A térdproblémáim megakadályoztak a guggolásban, lépcsőzni is nehezemre esett. A harmadik doboz szedése közben javult a térdem kinézete, nem volt olyan vizesedet. Már könnyebben megy a lépcsőzés, nem fáj azóta sem.

Migrénesként a 4. doboz szedése közben tűnt fel, hogy nem fáj már a fejem, sőt az arcüreggyulladásom sem jött elő. A kúra megkezdése előtt a legkisebb fuallattól is azonnal begyulladt az arcom.

Súlycsökkenést egyenlőre nem tapasztalok, viszont a törzsem szépen formálódik, a "stresszhasam" kezd visszahúzódni.

Száraz bőröm kezd helyreállni, sokkal kevesebbszer kell krémet használnom. Az arcbőröm határozottan puhább, ráncaim simábbak. Még azok is észrevették az arcomon, illetve a törzsemen a változást, akik minden nap látnak.

A kapszula valószínűleg most a bal combomon dolgozik, mert ott érzek szúró fájdalmat. Jelenleg a 7. doboz tartalmát szedem, biztos vagyok benne, hogy utána is lesz még hatása.

Koncentráltabban tudok figyelni a feladataim elvégzésére, néha előfordul álmoság érzése, de kb. 5 perc alatt elillan, és mehet minden tovább. Lelkileg kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb vagyok.

Hangulatom, kedélyállapotom pozitív irányba mozdult. Sokkal "lazábban", vidámabban élem meg a mindennapjaimat.



A Purtier kapszulával 2023. március 20.-án találkoztam, amikor a férjem májbetegség miatt besárgult és magas vércukor értéket mértek nála. Az orvosok ide-oda küldték, mindenki felírt valamit, de segíteni nem tudtak. Számára vásároltuk meg először a terméket, amitől 2-3 nap múlva elmúlt a sárgasága.

Én kb. 1 héttel később kezdtem el a kúrát, mert +2-es olvasószemüvegem van. Műtétet helyre tudták volna hozni, de inkább maradtam a szemüvegnél, mivel nem hordom állandóan, a viselése elég macerás. Sokszor inkább elő sem veszem, de már nem elég hosszú a karom.

A Purtier szedésének 2. napján már jelentkeztek tünetek és azóta is folyamatosan érzem, attól függően éppen hol teszi a dolgát.

Adagolás:

2x1,2x2

Tapasztalataim:

2. nap: reggel éreztem, hogy történik valami a szívemben. Furcsa bizsergő érzés volt, nem fájt, nem szúrt, nem volt kellemetlen, inkább izgalmasnak mondanám.

3. nap: erős alhasi görcsökre ébredtem, ami pár perc után elmúlt (van 3 nyomám, ami nem okozott soha problémát, ezért az orvos nem javasolta a műtétet). Azóta is vissza-visszatér időnként, mindig pár percre.

Reggel ágyazás közben nagyon erősen beütöttem a könyökömet a szekrény sarkába, számoltam a csillagokat. Estére nyoma sem volt, a csontom egyszerűen nyomásra sem fájt.

Február elején kezdődött nálam a menopauza legkellemetlenebb tünete, a hőhullámok sokasága éjjel-nappal. 3. nap este tudatosult bennem, hogy amióta szedem a Purtier-t, egyetlen egyszer sem jelentkezett!

4. nap: a kapszula "megtalálta" az idegrendszeremet. Az egész testem remegett, kb. 2 napig folyamatosan. (Nagyon stresszes volt az elmúlt 8-10 hónapom, az idegrendszerem teljesen „padlón volt”, napi 2-3 óránál többet nem tudtam aludni éjszakánként.)

Délután ólmos fáradtság nehezedett rám, egyszerűen muszáj volt lefeküdnöm egy rövid időre.

5. nap: 12 éve nagyon nehezen kezelt teniszkönyök problémámat is fedezte. Erős fájdalmak jelentkeztek a jobb könyökömben néhány percre, aztán elmúlt. Ehhez a problémához azóta is többször visszatért, mindig pár percre.
6. nap: térdfájdalmak napközben. (Néhány hónapja kezdtem érezni időnként lépcsőzés közben, hogy fáj a térdem, és kattog.) Ez is néhány percre tartó, villámcsapásként megjelenő fájdalom volt, azóta is többször előfordult.
7. nap: éjszaka elkezdtek bizseregni a fogaim belülről, mintha hangyák mászkálnának benne. Nem a gyökérben, magukban a fogakban. Néhány héttel azelőtt kezdtem érezni egy régen tömött fogamat, azóta elmúlt a fájdalom, és nem is tért vissza.
2. hét: folyamatosan éreztem a szívem „cserélődését”, többször volt nehéz légzésem, 140 feletti pulzusom. Úgy éreztem, hogy kiugrik a szívem a mellkasomból. Bedagadt a jobb kezem és lábam, másnap egész nap nagyon rossz volt a közérzetem. Napközben fedeztem fel, hogy a jobb combomon az összes ér sötétvörös színben pompázva átlátszott a bőrömnön. Nem fájt, csak a látvány volt meglepő, majd 1-2 óra múlva megszűnt. Ezután elkezdődött a bizsergés a lábfejemben.
- 16 éves koromtól őszülök és 20 éve nincs egyetlen nem ősz hajszálam sem. Véletlenül vettem észre, hogy a homlokom tele van sötétbarna (az eredeti hajszínem) bébihajakkal. Láttam, hogy színeződik vissza sok-sok ősz hajszál, és mindenhol új fekete hajszálak vannak. Ami döbbenetes, hogy a 2. hét végén 1 cm-nél hosszabbak. Ez a folyamat azóta is tart, és egyetlen hajszálat sem találok a földön.
3. hét: folyamatosan éreztem, hogy az idegrendszeremen dolgozik, de 10 hónapja először egyik éjjel egyfolytában aludtam 5 órát, majd folyamatosan többet és többet. Rendszeresen visszatért a nagyon magas pulzus, de már csak rövidebb időszakokra.
- Hét elején - szerencsére ülő állapotban - történt, hogy belülről villámcsapást éreztem a bal térdkalácsom mögött, majd lezsibbadt az egész lábam, és gyakorlatilag megszűnt a láb érzetem térdtől lefelé. Kb. 5 percre tartott, utána pedig egész nap, mintha folyamatosan jeges levegőt fújnának a bal lábamra bokától lefelé, és hangyák mászkáltak a bal lábfejemben, és rendkívül felfokozott idegállapotba kerültem, borzalmas feszültség volt az egész testemben. Leülni nem tudtam, annyira túltengett bennem az energia.

4. hét: erős fejfájás napokon keresztül (korábban migrénes voltam).
Elkezdett égni a tüdőm napokon keresztül, mint amikor sokat futok.

A szemem olyan állapotba került, hogy sem szemüveggel, sem szemüveg nélkül nem látok tisztán, de volt olyan is, hogy egy fél újságot elolvastam, mire észrevettem, hogy nincs is rajtam szemüveg.

5. hét: felemeltem az adagot napi 2x2 kapszulára. Korábban nem bírtam volna elviselni a hatását a szívem és az idegrendszerem miatt, de tettem egy próbát, és nemhogy felerősítette az idegrendszeri történéseket, hanem szinte „zen” állapotba kerültem, azóta fát lehet hasogatni a hátamon.

Azóta folyamatosak az izomrángások a lábaimban. Ha lefekszem, sokszor bizseregnek a lábaim. A szememben érzek sokszor különös feszültséget. Időnként rövid nyilallásokat érzek a májamban, és nyomást jobb vese tájékon, valószínű a vese miatt időnként ödémás szemekkel ébredek. Most épp a méhemet érzem 2 napja. Nagyon erős, szinte menstruációs görcseim vannak, pedig tavaly nyár óta nem menstruálok.

Egyik éjszaka a sötétben belerúgtam valamibe, reggelre teljesen bedagadt és kékült a bokám előtti lágy rész. Kb. 3 nap után gyógyult be, ami egyébként lényegesen tovább szokott tartani.

Érdekes volt átélni, hogy az 1. héten a testem nem tudta követni az agyamat, a 2. héten az agyam a testemet, 3. héten pedig hajnali 1 órakor kint álltam a gangon, mert nemhogy elaludni, leülni sem tudtam, annyira feldobott állapotban voltam. Összességében a 3. héttől annyi energiám van, hogy sosem fogy el. Sokkal kevesebbet eszem, mert egyszerűen nincs szüksége a testemnek több energiára. Leginkább csak akkor kívánok enni, amikor valamit megkíván a testem. Megfigyeltem, hogy valószínűleg a megkívánt étel valamelyik összetevőjére van ilyenkor szüksége a szervezetnek. Pl., amikor leülni sem tudtam a felpörgött állapotomban, sört kívántam. Megittam egy egész dobozzal, de az alkohol része nem hatott egyáltalán, viszont 10 perc múlva teljesen lenyugodott a testem, ehhez valószínűleg a komlóra volt szüksége. Hetek óta falafel-en élek, csak azt kívánom. A csicseriborsóban sokféle B-vitamin van, magnézium, cink és vas. Valószínűleg ezek valamelyikére van épp szükségem.

Ami a legdöbbenetesebb hatás az esetemben, hogy miután elkezdtem jól aludni, a depresszióm és pánikrohamaim is megszűntek. Azóta fát lehet hasogatni a hátamon. Nem tudom, hol tartanék most a Purtier nélkül, mert a gyógyszeres kezelést (ezekre a tünetekre) teljes mértékben elutasítottam.

A történeteket én mindig nagy izgalommal fogadom. Bármí történik, még ha nagyon fáj is pár percig, megköszönöm, mert tudom, hogy értem történik.



NŐI PROBLÉMÁK

#179

DYSMENORRHEA

Ioana, nő (43)

Kiindulási állapot:

Régóta küzdök menstruációs fájdalmakkal, szorongással és álmatlansággal.

A Purtiert 2023 júniusában kezdtem el szedni.

Hatások:

- Sokkal jobb mentális állapot
- A menstruációs fájdalom teljes mértékű eltűnése
- Fokozott energia
- Jobb megjelenés



Az első napoktól kezdve úgy éreztem, tele vagyok energiával. Az alvásom jelentősen javult. Sokkal kipihentebb vagyok és végleg megszűntek a menstruációs fájdalmak.

Ami nagyon fontos még számomra, hogy a szorongásom is teljes mértékben megszűnt.

A körülöttem lévőek mind lelkileg, mind fizikailag pozitív változást észleltek.

Adagolás:
reggel 1 db,
este 1 db

MENSTRUÁCIÓS PROBLÉMA

Ivett, nő (46)

Kiindulási állapot:

Kb. 15 év óta a menstruációm egy 1 napos fejfájás és hányás kísérte. Ez a probléma 2 éve odáig fajult, hogy a fejfájás és a hányás 2 napig tartott. Ilyenkor semmit sem tudtam csinálni, csak feküdtem, aludtam, fájt a fejem és időnként hánytam.

Emellett évek óta ekcémás volt a fejbőröm, ami nagyon megviselt. Amikor nem ettem semmit, amiben laktóz és cukor volt, akkor kicsit jobb lett, de hiába próbáltam a laktóz és a cukor elhagyásán kívül bármit, nem múlt el tőle a fájdalom és a viszketés.

A 3. problémám pedig az volt, hogy nagyon fájt a szemgolyóm. Nem a látásommal volt gondom, hanem erős nyomás érzés volt a szemgolyóban és egy komoly fájdalom.

Tehetetlennek éreztem magam, mert szedtem vitaminokat és táplálékkiegészítőket, de az állapotom az idő előrehaladtával fokozatosan romlott.

Adagolás: napi 2X1 kapszula

Vízfogyasztás: 1,5 liter

Tapasztalatom a termékkel:

Ekkor ismertem meg a Purtiert és tudtam, hogy ez segíteni fog rajtam. 2X1 kapszulát szedtem. Az első 2 hétben sokat aludtam. Többször éreztem, hogy nagyon fájt a szemgolyóm, de örültem is neki, mert tudtam, hogy dolgozik a kapszula rajta. Ez a fájdalom pár nap múlva elmúlt és utána már nem fájt a szemem.

A 3. hétnél azt éreztem amikor felébredtem, hogy nagyon éhes vagyok. Utoljára ilyen fajta éhséget gyerekkoromban éreztem. Meg is lepődtem, mert arra nem is gondoltam, hogy a reflux-szomat is el fogja mulasztani. Ez egy ajándék hatás volt a Purtiertől. A következő reggel szintén arra ébredtem, hogy nagyon éhes vagyok és ez egészen délig tartott.



Onnantól kezdve pedig elmúlt a refluxom. Kimondhatatlanul hálás vagyok emiatt.

A 4. doboznál történt meg az a csoda, hogy a menstruáció alatt semmi tünetem nem volt. Nem fájt a hasam, sem a fejem és nem is hánytam. A férjem örült ennek a legjobban, mert nehéz volt neki végignézni minden hónapban, hogy mit szenvedek.

A kúra legvégénél tapasztaltam, hogy elmúlt a fejbőrömről az ekcéma. Szép fokozatosan múlt el, úgyhogy szinte észre sem vettem.

Olyan dolgokat is hozott a Purrier, amikről nem is álmodtam. 18 éves koromtól kezdve sokat dolgoztam számítógéppel, ezért többször volt a csuklómban és a kezemben ízületi gyulladás. Az 1. doboz szedése alatt éreztem, hogy a kezujjaim csontjai és az egész kezem újjáépül. Különleges érzés volt. Azóta megfiatalodott a kezem és nincs vele semmi gondom.

A felszívódásom sokkal jobb lett. Lényegesebben kevesebbet kellennem és a vitaminokból is kevesebb kell, mert egyszerűen kevesebbrel is sokkal jobban érzem magam, mint korábban bármikor.

Mindig is problémát okozott, hogy éjjel 3-4-szer felébredtem és ki kellett mennem a mosdóba. Ráadásul eléggé éberem aludtam. Ez a kúra végére teljesen megszűnt. Most már csak 1-szer megyek ki és nagyon mélyen alszom. Teljesen megváltozott az alvásom minősége, amire nem is gondoltam, hogy lehetséges.

2018 eleje óta a vádlimban fájtak az erek. Akkoriban ajánlottak egy elég drága táplálékkiegészítőt, amit azóta is rendszeresen fogyasztottam és azzal elértem, hogy nem fájtak az ereim. A kúra felénél arra gondoltam, hogy akár abba is hagyhatnám a másik táplálékkiegészítőnek a szedését, amit meg is tettem. Figyeltem, hogy mi történik. Legnagyobb örömömre már nem fájtak az ereim és nagyon boldog vagyok, hogy ez a problémám is elmúlt. A bőröm is megfiatalodott.

Összességében azt érzem, hogy legalább 8 évet fiatalodtam és sokkal vidámabb vagyok.

POSZT-COVID

#183

Kiindulási állapot:

poszt-covid tüneteim voltak az elmúlt nyáron (2022). Heteken át nagyon gyenge voltam, és kínzó köhögésem volt, amit az orvosi kezelések sem csillapítottak.

2023. novembertől fogyasztom a Purtiert.

Adagolás:

2x1 kapszula.

Folyadékbevitel:

2,5 L víz



A kapszula elkezdését követő napokban azonnal visszatért az erőm, ami 2022 nyarán hetekig hiányzott a testemből. A permanensen jelen lévő fájdalmas köhögés kettő hét alatt teljesen megszűnt, és máig sem tért vissza.

A bal térdem fájdalma, merevsége megszűnt, újra edzőterembe járok heti 2 alkalommal. A terhelést jól bírom, rugalmas és fájdalommentes a testem. Egy teljes év kihagyás után az edzőnek is feltűnt a jó kondícióm.

2023. szeptember 4-én indultam el az El Camino Francés útra. Különböző felkészülés nélkül vágtam neki a közel 600 km-es útnak. Végül összesen 580 km-t sétáltam 27 napon át. Ezen időtartam alatt egyszer sem fájt a testem, még csak izomlázam sem volt. Az izomzatom, az ízületeim mind-mind könnyedén, és olajozottan működtek.

Amit még fontosnak tartok megemlíteni a száraz bőröm hidratált, szinte alig használok testápolót. A masszőr is visszajelezte a testem izomzatának, és bőrének jó állapotát.

Családi nehézségeket jól tolerálom, így az a tapasztalatom, hogy az idegrendszer és a mentális egészséget is támogatja a Purtier, amiért én nagyon hálás vagyok!

PREVENCIÓ

#185

2022 augusztus végén kezdtem el szedni a Purtiert. Gyógyszert nem szedek, alternatív megoldást preferálok fájdalom esetén is.

Az energiaszintemen és a teljesítőképességemen vettem észre először a kapszula hatását. Sokkal többet tudok dolgozni, kiegyensúlyozottabb vagyok. Négy hónap után besűrűsödött a hajam és lassan sötétedik is.

Előjöttek több évtizedes, már régen meggyógyult problémák, pl. a bal térdemnél. Egy héten keresztül alig bírtam rálépni, aztán egyszerre teljesen helyrejött és azóta sem fáj.

Hasonló történt a szememmel is. Kb. 5 napig homályosan láttam, azután pedig élesebb lett a látásom, mint valaha.

A gyerekkoromban sok diszkózás miatt (munka) kialakult hallásvesztés sokat javult.

Az elmúlt 3 hónapban (2023 július) életmódot váltottam, fogytam 8 kg-ot.

További tapasztalat a családomból:

Nővérem, Erzsébet Szerbiában él. Sajnos daganatos megbetegedése volt és a műtét után kemoterápiás kezelést kapott. Egész végig szinte következmények nélkül viselte a kemoterápia mellékhatásait. A család azt látta, hogy lelkiileg nagyon megtámogatta a gyógyulását a Purtier. Köszöni szépen, most már egészen jól érzi magát és nagy jövőképpel rendelkezik újra.



Adagolás:
2x1 db
(reggel és délután)

Kiindulási állapot:

Hajam ritkult. Bal szememre, már csak homályosan láttam. Állandó foggyulladástól szenvedtem. Rekeszizom sérvem már akkora volt, mint egy nagyobb dió, ami állandó fájdalommal járt. Jobb kezemen lévő mutató ujjamat egy fűnyíró csontig szétvágta, ami miatt érzéketlen lett. Értágulat a herében, ami akkora volt, hogy műtét lett volna indokolt.

Felfázás, húgyhólyag gyulladással, amit többszöri antibiotikum kezelése sem tudtak elmulasztani. Visszér probléma, lábujjak zsibbadása, derékfájdalom.

Adagolás: napi 2x2 kapszula

Tapasztalatom a termékkel:

2023.12.18.-án kezdtem el szedni a 6. generációs Purtiert reggel 2 és este 2 szemmel. Az első héten az emésztőrendszeremet tisztította meg. A következő, amit tapasztaltam az elkövetkező héten, hogy nagyon mélyen aludtam. Majd visszajöttek a lábujjam és a mutató ujjam teljes érzékelései. Elmúlt a foggyulladásom és a visszerem kevésbé látható.

A második hónaptól elmúlt a rendszeres derékfájásom és itt már nem fájt a húgyhólyagom sem. A harmadik hónapban már észrevehető volt, hogy a hajam sokkal sűrűbb és sokkal élesebben látok.

A rekeszizom sérvem lényegesen kisebb. A herékben lévő értágulat megszűnt.

Ajándék hatás:

A potenciálom, olyan, mint 20 éves koromban! :) A bőröm sokkal fesesebb. A ráncaim eltűntek.



Kiindulási állapot:

Emésztési problémáim voltak, ezen kívül prevencióból kezdtem el a Purtiert szedni.

Purtiert használatának kezdete:

2023 május

Már az első napon észrevettem, hogy a gyerekkoromban bőrfocival betört orrcsonton dolgozik. Kis görbület volt az orromon, ami pár nap alatt eltűnt. Szinte hihetetlen volt számomra, hogy pont ezt regenerálta először.

Már az első napon feltűnt, hogy jobb lett a kedvem a további napokon pedig, hogy nem halogattam a dolgok elvégzését, ahogy kigondoltam, már meg is csináltam a feladatokat.

Előfordult a változó hangulat, de csak max fél óráig tartott.

Hamar megtalálta a bal bokám. Huszonevéves koromban többször is kiment a helyéről (miközben a lányomat tanítottam kerékpározni), bal lábfejtől a sípcsont mellett a lábszár közepig nem állandó jelleggel, de napközben és este mindig fájt, mindez egészen 13. napig, de itt mintha elvágták volna, megszűnt a fájdalom és azóta sem fáj.

Azonnal elkezdődött a méregtelenítés is, ami azt eredményezte, hogy már az első héten 6 kg-ot fogytam és az emésztésem is teljesen rendbe jött.

Az erőnléti változást a 10. napon már éreztem, az addig nagyon nehéznek talált tárgyakat már könnyedén fel tudtam emelni.

Jól érzem magam és újra energikus vagyok köszönhetően a Purtier-nek.



Adagolás:
2x1 db éhgyomorra
Vízfogyasztás: 2 L

Kiindulási állapot:

2022. októberében kezdtem el szedni a Purtiert megelőzés céljából.

A kúra első időszakában megnövekedett az alvásigényem és a múltbeli sérüléseim helyein felerősödő fájdalom volt tapasztalható. Majd kis idő elteltével sokkal energikusabb lettem és a 45 éve szerzett kézsérülésem is teljesen regenerálódott.

A 8 éve meglévő váll panaszom rendbe jött, az időszakos jobb térdfájásom megszűnt.

A bőröm a kúra előtti ápoltságából egy megújult állapotba került. Mentális állapotom kiegyensúlyozottá vált és az ismerőseimtől is rengeteg pozitív visszajelzést kapok ezekkel kapcsolatban.



Adagolás: 2x2 db
Vízfogyasztás: 2,5 L

Kiindulási állapot:

Cirka 50 évet töltöttem el a magyar labdarúgásban, melynek következménye három gerincsérv és rengeteg műtét a virgácsaimon.

2020 májusában jutottam hozzá a PURTIER termékhez.

Adagolás:

Mivel a fogyasztásról, az adagolásról csak annyit tudtunk, hogy együk meg amilyen gyorsan csak tudjuk, ezért én kísérleteztem magamon. Fokozatosan emeltem a napi fogyasztást. Volt amikor már eljutottam oda, hogy napi 16 kapszulát ettem.



A hét dobozt tartalmazó kúrából már hármat elfogyasztottam, amikor a mellékelt fotót készítettük. A külső változás megdöbbentő! DE, akkor mi történhet a „színfalak” mögött, a szervezetben? Mit is éreztem?

Lábaimban hangya foci. Idősebbek még emlékeznek, amikor hétfőnként még nem volt adás a TV-ben (70-es évek), a képernyő „zizegett, pezsgett”. Azt neveztük „hangya focinak”. Na, én ezt éreztem mindkét lábamban éjjel-nappal! Hol dolgozott a termék? Valószínűleg az ereimben, az ereimen. Ez az érzés végig kísért az egész kúrán.

Mivel néha úgy éreztem, hogy nagyon felerősített különböző tüneteket a Purtier szedése, ezért voltak időszakok, amikor visszavettem az adagolást. Érezhetően a legjobban megélt hatás számomra az volt, hogy a fizikai terhelhetőségem óriási mértékben megugrott! Mit is jelent ez az én mindennapjaimban?

PURTIER előtt heti egy profi lábtenisz mérkőzés után egy hét regenerációra volt szüksége a szervezetemnek. A Purtier fogyasztása közben és azóta is heti 2-3 lábtenisz mérkőzésen veszek részt és a regenerációm azonnali.

Kiváló a közérzetem, nagy a strapabírásom. Már 2 kúrát elfogyasztottam időközben, s számomra az ismerőseim és barátaim pozitív visszajelzései lelket simogatóak. „Lacikám, de jól nézel ki!” És ez igaz is!

Mindenkinek csak ajánlani tudom!

Kiindulási állapot:

6 évvel ezelőtt egy nagy baleset után alakult ki a BPPV (Vertigo) forgó jellegű szédülés, ami sokszor nehezítette a mindennapjaimat.

Váratlanul és hirtelen kezdődött, majd napokig - hetekig - hónapokig is tartott.

Kúra kezdetének időpontja:

2023. december

**Tapasztalatom a termékkel:**

Betegség megelőzés céljából kezdtem el fogyasztani a Purtiert, 6 hónapja.

A Purtier kapszula szedése után 3 nappal elmúlt a szédülés, és nem tért vissza!

Kb. 3 hónap után normalizálódott a vérnyomásom, megszűnt a szívritmuszavarom és a kezdődő refluxnak is nyoma veszett.

Nagyon energikus lettem, mély és pihentető az alvásom, csökkennek a ráncaim és színesedik az ősz hajam.

Többen megjegyezték a környezetemben, hogy megfiatalodtam.

Köszönöm Purtier.

SÉRÜLÉSEK

#193

Kiindulási állapot:

2022. áprilisában lábszártörést szenvedtem. Életfunkcióim lelassultak, érdektelenség fogott el minden iránt, romlott a hallásom, étvágytalan voltam, depresszióhoz közeli állapotba kerültem.

2022. októberében kezdtem el szedni a Purtiert.

Adagolás:

Kezdetben 2x1, majd megemelttem napi 2x2-re.

Már a 3. héttől a kedélyállapotom változott, érdeklődést mutattam a külvilág iránt. Újra elkezdtem többet mozogni, sétálni. 4. hónap végére a lábszártörés kb. 25 cm-es hege elhalványult, a heg teljesen belesimult a bőr vonalaiba.

Az inkontinenciám teljesen elmúlt. Amit még észrevettem mára már ritkábban használok hallókészüléket, köszönhetően a hallásom javulásának. Hétről-hétre javult a közérzetem, vidám, jókedvű és fáradhatatlan lettem, és ezt a környezetem is észreveszi.

Jól érzem magam, köszönhetően a Purtiernek.

BICEPSZ SZAKADÁS

Norbert, férfi (47)

Kiindulási állapot:

Tavaly decemberben leszakadt a bicepszem. Komolyabb betegségem nem volt, csak a jobb szememen volt fátyolos a látásom, viszont időszakos szívritmuszavart is diagnosztizáltak már régebben (pitvarfibrilláció).

Purtier szedésének kezdete:

2022.12.06.

Adagolás:

Napi 1x2, 3. nap után 2x2, később napi 2x3-ra felvittem (próbaként), ezt két napig bírtam, mivel olyan erős fájdalom jött az érintett végtagon, hogy a legerősebb fájdalomcsillapító sem hatott (Xilox), így visszavettem napi 4-re.

Megműtöttek még decemberben a műtét jól sikerült, de az orvos szerint hosszú gyógyulás várt rám. Három hónap múlva volt várható, hogy a karomat újra ki tudom nyújtani (de ezt is csak rehabilitációt követően, mondta az orvos).

A műtét után két nappal már szedtem a Purtier -t, melynek köszönhetően egy hónappal a műtét után a karomat kinyújtottam és folyamatosan terheltem (50 kg-os zsákokat emeltem a műtött karommal), természetesen mindezt rehabilitáció nélkül. Az orvos meglepetten látta a kontroll vizsgálaton, hogy a sérülés milyen hamar regenerálódott, amit a Purtier-nek tudott be.

Amit még fontosnak tartok a termék szedése óta nem érzektem szívritmuszavart sem.


Folyadékbevitel: 3 liter víz

Tele vagyok energiával, jó a munkabírásom, jobb mint valaha. Rengeteget dolgozom és élvezem a lovaim társaságát.

Fogytam, külsőm teljesen megváltozott természetesen pozitív irányba. Közérzetem is nagyon jó és a fátyolos látásom is eltűnt.

Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok!





Zárójelentés: 2022.12.15

VÁRÓSEBES SZAKELLÁTÁS ZÁR

Traumatológia I. (TV.)

ANTEK kód: 070120325

Beteg neve.....		KBA.....	
Leánykori név.....		Esetszám..:	
Születési dátum.....		TAJ.....:	
Anyja neve.....		Naplószám:	
Lakcím.....		Térítési kategória: 1	
Felvételi dátum..... 2022.12.15 12:27		Bek.napl/tsz.:62019182	
Beküldő.....	Sürgősségi Trauma O/A		

Anamnézis

12.01-én szabadidejében esés közben oszlopba kapaszkodott bal kezével, közben könyökhajlatában csattanást észlelt. Bal oldali biceps szakadása miatt előkészítést követően 12.06-án biceps inreinserciót végeztünk

Jelen panaszok

Érdemi panasza nincs.

Dekurzus

St: Műtési terület rendben. Sebei pp. gyógyultak. Biceps in jó tap.. funkció megtartott. Érzés, keringés zavar a végtagon nincs.

Kartartó további viselése jav. még 2 hétig.
10x gyógytorna 01.02.-től megkezdhető.

Kontr. kezelések után hétfői napon 8-10 óra között. előjegyzés alapján.

Diagnózis

S4610 Rupt.tend.dist.bicipitis.l.s.
X59H0 K.m.n. tényezők által okozott sérülés

2022.12.15

Táppénz igénye esetén 24 órán belül keresse fel háziorvosát!
Előjegyzéssel kapcsolatos információk: www.fmkorhaz.hu; az Ön azonosítója: 00000331600

Medisolution
Beteg erőforrás foglaltságai

Beteg neve :
TAJ :
Születési idő:

Dátum	Kezd.	Vége	Erőf.t.	Erőf.kód	Erőforrás megnevezés	Felh.t
Megjegyzés						
2023.01.18	12:30	13:00	GYTORNA2	05	05	30
melegítő, póló, papucs						
lepedő						
2023.01.19	12:30	13:00	GYTORNA2	05	05	30
melegítő, póló, papucs						
lepedő						
2023.01.20	12:30	13:00	GYTORNA2	05	05	30
melegítő, póló, papucs						
lepedő						
2023.01.23	12:30	13:00	GYTORNA2	05	05	30
melegítő, póló, papucs						
lepedő						
2023.01.24	12:30	13:00	GYTORNA2	05	05	30
melegítő, póló, papucs						
lepedő						
2023.01.25	12:30	13:00	GYTORNA2	05	05	30
melegítő, póló, papucs						
lepedő						
2023.01.26	12:30	13:00	GYTORNA2	05	05	30
melegítő, póló, papucs						
lepedő						
2023.01.27	12:30	13:00	GYTORNA2	05	05	30
melegítő, póló, papucs						
lepedő						
2023.01.30	12:30	13:00	GYTORNA2	05	05	30
melegítő, póló, papucs						
lepedő						
2023.01.31	12:30	13:00	GYTORNA2	05	05	30
melegítő, póló, papucs						
lepedő						

#197

2023.01.18-án
kezdődik a gyógytorna,
akkor lehet elkezdeni
az izmok lassú
nyújtását, hogy pár
hónap alatt a kar
kiegyenesedjen.

Kiindulási állapot:

2024. március 31-én egy ázsiai úton a legelső napon kibicsaklott a bokám. Ott nem mentem el orvoshoz, bedagadt, bekékült, azt gondoltam, hogy megrándult. Egész ottlétünk alatt papucsban ugyan, de minden programon, kiránduláson részt vettem. Volt olyan nap, hogy 12.000 lépést tettünk.

Adagolás:

utazás alatt naponta 2-szer 2-3 kapszulát vettem be, itthon napi 2-szer 1 kapszulát szedtem. Nekem ez már a 7. doboz kapszula volt, mert 2023 októberében kezdtem a kúrát.

Tapasztalatom a termékkel:

1 hét után mikor hazajöttünk, akkor mentem el orvoshoz. Röntgen kimutatta, hogy el van törve a lábam. Egy hét fekvőgipszet kaptam, de akkor sem pihentem, dolgoztam közben, jöttem-mentem. Fájdalmat nem éreztem.

Mikor levették a fekvőgipszet, 2 nap múlva elutaztunk Olaszországba, Pisa-ba, ahol egy egész napot kirándultunk, várost néztünk. Egy nap alatt 23.000 lépést tettünk meg. Pont aznap volt 2 hetes törött a lábam.

Folyamatosan jártam kontrollra, ahol az orvos mindig mondta, hogy nagyon szép, és gyorsan gyógyul a lábam, pláne, hogy egyáltalán nem pihentetem. A rögzítőcsizmát a fekvőgipsz után két és fél hétig hordtam. Utolsó kontroll a baleset után a 6. héten volt. A rögzítőcsizmát hivatalosan is levehettem, és többet nem kell kontroll vizsgálatra mennem. A baleset utáni 6. héten lakodalomban voltunk, az éjszakát végig táncoltam.

Összességében elmondható, hogy a gyógyulást, csontosodást felgyorsította a PURTIER.





CSONT- ÉS CSIGOLYATÖRÉS

Sándor, férfi (50)

Kiindulási állapot: 2020. augusztusában súlyos motoros közlekedési baleset, többszörös csont és csigolyatörés, sajnos a gerincvelő is megsérült. Sok, hosszú műtét, vasalás, lemezelés. 2 év alatt nem tudott összeformni a sípcsontom, a velőúrszeg és a szárkapocs csont kitámasztott, állízület alakult ki. A komplikált újabb műtéttől tartva (mely láb rövidüléssel is járt volna) egy barátom ajánlására elkezdtem a Pur-tier-t szedni, mondván annyi mindent kipróbáltam már „Több is veszett Mohácsnál”, mi bajom lehet?



Kúra időtartama:

kezdet: 2022.05.17., vége 2022.08.15.

Adagolás: 1-1-től 3-3-ig naponta, így viszonylag gyorsan fogyott.

#200



Tapasztalat: Szokatlan volt a kötelező sok (2-3L) víz naponta. Fájdalmaim nem voltak –a gerincvelő sérülés miatt folyamatosan zsibbad a bal lábam-, érzéskimaradás és a reflex hiánya kísért-kísér a baleset óta, így fokozatosan emeltem a dózist. Soron következő kontrollon az állapot változatlansága miatt felfúrásos velőűrszegezést javasolt az orvosom.



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Traumatológiai szakrendelés I. BAZ
osztályvezető főorvos

OEP KÖT
Tel.:

JÁRÓBETEG VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ

Név:	Sándor Csaba (I.n.:)	Sorszám:	
Születési hely, idő:	(48 éves)	Naplószám:	
Anyja neve:		TAJ:	
Lakcím:		Vizsgálat ideje:	2022.03.28. 11:04

EGYEDI AZONOSÍTÓ JEL:

Beküldő intézet: Traumatológiai szakrendelés I. BAZ
Beküldő orvos:
Bemutató Dg.: A combcsont distalis törése S7240

Bő 1,5 éves Poli-traumatisatio utáni állapot, tibia condylus törése támasztólemezzel, femur és peritroch. törése hosszú PFN A (titan)-al rögzítve. Gerinctörése stabilizálva. Jobb oldali tibia condylus törése támasztó lemez és csavarral jól rögzült, törés még halványan látható. Bal basocervicalis törése és femur törése hosszú PFNA jó helyzetben rögzült, a törések sejtethetők. A bal tibia törése expert szeg jó helyzetben rögzült, törésben álliszület látható, melynek gyógyulása kétséges mivel a fibula kitámaszt. Egyenlőre módszerváltást nem kér. 2-3 hónap múlva kérdésre visszatérünk bal oldali lábszár velőűr felfúrással.

Vizsgálatok:

11301 Kontrollvizsgálat, konzílium
94640 Izület mobilizálás
94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül

Megállapított Diagnózis:

S7240 A combcsont distalis törése
S7230 A combcsont testének törése
S8210 A sípcsont proximális végének törése
V99H0 Közlekedés baleset, k.m.n.

050225112 Sürgősségi Röntgen 2022.03.28. 11:06 [1] Röntgenfelvétel

A beteg nyilatkozott arról, hogy aktív COVID-19 vírusfertőzésre utaló tünetei, panaszai, jelenségek és tudomása szerint a családjában, környezetében sincs aktív COVID-19 vírusfertőzött személy.

2022. március 28.

főorvos

vizsgáló orvos

A beteg adatainak ellenőrzése igazolványok alapján történt: ☐ bemondás alapján történt: ☐

Tisztelt Betegünk! Az adatkezelés biztonsága érdekében kérjük ellenőrizze személyi adatait!
Amennyiben helytelen adatot talál, kérjük jelezze az Önt ellátó munkahelyen!

Lelet státusza: Elvégzés alatt 1 / 2 Nyomtatva: 2022.03.28. 12:48
E-MK 2020-6/21

Mondanom se kell, mennyire keseredtem el, hiszen én szedem a Pur-tier-t! Alföldi parasztyerek lévén azonban ha már pénzt adtam valamiért, azt megeszem! Folytattam a szedését emelt dózissal. Aztán 2022.11.14-én elérkezett a műtét ideje. A szokásos röntgen után jött az értékelés, miszerint a felület $\frac{3}{4}$ -e átépült (csontosodott). Az doktor jelezte, hogy ez orvosilag nem magyarázható! Először könny csordult a bal szememből, majd a jobból is...

Volt néhány hobbym a baleset előtt: lovaglás, motorozás, repülés, vadászat és a néptánc, amelyek igen leredukálódtak. A bal lábam érzéskimaradása, zsibbadása továbbra is fennáll. Idén (2024.) azonban már egy tánc-táborot végigtáncoltam!!! Én nem várom a csodát, velem már megtörtént!

Sándor Csaba, Vizsgálat ideje: 2022.11.14. 09:45

 **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház**
Traumatológiai szakrendelés I. BAZ
származó orvos

OEP KÓD:

JÁRÓBETEG VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ

Név:	Sándor Csaba	Sorszám:	
Születési hely, idő:	(48 éves)	Naplószám:	
Anyja neve:		TAJ:	
Lakcím:		Vizsgálat ideje:	2022.11.14. 09:45


EGYEDI AZONOSÍTÓ JEL:
Beküldő intézet: Traumatológiai szakrendelés I. BAZ
Beküldő orvos:
Beutaló Dg.: A lábszár k.m.n. részének törése S8290

Anamnézis/Status: 27 hónapos polytraumatizált jobb térd laterál LCP lemez műtéti terület rendben. Bal oldali femur törése előszaggal rögzítve. Lábszártörése expert szöggel rögzítve. Co. röntgen gerinctörését rögzítő rudazatok jó helyzetben. Öh. csípő felvételen arthrosis nem látható. Tumor felett a csőcs kiállón rögzült. A PFNA long jó helyzetben, darabos femur törése gyógyult. Petrochanter törése csak sejtethető. Bal lábszártörését expert szög jó helyzetben rögzíti. Korábban észlelt állízület csak nem átépült.

Megállapított Diagnózis:
S8290 A lábszár k.m.n. részének törése
Y86H0 Egyéb balesetek következményei

Vizsgálatok:
11301 Kontrollvizsgálat, konzilium
94640 Izület mobilizálás

Javasolt: 2023. tavaszán egyeztetés a TIBIA lemez eltávolítása céljából.
Miskolc, 2022. november 14.


050514
vizsgáló orvos

Hozzájáruló írás: Igen Nem Nem szükséges
A megfellelő aláírás: ☐ Igen (Kinek mikor:) Nem szükséges
A beteg adatainak ellenőrzése: igazolások alapján történt: ☐ benmondás alapján történt: ☐
(A dokumentumot a MedWorkS rendszerben rögzítette: Kalász Klára Nelli M01102)

Kiindulási állapot:

2023.04.20-án szenvedtem munkahelyi balesetet. Elszakadt a bal karomban az alsó bicepsz tartó ín. 2023.május 11-én megműtöttek és a műtétől számítva 3 hónap teljes emelés tiltást kaptam. Ha kinyújtottam a bal karomat, csak úgy tudtam behajlítani, hogy a másik kezemmel segítetttem.

2023 július végén hallottam először egy kedves ismerősömtől, hogy létezik egy termék, ami drasztikusan lerövidíti az egy-másfél évig tartó regenerációt. Szerencsémre pár nappal később részt tudtam venni egy élő tájékoztatón. Egyből tudtam, hogy erre szükségem van!

Adagolás:

Első hónapban napi 2x1 kapszulát szedtem. Második-harmadik hónapban 2x2 kapszulát, negyedik- és ötödik hónapban újra 2x1 kapszulát ettem.

Tapasztalatom a termékkel:

Az első, amit tapasztaltam, hogy a karomban lévő állandó fájdalom megszűnt. A 3. kapszula után 2. éjszaka arra ébredtem, hogy nagyon szomjas vagyok. Megittam fél liter vizet, és 15 percen át csak köhögtem fel a tüdőmből a lerakódást. Ezután éreztem pár napos tisztulási folyamatot a bélrendszeremen is. 2023. augusztusában lejárt a 3. hónap emelés tiltás. A házi orvosom 10 alkalmas fizioterápiát javasolt. Ez gyógytornát, elektromos izomstimulációt és óvatos masszázst tartalmazott. A 3. alkalomnál a gyógytornásznő javasolta, hogy kezdjem el edzeni a bal bicepszemet a leggyengébb gumiszalaggal vagy fél literes vizes palackkal. Ez volt az utolsó alkalom, amikor ott jártam, mert én már az ezt megelőző napokban húzódkodás- és fekvőtámasz gyakorlatokkal elkezdtem erősíteni a bicepszemet. Az első doboz Purrier végénél már úgy éreztem magam, mintha az egész testem ugyanúgy működne, mint a baleset előtt. A második hónaptól olyan váratlan javulást tapasztaltam fizikailag, mentálisan és érzelmileg, amit korábban soha. Megszűntek a dohányzással és Covid oltással kapcsolatos félelmeim. Úgy éreztem/érezem magam, mint 20 évesen. Megszűnt a lustaság. Fáradhatatlannak érzem magam, a terhelhetőségem és a teljesítményem is jobb, mint valaha. Boldog vagyok.

A sérülésemen kívül a 4-5. hónapban éreztem, ahogy dolgozik a vesém, a szívemen és a prosztatámon is. Megszűnt egy 12 éves lumbális problémám, az ízületeim sem kattognak, ropognak. A kopaszodásom is visszafordult, elkezdett nőni és sűrűsödni a hajam. Magasságom is megváltozott, nőttem 3 cm-t!

Sokkal nyugodtabb és fókuszáltabb vagyok a mindennapokban. Az életerőm és életkedvem is folyamatosan 100%. Könnyebben veszem a kihívásokat, és kezelem a stresszhelyzeteket.

Az első kúra elfogyasztása óta nem voltam beteg. Se nátha, se influenza.

A bőröm megfiatalodott, a régi hegek halványodnak. A látásom élesedett, az orrsövény ferdülés már nem okoz gondot. Az étrendem is átalakult, nagyjából a felére csökkent a bevitt napi ételmennyiség, a víz fogyasztásom is megemelkedett napi 3 literre.

A sportról a sérülés ellenére sem kell lemondanom, gyorsabb, erősebb és energikusabb vagyok.

A kapszula szedését nem hagytam abba, a mai napig fogyasztom. Mindenkinek szívből ajánlom ezt a terméket!

SZÍVPROBLÉMÁK

#205

Kiindulási állapot:

Éjszaka rosszul érezte magát (mintha kihagyna a szíve) diszkomfort érzése volt, halálféleleme, ami ájuláshoz vezetett.

Gyerekkora óta aktívan, napi szinten sportol. Két covid elleni oltást kapott.

Miután éjszaka rosszul lett (elájult), másnap elment orvoshoz. A kivizsgálás után az orvos megállapította az arrhythmia/ szívritmuszavart.

Másnap elkezdte (2023. február) a Purtier szedését.

Adagolás:

Napi 1, aztán 2 és utána 2x2. A 4. naptól végig ugyanazzal az adagolással.

Folyadék:

3-4 liter között

Néhány hét múlva eltűnt a diszkomfort érzése, viszont még néha érezte, hogy kihagy a szíve.

Ez az állapot a 4. hónapra teljesen eltűnt, az orvos megállapította a kontroll vizsgálaton, hogy az arrhythmia megszűnt.

Újra sportol, fokozatosan terheli a szervezetét kerékpározás (30km), kosárlabda.

Nagyon jól érzi magát köszönhetően a Purtiernek!

Kiindulási állapot:

4-5 éve (2018 nyarán) kezdődtek egy számomra nagyon megterhelő időszakban a problémáim. 2018 nyarán tartós stressz és kevés alvás, pihenés miatt hajnali 4-6 óra között jelentkeztek: mellkasi fájdalom és szorító, görcsös érzés a mellkas bal oldalán, lapockával össze sugározva, illetve fulladásérzet. Ez a probléma egyre gyakoribbá, napi szintűvé vált, melyet a stressznek tudtam be. Egy csendesebb, nyugodtabb időszak bekövetkeztével sem múltak el, így fél év múlva orvoshoz fordultam, mert állandó fájdalommal éltem és teljesítőképességem is töredékére csökkent (1 km gyaloglástól is rosszul lettem, pedig 1,5 évvel előtte még 25-30 km-es túrákat tettünk és 3000 m-es hegyeket másztunk). Házi orvosom először asztmára gyanakodott, így 3 hónapig pulmonológiai vizsgálatokra jártam, de negatív lett minden lelet, majd 1,5 éves kardiológiai kivizsgálást követően megállapították:

- koszorúér görcsöt (születési rendellenességgént az egyik koszorúerem vékony, bár tiszta, meszesedés, plakk nincs benne, 3-4 mm átmérő helyett 2,2 mm, így nagyobb terhelés hatására nem tud kellő mennyiségű vért szállítani és begörcsöl),
- II. stádiumú Mitralis prolapsust (vitorlás billentyű visszahajlása) és szívritmuszavart.

A Purtiert 2022. július 15.-én kezdtem el szedni.

Gyógyszer:

Nitromint spray

Kúra kezdésénél nem éreztem a tünetek erősödését, csak lassú, folyamatos javulást.

Az első doboz szedésénél fáradt voltam, a 2. doboz szedésétől kezdődően folyamatos javulást éreztem magamon. Később növeltem az

**Adagolás:**

1. hónap: 2x1
2. hónaptól: 2x2

adagolást az intenzívebb hatás érdekében, illetve egy fogászati műtétet követően a gyorsabb regenerálódás miatt 1 hétig napi 6, azaz 2x3 adagot szedtem.

A kúra 3-4. hetétől észleltem, hogy korom miatt gyengült látásom (1-es olvasószemüvegre volt szükségem) javult, és szemüveg nélkül látom az apró betűket. Bal alkaron, csúnya égési sérülés nagyon halvány lett, alig látszik. Hangulatingadozásom nem volt.

A Purtier szedésének első időszakában fáradt voltam, sokat aludtam, majd 3. héttől kezdődően a hajnali anginás rohamok intenzitásbeli csökkenését észleltem és egyre ritkábbak lettek, majd 5-6. héttől teljesen megszűntek. Azóta nem használlok Nitromint sprayt (ami 4 évig elhagyhatatlan volt).

II. stádiumú szívbillentyű problémám 2022. decemberi kontrollvizsgálaton I. stádiumúnak mutatkozott. Szerencsére a környezetem is észrevette a pozitív változást raitam.

Vizsgálat: 2019.07.09.

FDC	Negevando	Henry	Post
1121	Mellikei nagykorú III vassárlata	1	911
1122	Rekonstruográfia (M-55, 20)	1	1289
1115	Rekonstruográfia color Dupont	1	1311
			378

[illegible]

Vizsgálat: 2019.07.09.

Anamnézis

Ismerett betegségei: Ismerett belgyógyászati betegsége nincs.
Korábban alvászavar, Kényszeres, de, egyéb gyógyszert nem szed.

Jelen panaszok: Kb fél éve vannak bel oldal, mell és lapocka közötti szorító, nyomó jellegű mellkasi fájdalma, szinte állandóan. (VAS:2/10). Időnként inkább maró, görbe fájdalom van. Fülelő árással jár. És inkább hajnalban van. Terhelhetősége csökken.
Néha Nitromint spray-t fog be, az hol segít, hol nem.

Februárban háziorvos panaszaihoz pulmonológiára irányította: asztmát kizártak.
Légzésfunkció: FEV1:108%. Fél év múlva kontroll lesz.

CAVE: régen penicillin (gyerekkor?)
Mio: 12 éve abbahagyta (előtte 10 évig napi 4-5 szál)
Családi anamnézis: szívinfarktusban 83 évesen halt meg, előtte is szívbetegséggel kezelték.

Értékelés

Kp. fejlett és táplált, jó általános állapotú beteg. Bőre meleg, száraz, icterus, oedema, cyanosis nem látható. Kp. vértelt nyálkahártyák. Részletnyos mellkasi, nko kitörő rekeszek. Pulmo finak puhasságok alaplégzés. Tömp, ritmusos szívhangok, zörgést nem hallottam. Has a mellkasi szintjében, puha, tapog, nyomásérzékenység, defansio nincs. Végtagok alakilag épek. Tudata tiszta, org. neur. elt. nincs.

HR: 147/85 Hgmm

F: 63/min

RKG: 63/min fr. sr, kp. k., iszol ST-k, pos T-k. Mellkasi elvezetésekben iszol ST-k, pos T-k. Átlant V4-ben.

Vizsgálatok

KALA Kardiológia Labor

2019.07.09 10:55 - (KALABOR) Kardiológia labor vizsgáló lap

Szerkezet	Érték	Egység	Referencia tart.	
Szerkezet	8.93	Giga/L	4.00-10.00	F
Fehérvérsejt	0.04	Giga/L	0.00-0.20	F
Basophil granulocyt	0.16	Giga/L	0.00-0.50	F
Eosinophil granulocyt	6.18	Giga/L	1.80-8.00	F
Neutrophil granulocyt	1.97	Giga/L	1.00-4.00	F
Lymphocyt	0.58	Giga/L	0.00-0.88	F
Monocyt	69.2	%	45.0-74.0	F
Neutrophil granulocyt	22.1	%	16.0-45.0	F
Lymphocyt	6.5	%	0.0-10.0	F
Monocyt	1.8	%	0.0-4.0	F
Eosinophil granulocyt	0.4	%	0.0-1.0	F
Basophil granulocyt	4.34	Term/L	3.50-5.00	F
Vörösvérsejt	131	g/L	120-160	F
Hemoglobin	0.40	L/L	0.35-0.47	F
Hematokrit	91.3	FL	74.0-100.0	F
MCV	30.2	pg	27.0-33.0	F
MCH	330	g/L	310-350	F
MCHC	12.3	%	11.0-15.0	F
RDW	297	Giga/L	150-400	F
Thrombocyt	0.45	ug/mL	<0.50	F
D-dimer	140	mmol/L	136-145	F
Nátrium	4.8	mmol/L	3.5-5.1	F
Kálium	4	ng/L	0-14	F
hs Troponin T	118.4	pg/mL	0.0-125.0	F
PROBNP (natriur. peptid)				

Értékelés

Fél éve tartó, inkább atipusosnak tűnő bal oldali mellkasi fájdalom és terhelés csökkenés miatt vizsgáltuk ambulanciánkon. EKG-n kóros eltérés nincs, laborleletei (troponin, ProBNP, D-dimer) negatív eredményt adtak. Szívultrahang vizsgálata során jó bal kamra funkció ábrázolódott. EF:53%, az inferior fal kp. segm. jelzett hypokinesissel ill. enyhe fokú mitrális anterior vitorla prolaps. talaján kilakult mitrális regurgitációval. Ezek alapján akut kardiogéniai kórkép kizárható.

Tekintettel a por családi anamnézisre, a jelzett inferior fal hypokinesisre, korábbi stresszes életmódra és dohányzásra coronaris CT vizsgálat javasolt.

Ennek időpontja: 2019.12.05. 16:30. Határolt út 18.
Előtte 3 órával kérjük már ne egyen, folyadékot bőven fogyasszon!

2019.07.09

dr.

Vizsgálat: 2019.12.19.

Leírás:

Vizsgálati adatok

Indikáció: Atipusos mellkasi fájdalom.

Prospektív EKG-vezérelt, axiális natív és kontrasztos felvételek készültek a szívről kis FOV-val.

Vizsgálat típusa:	Ca-score, Coronaria CTA		
Vizsgálóberendezés:	GE Cardiograph		
Becsült sugárdózis:	315.73 mGy x cm	Effektív dózis:	4,4 mSv
Kontrasztanyag:	140 ml	Típus:	Iomeron 400
Alk. gyógyszerek:	Metoprolol per os:		25 mg
	Nitroglycerin sl.:		0.8 mg

Szívfrekvencia: 47/min

Ritmus: Sinus

A kontrasztanyagos felvételzés során vélhetően technikai hiba miatt a vizsgálat túl korán indult, így még a kontraszt bolus nagy része a jobb szívfélben volt. Mivel a felvételek igen korlátozott diagnosztikai értékkel bírtak, a pácienssel való megbeszélést követően ismételt bolus adásával a kontrasztos vizsgálatot megismételtük, ezúttal az eredmény nélkül.

Vizsgálati eredmények

Ca-score: 0, amely nagyon alacsony cardiovascularis rizikónak felel meg (25. percentilis).

CTA minőség: Kétőnő.

Dominancia: Jobb domináns.

Lefutás: Szabályos eredésű koszorúerek.

LM átmérő: 3.9 mm

A LM szinte azonnal osztlik. A LAD és a domináns RCA proximális szegmentumai a szokottnál gracilisabbak. A LAD proximális szegmentumának átmérője 2,9 mm, a mid szegmentum átmérője 3,7 mm. Az RCA proximális szegmentumának átmérője 2,9 mm, a mid szegmentum átmérője 3,5 mm.

A koszorúér rendszerben atherosclerotikus lézió nem ábrázolódott.

A szívbillentyűkön, szívizomban, szívdűregekben, valamint a pericardiumon strukturális eltérés nem ábrázolódik.

Extracardiális lelet

A coronariák ábrázolására optimalizált felvétellezési technika miatt a mediastinum és a tüdő részlegesen került látótérbe, ezért korlátozottan értékelhető. A hilusokban és a mediastinumban körösen megnagyobbodott nyirokcsomó nem látható. Az ábrázolódott tüdőterületeken aktuális kóros eltérés nem azonosítható.

Vélemény

Erdemi coronaria atherosclerosis nem igazolható.

MedSolution

- Telj.AZ:

Oldal: 0001/000

Ny.: hóf05 2019.12.19 11:3.

Lelet

LELET

Beteg neve.....: **Horvath Zoltan** KBA.....: **1958.01.01**
 Születési dátum...: **1958.01.01** Esetszám: **10000000**
 Anyja neve.....: **Horvath Erzsébet** Telj. AZ: **10000000**
 Lakcím.....: **10000000** TAJ.....: **10000000**
 Vizsgálatkérő.....: **10000000** szu02

Eredmény:

KLINIKAI DIAGNOSIS:

MFS

MITRALIS BILLENTYŐ:

Mellső: megvastagodott

Hátsó: megvastagodott

Mitrális billentyűn vibratio:

Mitralis annulus: Papillaris izom:

Koradiastolés lejtő: mm/s E-ivs: mm Végdiast. plato:

Prolapsus:

AORTA BILLENTYŐ: norm.

sep: mm

TRICUSPIDALIS BILLENTYŐ vékony

Bal kamra végdiastolés átmérő: 41 mm Jobb kamra: 25 mm

Bal kamra végsystolés átmérő: 30 mm Jobb pitvar: 30x34 mm

Bal pitvar: 25x29 mm

Septum végdiast vastagsága: 7 mm Aorta gyök: 20 mm

Hátsófal végdiast vastagsága: 7 mm Sinus Vals: mm

Kiáramlási pálya: mm (norm<20) Aorta asc.: 26 mm

Septum mozgás:

Hátsófal mozgás:

Szívburokban folyadék: elöl: hátul: mennyiség: ml

2D: EF:60 % () EDV: ml ESV: ml LVmassa: g

TAPSE: 28 mm

MAD nincs.

DOPPLER: E/A:74/60 cm/s=1.2 DT:130ms

MI:I dP/dt: Hgmm/s

Mitr diast átlgr: Hgmm area: cm2 PHT: ms

TI:I APsyst nyom:17+5 Hgmm

Ao syst gr: Hgmm AI:nincs PHT: ms

Ao Vmax:1.2 m/s

VÉLEMÉNY:

Jó falmozgások, jó bal kamra funkció. Normális méretű szív.

Mitrális mellső vitorla prolapsus, haemodinamikailag nem jelentős

mitralis regurgitációval. A pericardiumban fluidum nincs

Kontroll 2 év múlva.

SZÍVPROBLÉMÁK

Ernő, férfi (77)

Kiindulási állapot:

Porallergia évtizedek óta, ezzel együtt allergiás eredetű orrpolip időszakos megjelenése. Stroke gyanú kezelése 2017.04.25 – 2023.08.15 között több alkalommal, viszont ez nem igazolódott.

A különböző vizsgálatok eredménye lett a későbbi kardiológiai vizsgálat, és az alábbi műtéti beavatkozások szükségességének felismerése.

- Pacemaker beültetése: 2017.08.09
- Bypass műtét – mindhárom koszorúér áthidalása 2017.01.24.
- Stent beültetés: 2024.04.21.

2022 december és 2023 február között, szürkehályog műtét és távolbalátás érdekében 2. erősségű lencse beépítésére került sor. Olvasószemüveget csak bizonyos esetekben - apróbetűs írás, rossz világítás esetén használok.

Gyógyszerek:

- reggel 75 mg Clopidogrel (Zylit);
- este 20 mg rivaroxaban (Xarelto);
- reggel 100 mg isosorbide mononitrate (Momo Mac Depot);
- 2 X 1,25 mg Bisoprolol (Concor);
- este 40 mg pantoprazole (Noacid);
- reggel 5/1,25 mg indapamide perindopril (Coverex-AS Komb);
- este 5/5 mg perindopril (Amlodipin);
- este 100 mg (Covercard);
- este 100 mg allopurinol (Milurit);

Ezen kívül az akkor, általam használt táplálékkiegészítőket felsorolva – amiket azóta már nem szedek, a Vitamin C kivételével a PurTier szedése javasolt!

PurTier szedésének kezdete: 2023 június



Adagolás:

Kezdetben napi 2x1
2 hét után napi 2x2

#212

1-2 hónap: erőnlét és kedélyállapot változás; bal térd és csípőfájdalmak - időszakos felújulása után - állandósuló fájdalom mentesség- a bal térd porc probléma kivételével, amely fokozatosan halványuló fájdalokat okoz.

Hosszú évek óta július vége és október közepe között, erős hullámokban előtörő porallergia, amely heves tüszögést, orrdugulást, légzési problémákat okozott, szemeim begyulladtak, amit csak részben enyhítettek az orr és szemcseppek. Idén eddig - ritkán előjövő, nagyon enyhe nátha szerű tünetek kivételével – nem jelentkezett!

A kardiológus arra figyelmeztetett, hogy sosem leszek tünetmentes, mivel egyik koszorúerem tulajdonképpen nem működik. A Purrier szédését követően az utolsó szívultrahang vizsgálat jó állapotokat rögzített. Egyre nagyobb- és nagyobb terhelés esetén sem jelentkezik mellkasi szorító fájdalom. Ahhoz még kevés ideje szedem, hogy ezt végleges megállapításként kezeljem.

Betegségekkel összefüggő laboratóriumi értékek változása, vagy kiegészítő vizsgálatok eredményei (induláskor és 6 hónap múlva):

A viszonylag rövid idő alatt a vércukorszint és koleszterinszint már a megengedett legmagasabb szint alá került. A többi laboreredmény lényeges változására a következő laborvizsgálat ad majd választ. A hosszú ideje kezelés alatt álló vérnyomásom, változatlan kezelés (gyógyszerelés) mellett átlagosan csökkent.

A Purtiernek köszönhetően látványos a kondícióm fejlődése, járóképességem rohamos javulása és a mellkasi fájdalmaim ritkulása (több nap is eltelik tünetmentesen).

Nagyon jól érzem magam, közérzetem kiváló.

Laborlet: 2023.05.08

Megjelenés ideje	2023.05.08. 7:52	T. kat. : 01	Napi assz:
Beküldő kódja			Naplósz:
Beküldő orvosa		Megjegyzés:	
Vizsgálat neve	Mért érték	Életkor szerinti ref.	
WBC -FVS SZÁM	7,31 G/L	4,00 - 10,00	
Neutrophyl granulocyt	4,80	1,80 - 7,00	
Lymphocyt	1,67	0,60 - 3,40	
Monocyt	0,57	0,00 - 0,90	
Eosynophyl granulocyt	0,23	0,00 - 0,70	
Basophyl granulocyt	0,04	0,00 - 0,20	
RBC - VVT SZÁM	4,87 T/L	4,00 - 6,00	
Hemoglobin	145,00 g/L	140,00 - 180,00	
Hematocrit	0,42 L/L	0,40 - 0,53	
MCV-VVT TÉRF.	86,70 fL	80,00 - 97,00	
MCH-VVT HGB TART	29,80 pg	27,00 - 34,00	
MCHC -VVT HGB KONC.	344,00 g/L	300,00 - 380,00	
RDW	12,80 %CV	11,00 - 14,80	
PLT-THR-SZÁM	241 G/L	142,00 - 424,00	
Neutrophyl granulocyt %	86 %	40,00 - 70,00	
Lymphocyt %	23 %	20,00 - 40,00	
Monocyt %	8 %	2,00 - 10,00	
Eosynophyl granulocyt %	3 %	0,00 - 4,00	
Basophyl granulocyt %	1 %	0,00 - 2,00	
Éhomi Vércukor	7,7 mmol/l	4,10 - 5,80	
Nátrium	138,00 mmol/l	135,00 - 145,00	
Kálium	4,10 mmol/l	3,50 - 5,50	
Klorid	103,00 mmol/l	98,00 - 109,00	
Magnézium	0,88 mmol/l	0,73 - 1,06	
Karbamid	7,00 mmol/l	2,80 - 7,20	
Kreatinin	78,00 umol/l	59,00 - 104,00	
eGFR-EPI	84 ml/min/1,73m ²		
EGFR megjegyzés	eGFR-EPI szerinti stádiumok (ml/min/1,73 m ² ; felnőtt, nem terhes): > 90 felett: normális vagy fokozott veseműködés 60 - 89 : enyhén csökkent veseműködés 45 - 59 : mérsékelten csökkent veseműködés 30 - 44 : közepesen súlyosan csökkent veseműködés 15 - 29 : súlyosan csökkent veseműködés < 15 alatt: vesetelenség (urémia)		
Húgysav	323,00 umol/l	208,00 - 428,00	
Totál-bilirubin	24,00 umol/l	5,00 - 21,00	
Direkt-Bilirubin	4,40 umol/l	0,10 - 3,40	
GOT/ASAT	24,40 U/l	1,00 - 50,00	
GPT/ALAT	21,30 U/l	1,00 - 50,00	
GGT	40,00 U/L	1,00 - 55,00	
CK	168,00 U/l	3,00 - 171,00	
Koleszterin	3,80 mmol/l	2,50 - 5,20	
Triglicerid	1,80 mmol/l	0,10 - 1,70	
HDL-Koleszterin	1,07 mmol/l	1,00 - 4,65	
LDL-Koleszterin	2,00 mmol/l	0,01 - 3,40	
CRP	2,70 mg/l	0,00 - 5,00	
TSH	1,572 uIU/ml	0,40 - 4,78	
V. Fajsúly	>=1030	1 001,00 - 1 040,00	
V. pH	8,00	5,00 - 9,00	
LEU	negatív		
V. Nitrit	negatív		
V. Fehérje	negatív		
V. Cukor	negatív		
V. Aceton	negatív		
V.UBG	Normal		
V. Bilirubin	negatív		
V. Erytrocyta/Haemoglobin	negatív		
Vörsvérlet	nincs		
Fehérvésejt	nincs		
Baktérium	nincs		
Sarló gomba	nincs		
Fonális Gomba	nincs		
Laphámsejt	nincs		
Kerekhámsejt	nincs		
Vese Hámsejt	nincs		
Trichomonas	nincs		
Hialin Cilinder	nincs		
Szemcsés Cilinder	nincs		
Triplet foszfát	nincs		
Kalcium oxalát	nincs		
Kalcium Foszfát	nincs		
Húgysav Kristály	nincs		
Amorf kristály	nincs		

Budapest, 2023.05.08

Validálta:

St. p. CABG (LIMA ad LAD, VSG ad LCX-M2 et ad RCA), Stenosis multiplex et oclusio LAD, LIMA ad LAD patens, Oclusio subtotalis p. distalis LCX, Oclusio VSG ad LCX-M2, Oclusio RCA, Oclusio VSG ad RCA, PCI (Impl. DES) p. distalis LCX
Heart Team javaslata a továbbiakban konzervatív terápia folytatása volt. Megfigyelésük további részében ischaemiás aktivitást, ritmuszavart, dekompenzációt utalt jelet, punkciós szövődményt nem észlelték. Laborjában észlelt hypokalemia miatt káliumpótlást kezdtek. 04.29.-n bocsátották otthonába.

Jelen panaszok: Nagyobb fizikai terhelésre (100 méter intenzív séta) mellkasi szorítás jelentkezik, mely pihenésre szűnik. Fulladás nincs. Palpitációs panaszokat nem említ. Hasi panasz nincs, széklete jelenleg napi 3 alkalommal van, de lazító hatású étrendkiegészítőt szed. Székletét véresnek, feketének nem látta. Vizelet rendszerben, láva nem volt. Fejfájást, szédülést nem említ.

30 éve nem dohányzik. Napi 1-3 kávét iszik. Sört alkalomszerűen fogyaszt.

Családi anamnézis: Édesapjának végbetréka volt.

CAVE: Nem ismert.

Gyógyszerei: Zylit reggel 75mg, Monomack Depot délután 100mg, Concor Cor 2x1.25mg, Xeter este 10mg, Noacid este 40mg, Kaldyum 2x1 kapszula, Xarelto reggel 20mg, Coverex-AS Komb 5/1.25mg reggel 1 db., Milurit este 100mg, Covercard este 5.5mg, Lenkel C-vitamin 1000mg reggel 2, Silymarin Komplex reggel 1, Colon Herboxa 2x1, Gluco Plus With MSM 3x1, Puriter Deer Velvet 2x1.

Status: 105 súlyos férfi beteg. Kp. vértelt bőr és nyálkahártyák. Icterus, cyanosis, oedema nincs. Nyakon lymphadenomegalia nem tap., pajzsmirigy mk. lebenye norm. tap. Rekesz mko. kiser. tüdők felett érdes légzés, crep., pangás nem hallható. Ritmikus szívverés, zörej nem hallható. Carotisok, a. femoralisok felett zörej nincs. Medián stenotomia, bal alsó végtagon saphenectomia pp. gyógyult hegy. Has puha, betap., nyomásérzékenységet nem jelez. Hepar, lien nem tap. Kp. élénk bélhangok. Vezetékek szabaddak, gerinc nem nyomásérzékeny, ADP-A nem tap. Eber tudat, durva neurológiai gúci nem észlelhető. RR: 126/70 Hgmm. P: 60/min. Testmagasság: 172 cm. Testsúly: 105.65. BMI: 35.70.

Leletek, konziliümok:

06.14. EKG: Sinus ritmus, bal tengelyállás. fr: 60 min, norm. vezetési idők. Q.III.aVF, neg.T: aVR, V1.

06.16. Echocardiographia:

Jobb kamra Dd:	mm	Bal pitvar M-mód:	45 mm	Aorta gyök:	35 mm
Aorta asc.:	mm	Septum DT:	13 mm	Hátsófal DT:	13 mm
Bal kamra Dd:	60 mm	DS:	43 mm	EF:	58 %
2D bal pitvar:	mm	2D jobb pitvar:	mm	E-IVS:	mm
Kiáramlási seb.:	1.2 m/sec.	E A arány:	0.6/0.7	E:	A:
Mitr. bill.:	II. fokú MI	Aorta bill.:		Tric.bill.:	II. fokú TI
Beesőlt jobb kamrai systoles nyomás:	30-10 Hgmm	FAPESE:	mm	DT:	ms

Vélemény: Tágabb bal szívfél. Megtartott systoles bal kamra funkció. Károsodott relaxáció. Inferior hypokinesis. Echodensebb aorta billentyű. Magasabb AP nyomás. (Dr. Kohut László)

Dietetika: Kettő alkalommal részelt dietetikai tanácsadásban, mely során megismerte vonatkozó étrendjét. Otthonába becsajátva energiaszegény, meghatározott szénhidrát-tartalmú és összetételű, cardioprotectiv diéta folytatása javasolt. Ételkészítéskor megközelítőleg felét az alacsony energia- és szénhidrát-tartalmú zöldségek képezze. pl.: friss zöldségek, zöldséglevesek, zörej nem hallható. Carotisok, a. femoralisok felett zörej nincs. Medián stenotomia, bal alsó végtagon saphenectomia pp. gyógyult hegy. Has puha, betap., nyomásérzékenységet nem jelez. Hepar, lien nem tap. Kp. élénk bélhangok. Vezetékek szabaddak, gerinc nem nyomásérzékeny, ADP-A nem tap. Eber tudat, durva neurológiai gúci nem észlelhető. RR: 126/70 Hgmm. P: 60/min. Testmagasság: 172 cm. Testsúly: 105.65. BMI: 35.70.

Laboratóriumi vizsgálatok eredményei:

2023.06.15.: [07:14] Széklet Weber: negatív ;
2023.06.19.: [06:42] Glu2: 6.8 mmol/L; [09:42] Glu2: 6.4 mmol/L; [16:50] Glu2: 7.8 mmol/L;
2023.06.20.: [12:37] Glu2: 5.4 mmol/L;
2023.06.23.: [06:38] Karbamid: 4.2 mmol/L; Kreatinin: 74.000 μmol/L; Se Nátrium: 142.000 mmol/L; Se Kálium: 4.1 mmol/L; eGFR-1.5: 85.013 ;

Alkalmazott terápia: Zylit, Xarelto, Mono Mack Depot, Concor, Xeter, Noacid, Kaldyum, Coverex-AS Komb, Covercard, Milurit, C-vitamin, Silymarin Komplex, Colon Herboxa, Gluco Plus With MSM, Puriter Der Velvet Postinfarktusos egyéni rehabilitációs torna, kerekpártnézés, masszázs, 6 perces járásteszte.

Epikrízis: Korai rehabilitációs kezelés céljából ventük fel intenzív osztályunkba a 2023.04.28-án történt coronararófia és PCI után. Felvételkor panaszai: nagyobb fizikai terhelésre (100 méter intenzív séta) mellkasi szorítás jelentkezik, mely pihenésre szűnik. Bal terde azokat fáj. Echokardiográfiai vizsgálata során idigabb bal szívfél, megtartott systoles bal kamra funkció, károsodott relaxáció, inferior hypokinesis, echodensebb aorta billentyű, magasabb AP nyomás került leírásra. Vérmomása és szívfrekvenciája a normál tartományban mozgott. A beállított gyógyszerelés mellett keringése végig kompenzált volt, mellkasi panaszait észlelőnk alatt nem jelzett. Vércukrai magasabbak voltak, diétát indítottunk. Rehabilitációs tréningjeit panaszmentesen, jó effektussal végezte.

Otthonában kardiológiai, diabetológiai gondozása, állati zsírban szegény, 170 gr. CH-t tartalmazó étrend, a tanult torna rendszeres végzése, valamint könnyű dinamikus típusú fizikai aktivitás, gyógyszeresen:

reggel 75 mg clopidogrel (Zylit)
este 20 mg rivaroxaban (Xarelto)
reggel 100 mg isosorbide mononitrate (Mono Mack Depot)
2x1.25 mg bisoprolol (Concor)
este 10 mg rosuvastatin (Xeter)
este 40 mg pantoprazole (Noacid)
reggel 5/1.25 mg indapamide, perindopril (Coverex-AS Komb)
este 5.5 mg perindopril, amlodipine (Covercard)
este 100 mg allopurinol (Milurit)
Vitamin C, Silymarin Komplex, Colon Herboxa, Gluco Plus With MSM, Puriter Der Velvet kiegészítő gyógyszer.

Kiindulási állapot:

2020 decemberében szívinfarktusa volt, azóta nem zár az egyik szívbillentyűje.

Folyamatos köhögés, illetve fulladás kínozza. 5 lépés megtétele után nem kapott levegőt, és nem volt jártányi ereje sem. Két naponta vízhajtót kapott, folyton görcsölt a vádlija, leesett a vérnyomása.

Purtier kezdete: 2022 december 24.

Vízfogyasztás: sajnos csak 0,5 L naponta.

Purtier szedésének hatása:

Egy hónap szedés után a köhögés és a fulladás is teljesen megszűnt. Erőnléte sokkal jobb, bőre színe megváltozott. Könnyedén gyalogol 50 métert is, megállás nélkül.

Vízhajtót csak 2 hetente szed, amit eddig 2 naponta kapott.

3 hónap szedés után eltűntek az ízületi csomók, újra kiegyenesedtek az ujjai.

Az utolsó ellenőrző vizsgálaton kardiológus által végzett szívultrahang lelete azt mutatta, hogy az ejekciós frakció 30%-ról 50%-re emelkedett.

A Purtier szedése óta észlelhetően sokkal fiatalosabban néz ki és kiegyensúlyozottabb.



Adagolás:
Napi 1 db,
(8 hónapja szedi)

Kiindulási állapot:

2009-ben állapítottak meg nálam szívbetegséget (bal kamra nagybodást). Nehezemre esett a járás, illetve a légzés is az aszthmának köszönhetően. Éveken át való kórházba járás után sem javult az állapotom. A párom, minőségi vitaminokkal próbálta az egészségem romlását elkerülni. Viszont mindig is aktív életet éltem, így lelkiileg nagyon megviselt, hogy nem tudtam csinálni semmit sem. Felkerültem a transzplantációs listára is, azonban 6 év várákozás alatt nem került erre sor. Ez idő alatt rengeteg gyógyszert szedtem napi rendszerességgel, melyeknek különböző mellékhatásai voltak. Állandó, erős orrvérzés, folyamatos stressz, gyomorvérzés, bőrproblémák. Borzasztó időszak volt ez.

Majd megismerkedtünk a Purtierrel. A férjem azonnal azt mondta, hogy kezdjem el szedni, de nem tudtuk, hogy mennyire lesz hatásos. A régi állapotomról fotóm nincsen, azt inkább el is felejténém, élvezem az újjászületésem kirobbanó formáját.


Tapasztalat a termékkel:

A szedés megkezdése után 2 héttel helyrejött a bőrproblémám, megszűnt a kemény, szárazság a testemen. Örültem nagyon, hogy van hatása a terméknek. Szedtem tovább a kúrát. Az orrom tisztulásának folyamata is elindult. 2 héten keresztül távozott a váladék belőle. A férjemmel foglaltunk egy wellness hétvégét kíváncsiságból. Ezelőtt mindig fulladás kapott el wellnessezés közben. Most semmi bajom nem volt, nem fulladtam és nem fáradtam el, ki tudtam teljesen élvezni az ott eltöltött időt. A következő próbatétel az volt, amikor egyik ismerősomeg meglátogatva, az ott lévő lift elromlott, és gyalog mentem fel hozzá a 6. emeletre. A férjem féltett, hogy útközben összeesek, azonban minden fulladás és rosszullét nélkül teljesítettem a lépcsőzést. El sem hittük, mert előtte 4-5 lépcsőfok volt a maximum. Amit még érdemes megemlíteni, hogy lekerültem a transzplantációs listáról is. Nagy örömmel tölt el.



Elmúlt időszakban rengeteg utazáson vagyunk túl. Sütök, főzök barátoknak, unokáknak és a férjemnek. Újraéledtem a Purtiertől!

Tegyünk a saját egészségünkért, aki teheti fogyassza a Purtiert! Én mindent megteszek, hogy újra egészséges legyek. Ugyanis az a szlogenem: „Ami rajtam múlik, az rajtam ne múljon, mert nem mindegy, hogy te pelenkázod az unokád, vagy ő pelenkáz téged!”



Ambuláns lap

Szívelégtelenség szakambulancia.

MT EK Honvédkórház Gyakorló Kórház

Fine
Tel: 01 4

Ambuláns lap (B0312005)

Név:	Naplósorszám:
Születési név:	
Születési hely:	TAJ:
Dátum:	1958.01.01 (61 éves)
Anyja neve:	Vizsgálat ideje:
Lakcím:	
Beküldő intézet: Szívelégtelenség szakambulancia. (01A625610)	
Beküldő orvos:	
Beutaló Dg.: Dilatativ cardiomyopathia I4200	

Anamnézis:

1961 korában appendectomia
1983-84 nodus miatt 3x opus
20 éves korában diagnosztizált ulcus duodeni
2004 - gerincműtét discus hernia miatt
2009 choledocholithiasis, cholecystolithiasis - EST - kőextractio
2009-ben diagnosztizált HFrEF - coron: neg.
2009-ben diagnosztizált asthma bronchiale
2010 LC
2016.06.27.-07.13. között hospitalizáció Osztályunkon szívtranszplantáció elbírál
funkcionális stádiumban. Transthoracalis echocardiographia során tágabb üregmére
jelentősen csökkent systolés funkciójú bal kamra, enyhe-kp relatív mitralis és
emelkedett pulmonális nyomás, diffúz hypokinesis ábrázolódott. Felvételi laborjában
NT-pro-BNP (911 pg/ml) és emelkedett lipid szinteket mértünk. Felvételi statusában r
utaló jeleket találtunk. Szívtranszplantáció előtti kivizsgálása, góckutása során a beavatko
nem találtunk. Szájsebészeti konzílium fogköeltávolítást, ill. 27, 47-es fogak eltávolítását
Swan-Ganz katéterezés során postcapillaris pulmonalis hypertonia igazolódott (mPAP: 3
TPG: 14 Hgmm), 4,98 l/min CO mellett; HTx-et kontraindikáló pulmonalis vascularis
(PVR: 2.81 Wood). Coronarographiás vizsgálata során ép coronariák igazolódott
optimalizálása ellenére fennálló gravis systolés bal kamra dysfunkcióra. funk
morfológiára (QRS: 80 ms) primer prevenció ICD implantatio mellett döntöttünk, melye
(Sorin Paradym 2SN: 451Y00F). Az elektródák pozícióját illetve a pacemaker működ
kontroll EKG-k és mérhető elektromos paraméterek alapján megfelelőnek találtuk. A p
során észlelt bal oldali csúcsi ptx miatt mellkasi drainage-t kezdtünk 07.08-án, kontroll m
iználódása után a draint sikeresen eltávolítottuk 48 óra múlva.

#220

[illegible]

2016-06-11 DDD-ICD kontrol: Hf:43 EF: 20% QRS 80 idro 2016-07-07

2017.09.22. DD1-ICD funkció:
 Tipus: Smart Paradyse II, Implantáció: 01.01.17, EF: 20%, QRS-BD index: 2016-07-07
 A tachykardia, per. gyújtás: AP-kezelési határhelyzeten 62 mm szoros ritmus, 63 VV szoros, PR: 150 ms.
 A legkisebbi impulzusok AP: 160 V, VP: 600-800 At. A kezeltől feltérte B alkalommal a magánbelső
 170-180 mm szoros tachycardia (szorosított) 62 mm szoros, 63 VV szoros, PR: 150 ms.
 A szorosított tachycardia: 3,0 mV, 1,0 V, 0,5 V, 0,15 mV, Impedancia: 642 ohms
 A szorosított tachycardia: 1,5 mV, 1,25 V, 0,8 mV, Impedancia: 730-553 ohms
 Telepítéskor: 1,0 V (CRT: 2,66 V) charge time: 6 sec
 Vélemény: Jó DD1-ICD funkció. Kontroll: 12 esz. és magánbelső kórosan szoros, szoros.

2017.11.24. DDD-ICD Kontroll: [https://doi.org/10.1007/978-3-7081-9950-7_11](#) ORS 80 idnr: 2016-07-07

[illegible]

Ambuláns lap

Vélemény: Jól DDD-R-D funkció. Kontroll 1/2 és művelet javaslat Rimas Ambulanciánkon. (Polgár)

2016.03.27 DDD-ICD kontroll:

Típus: Sorin Paradym 2, Implantáció ind.: HF+EF EF: 29% QRS 80 ms. 2016.07.07.
 Sebte békés, pp. gyöngyös. Aktuálisan 74/min-es sinus ritmus, jó AV vezetés, SAVD 160ms.
 A legutóbbi kontroll óta AP 24%, VP 0%-ban. Atrial burden 0%. A készülék Holterre 1x 170min sinus tachycardiát és 4x NSVT-t rögzített.
 A sensing/threshold: 2,2 mV / 0,3 V @ 0,35 ms, Impedancia: 516 Ohm
 V sensing/threshold: 15,18 mV / 0,75 V @ 0,35 ms, Impedancia: 676-486 Ohm
 Telepfeszültség: 2,96 V (RRT=2,66V)
 Vélemény: Jól DDD-R-D funkció. Kontroll 1/2 és művelet javaslat Rimas Ambulanciánkon. (Polgár)

2016.07.23 DDD-ICD kontroll:

Típus: Sorin Paradym 2, Implantáció ind.: HF+EF EF: 29% QRS 80 ms. Primer prev. / ideje: 2016.07.07.
 Sebte békés, pp. gyöngyös. Aktuálisan 53/min-es sinus ritmus, jó AV vezetés, SAVD 160ms.
 A legutóbbi kontroll óta AP 18%, VP 0%-ban. Atrial burden 0%. A készülék Holterre 1x rövid (pár) tachycardiát és 4x NSVT-t rögzített.
 A sensing/threshold: 2,3 mV / 1,0 V @ 0,35 ms, Impedancia: 496 Ohm
 V sensing/threshold: 15,18 mV / 0,75 V @ 0,35 ms, Impedancia: 676-484 Ohm
 Telepfeszültség: 2,96 V (RRT=2,66V)
 Vélemény: Jól DDD-R-D funkció. Kontroll 1/2 és művelet javaslat Rimas Ambulanciánkon. (Polgár)

2016.11.28 DDD-ICD kontroll:

Típus: Sorin Paradym 2, Implantáció ind.: HF+EF EF: 29% QRS 80 ms. 2016.07.07.
 Sebte békés, pp. gyöngyös. Aktuálisan 52/min-es sinus ritmus, jó AV vezetés, SAVD 160ms.
 A legutóbbi kontroll óta AP 22%, VP 0%. Atrial burden 0%. A készülék Holterre 2x 8-10 tagú NSVT-t rögzített.
 A sensing/threshold: 2,3 mV / 1,0 V @ 0,35 ms, Impedancia: 496 Ohm
 V sensing/threshold: 15,18 mV / 0,75 V @ 0,35 ms, Impedancia: 711-507 Ohm
 Telepfeszültség: 2,87 V (RRT=2,66V)
 Vélemény: Jól DDD-R-D funkció. Kontroll 1/2 és művelet javaslat Rimas Ambulanciánkon. (Polgár)

Vélemény: A 2009. óta ismert nem ischaemiás etiológiájú systolus szív elégtelenségben szenvedő beteget gondozó orvos (Dr. Székely Ferenc) betegnél először a szívtranszplantáció elbírálására. A betegnek jelenleg decompensatoria jellemző tünetei, panaszai nincsenek. Folyadék retenciója nincs. DE terhelhetősége minimális (NYHA III). Gyógyászati kezelése közel optimális. Készen QRS-e van - CRT nem indokolt, de tekintettel a nagyon alacsony bal kamrai ejekció frakcióra ICD implantáció indokolt. Tekintettel arra, hogy a beteg az ICD implantációtól tünetei javulás nem várható. Terhelhetősége a közel optimális gyógyszeres kezelés ellenére minimális - szívtranszplantáció indokoltnak látszik. A beteget a szívtranszplantációt megelőző kivizsgálás és az ICD implantáció céljából a közeljövőben felvesszük Országunkra.

2016.09.30. A beteget időközben hospitalizáltak szívtranszplantáció szükségességének megítélése céljából. Az elvégzett spirometria 17,2 ml/kg/min V(O2 max)-ot igazolt, a S-G katéterezés során a CO: 4,98 ml/min volt 20Hgmm mPCW és 2,81 PVR mellett. Mindezek alapján szívtranszplantációt még nem tartottuk indokoltnak, a beteg ezirányú szoros observációját javasolt (fél évenként spirometria szükséges). A beteg jelenleg stabil klinikai állapotban van. Decompensatoria jellemző tünetei, panaszai nincsenek. Folyadék retenciója nincs. Terhelhetősége beszűkült, de a korábbinál sokkal jobb (NYHA II-III). Tensója, frekvenciája, pacemaker működése rendben.

2017.03.21. A beteg változatlanul stabil klinikai állapotban van. Decompensatoria jellemző tünetei, panaszai nincsenek. Folyadék retenciója nincs. Terhelhetősége az elmúlt hónapokban javult (NYHA II). Tensója, frekvenciája, pacemaker működése rendben. Időközben megtörtént az újabb spirometria, ami 17,6 ml/kg/min V(O2 max)-ot és 36-os VE/V(O2)-t igazolt.

2017.07.24. A beteg stabil klinikai állapotban van. Decompensatoria jellemző tünetei, panaszai nincsenek. Folyadék retenciója nincs. Terhelhetősége változatlan (NYHA II). Tensója alacsony, de a beteg számára ez panaszt nem okoz. Frekvenciája kissé magasabb, ezért a mai naptól a celsőzson lévő BB mellett ismételt adását kezdjük.

A mai napon elvégzett echokardiográfia az előző (egy évvel ezelőtti) vizsgálatat gyakorlatilag megerősítő képet mutatott (tág üregméretű, normális falvastagságú, k.p. fokhan csökkent systolus funkciója bal kamra, csekély relatív MI, TI, normál tag, kissé csökkent longitudinális kontrakciója jobb kamra, normális pulmonális

TÜDŐPROBLÉMÁK

#223

Kiindulási állapot:

Tüdőgyulladást kapott 2022 áprilisában. A vér oxigén telítettsége 50% alá csökkent, eszméletét veszítette. Kórházba vitték, majd pedig gyógyultan (az orvosok szerint) 2 hét után kiengedték, viszont nem tudta magát ellátni, pelenkázni, itatni kellett, szilárd ételt nem tudott fogyasztani. Egészen januárig csak ágyban feküdt, nagyon gyenge volt, nem értették a beszédét sem.

Adagolás:

Napi 1 kapszula

2023 január 5.-én elkezdte szedni a Purtier kapszulát, de mivel nem tudta lenyelni, ezért vízbe áztattuk, majd ketté vágtuk és nyelve alá raktuk, hogy megfelelően szívódjon fel. Meglepetésünkre a 3. kapszula beszédése után visszajött az étvágya, már le tudta nyelni az ennivalót is. 1-2 hét múlva önállóan el tudott menni mosdóba, újra érthetően beszélt és visszajött az életkedve. Kezdetben nagyon fájtak az ízületei, ami idővel elmúlt.

Májusban befejezte az 1. kúrát, majd 3 hónap múlva ismét elkezdte szedni a kapszulát.

Sokkal energikusabbnak érzi magát. Ami még érdekes, hogy újra szemüveg nélkül olvas (saját maga észre sem vette).

Folyadékfogyasztás:

Sajnos csak 1 liter, de így is látjuk, hogy a Purtier nagyon hatásosan dolgozik.

Mindenki látja a pozitív változást.

#225



2023. Februar.26.



2023. Februar.26.



2023. Februar.26.

C

C

CONSIENTIOUS TERMÉK

#227

BŐRSÉRÜLÉS

Piroska, nő (49)

Sajnos elcsúsztam a kavicsokon és mint jól látható elég mély felületi sérülést szereztem. Több helyen felszakadt a bőröm is, illetve véraláfutásos lett. Összesen 5x lett befújva Conscientious spray-vel. Másfél hét alatt regenerálódott, abszolút nem fájt és jól látható a képen az is, hogy a bőr teljesen „visszaépült”.



#228

BŐRSÉRÜLÉS

Margaréta, nő (16)

Görkorcsolyázás közben elestem, elég csúnyán lehorzoltam a bal térdemet. 1 hétig minden nap 2x fújtam Conscientious spray-vel (CSSW).

A 2 kép között eltelt idő pontosan 1 hét. Orvos ismerősöm szerint a gyógyulás lényegesen gyorsabb lett a vártnál.

Semmilyen hámosító krémet nem használtam.

Köszönöm szépen!



BŐRÁPOLÁS

Piroska, nő (48)

Conscientious maszk

A Purrier kapszulák mellett a maszkot is használtam. Felhelyeztem az arcomra és fél óra után nagyon feltűnő a változás. Bőröm selymessé vált, és mint látható feltöltötte a pici ráncokat is.

Használatát csak ajánlani tudom.



#230